METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

Le vivant nous rassemble

CAHIER 2

PORTRAIT DE LA BIODIVERSITÉ CONTINENTALE

JUIN 2021



LES PUBLICATIONS
DE L'ATLAS METROPOLITAIN DE LA BIODIVERSITÉ

2020 / 2021



CAHIER 1 :
AIX-MARSEILLE-PROVENCE,
UNE MÉTROPOLE-NATURE VULNÉRABLE

CAHIER 2 :
PORTRAIT DE LA BIODIVERSITÉ CONTINENTALE

CAHIER 3 :
LES PORTRAITS COMMUNAUX DE LA BIODIVERSITÉ

À venir...

... une analyse sur les enjeux de patrimonialité, les enjeux de conservation en lien avec les pressions anthropiques, les enjeux de biodiversité marine, etc.

CRÉDITS PHOTOS COUVERTURE © SONIA RICHAUD | CEN PACA © CAMILLE MOIRENC © SONIA RICHAUD | CEN PACA © F. ANDRIEU | CBNMED © NICOLAS FUENTO | LPO © MUGGIANU JEAN-MARIE

PRÉAM-BULE

La biodiversité connaît une crise sans précédent. Toutes les espèces, animales et végétales, sont uniques et irremplaçables, les préserver est de la responsabilité de tous. Ce patrimoine naturel vivant constitue un bien commun, aussi, la crise actuelle invite-t-elle à réinventer les liens avec la nature et à en « prendre soin ».
La métropole Aix-Marseille-Provence, plus que toute autre en France, se caractérise par des espaces de nature omniprésents et d'une très grande qualité écologique.

Ce concentré de biodiversité est une nécessité pour les équilibres homme-nature et la vie des territoires. Il est constitutif du cadre de vie, il offre des lieux de respiration et de bien-être au quotidien et garantit aussi l'attractivité de la métropole au travers de l'image d'excellence qu'il véhicule.

Aujourd'hui, le constat partagé révèle que les enjeux environnementaux sont devenus cruciaux, pour ne pas dire vitaux, en ce qui concerne l'avenir des territoires. Ils ne connaissent pas de frontière et exigent une gestion concertée et cohérente à l'échelle de l'ensemble du territoire métropolitain. Le partage, la complémentarité et la solidarité écologiques entre les communes et la Métropole sont devenus une évidence.

C'est pourquoi la Métropole Aix-Marseille-Provence s'est engagée dans l'élaboration d'un atlas métropolitain de la biodiversité, véritable démarche intégratrice qui est inscrite à l'agenda environnemental porté conjointement avec le Département des Bouches-du-Rhône.

Cette initiative représente la parfaite occasion de regrouper et de partager toutes les connaissances écologiques disponibles. Fruit d'un travail collaboratif et d'expertises avec le Conservatoire botanique national méditerranéen, le Conservatoire d'espaces naturels et la Ligue de protection des oiseaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, il révèle la fragilité de la faune, de la flore et des habitats naturels dans la métropole, un territoire cohérent pour œuvrer efficacement.

Aussi, la prise en compte des enjeux écologiques dans les politiques sectorielles animées par la Métropole passe par une connaissance fine et hiérarchisée de ce qui compose la richesse de son patrimoine naturel. La Métropole a souhaité s'appuyer sur une méthodologie scientifique pour analyser les très nombreuses informations disponibles.

Le cahier 2 « Portrait de la biodiversité continentale » illustre le diagnostic de la faune et de la flore du territoire.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3
MÉMO CHIFFRES CLÉS 5
INTRODUCTION 6
MÉTHODOLOGIE 10
RÉSULTATS 14
MODE D'EMPLOI 16
LES MAMMIFÈRES 18
LES CHAUVES-SOURIS 20
LES OISEAUX 22
LES REPTILES 24
LES AMPHIBIENS 26
LES POISSONS D'EAU DOUCE 28
LES CRUSTACÉS 29
LES MOLLUSQUES 30
LES ARACHNIDES 32
LES COLÉOPTÈRES 33
LES HÉMIPTÈRES 34
LES NEUROPTÈRES 35
LES CRIQUETS, SAUTERELLES ET GRILLONS 36
LES LIBELLULES 38
LES PAPILLONS DE JOUR 40
LES PAPILLONS DE NUIT 42
LES MOUSSES ET LICHENS 43
LES PLANTES VASCULAIRES 44
CONCLUSION 46
INDEX 48

UNE BIODIVERSITÉ MÉDITERRANÉENNE EXCEPTIONNELLE...

2/3
des oiseaux
de France
dont **296** espèces protégées

3/4
des chauves-souris
de France
dont **25** espèces protégées

50 %
des reptiles
de France
dont **17** espèces protégées

1/3
des plantes à fleur
de France
dont **76** espèces protégées

60 %
des mammifères (1)
de France
dont **8** espèces protégées

50 %
des papillons de jour
de France
dont **5** espèces protégées

50 %
des amphibiens
de France
dont **11** espèces protégées

60 %
des libellules
de France
dont **3** espèces protégées

...MAIS VULNÉRABLE

5 800 espèces faune-flore observées sur la métropole

DONT **436** espèces protégées (protection nationale)

ET **258** espèces menacées

UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET NOVATRICE

2 MILLIONS
d'observations naturalistes compilées

94 %
de données récentes
(recueillies après 2000)

18
groupes taxonomiques analysés

3 120
contributeurs
(amateurs et professionnels)

5
camps de prospection « grand public »

25
secteurs complémentaires prospectés

LES ENJEUX DE CONNAISSANCE

10
groupes d'espèces avec une connaissance taxonomique satisfaisante

6
groupes d'espèces en manque de connaissance chorologique

8
groupes d'espèces en lacune de connaissance importante

7
groupes d'espèces complétés par des inventaires ciblés

(1) hors chauves-souris

Sources (communes aux quatre sous-parties) :
Atlas métropolitain de la biodiversité - Stratégie de définition des enjeux de conservation de la biodiversité continentale de la Métropole Aix-Marseille-Provence – État des lieux et enjeux de connaissance, CEN PACA, 2020

INTRODUCTION



Saint-Sauvournin

© DAVID GIRARD | MAMP

LA BIODIVERSITÉ, UN HÉRITAGE FRAGILE...

La biodiversité ou « diversité biologique » est l'ensemble du vivant de la planète. Elle renvoie à la diversité des écosystèmes et des espèces qui les composent, à la diversité des gènes que l'on trouve dans chaque espèce ainsi qu'aux interactions entre les organismes vivants et leurs milieux.
Les millions d'espèces qui existent aujourd'hui sont le fruit de la longue évolution du vivant.

La biodiversité est partout. Quelle que soit l'échelle, de la planète à l'écosystème des jardins, sur terre ou en mer, la biodiversité est tout autour de nous, mais nous ne sommes pas toujours conscients de la diversité biologique qui nous entoure, des liens qui nous relient. Pourtant, la biodiversité dite « ordinaire », celle que nous côtoyons tous les jours, est le socle de nos vies.

En effet, les bienfaits « ou services écosystémiques » qu'offre la biodiversité sont nombreux : l'eau pour boire, l'air pour respirer, des aliments pour se nourrir, des médicaments pour se soigner, des matériaux pour se vêtir et s'abriter, le recyclage de la matière organique, la régulation du climat, le stockage du carbone, l'épuration de l'eau, le maintien de la fertilité des sols, la lutte contre les maladies, la prévention des érosions, la qualité du cadre de vie, etc.
Le bien-être, la santé et la survie de l'homme dépendent de la biodiversité et pourtant, selon l'ONU, 60 % des services écosystémiques sont menacés. La capacité des écosystèmes à fournir ces services écologiques, à un niveau satisfaisant pour les générations actuelles et futures, est grandement mise à mal.

SOURCE : UICN, PANORAMA DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES, 2012

> « LA BIODIVERSITÉ OFFRE DE NOMBREUX BIENFAITS À L'HUMANITÉ ET CONSTITUE UNE ASSURANCE VIE POUR L'AVENIR »
>
> SOURCE : WWF


... UN SUPPORT DE VIE EN DÉCLIN

Aujourd'hui, la perte de biodiversité est un constat alarmant, sans précédent à l'échelle mondiale : le rythme d'extinction des espèces est entre 100 et 1000 fois supérieur au rythme naturel constaté lors des 10 millions d'années passées. SOURCE : UICN, 2020

La destruction et la fragmentation des milieux, les pollutions industrielles et agricoles et la surexploitation des ressources sont parmi les principales causes de disparition du vivant. Ces dernières sont aggravées par le changement climatique.

L'homme est directement responsable de cette érosion massive et accélérée du vivant alors qu'il fait partie intégrante de cette biodiversité et ne peut s'y soustraire... son existence, sa santé, sa sécurité alimentaire, sa qualité de vie et des pans entiers de son économie dépendent de la biodiversité.
Si l'ampleur des enjeux à court terme ne semble pas « remettre en question » en profondeur le modèle de développement et les modes de vie des sociétés humaines, la récente pandémie du coronavirus (la Covid-19) qui a frappé de manière globale l'humanité, montre les conséquences tragiques que peuvent avoir des changements environnementaux brutaux. La crise sanitaire planétaire a mis en lumière les interactions étroites entre faune sauvage, perte de biodiversité et santé publique. Les scientifiques alertent sur le risque de voir se propager d'autres maladies infectieuses d'origine animale si l'homme poursuit son expansion sur les terres naturelles sauvages et son utilisation, toujours plus intense, des ressources planétaires, causant la destruction des écosystèmes.

> « L'HUMANITÉ EST À LA FOIS LA CAUSE ET LA VICTIME DE LA 6E GRANDE EXTINCTION DU VIVANT QUI EST EN COURS »
>
> SOURCE : NATIONAL GEOGRAPHIC



©PEXELS.COM | PIXABAY

LE SAVIEZ-VOUS ?

- La vie est apparue sur Terre, il y a environ 3,8 milliards d'années.
- 2 millions d'espèces sont répertoriées sur Terre alors que les scientifiques estiment que le nombre d'espèces vivantes pourrait atteindre 1 000 milliards.
- 60 % de la population mondiale d'animaux sauvages a disparu au cours des quarante dernières années.
- 1 million d'espèces sont menacées d'extinction dans le monde : 1 mammifère sur 5, 1 amphibien sur 3, 1 oiseau sur 8 et 7 plantes sur 10.
- 50 % du PIB mondial (environ 40 billions d'euros) dépend de la nature.


SOURCES : IUCN, WWF, PNUE











© GSSV - X.NICOLLE | B.COULET | M.MAGNIER

ONE HEALTH :
L'INTERDÉPENDANCE ENTRE LES SANTÉS HUMAINE, ANIMALE ET ENVIRONNEMENTALE

SOURCE : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT (PNUE)

STRATÉGIE EUROPÉENNE POUR LA BIODIVERSITÉ - HORIZON 2030

MISE EN PLACE DES ZONES PROTÉGÉES (A MINIMA)



30 % des terres

30 % des mers

Protection plus stricte des forêts primaires et anciennes de l'Union européenne encore présentes

RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES ET MARINS DÉGRADÉS DANS TOUTE L'EUROPE

En étendant l'agriculture biologique et en augmentant les structures agro-paysagères

En rétablissant au moins 25 000 km de cours d'eau

En enrayant et inversant le déclin des pollinisateurs

En plantant 3 milliards d'arbres

En réduisant de 50 % d'ici à 2030 l'utilisation des pesticides

LA BIODIVERSITÉ À L'AGENDA DES POLITIQUES PUBLIQUES

La prise de conscience des enjeux de conservation de la nature dans les politiques publiques est « assez récente ». Il faut attendre les années 1960 avec la création des parcs nationaux et des réserves naturelles pour que la préservation d'un site pour ses qualités écologiques ou pour la protection d'un milieu, d'un habitat ou d'une espèce spécifique soit reconnue dans un texte législatif.

Depuis plusieurs années on observe une accélération du calendrier face au constat de l'érosion de la biodiversité. En 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages marque une nouvelle étape dans la protection et la valorisation du patrimoine naturel national, en portant notamment un objectif ambitieux d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité. Elle renforce également l'arsenal d'outils et de mesures comme la création de l'Office français de la biodiversité (OFB), nouvel interlocuteur privilégié accompagnant les acteurs et les territoires sur ces questions.
En 2018, le Plan biodiversité dont l'objectif vise la mobilisation de l'ensemble des acteurs (collectivités, associations, monde socio-économique et citoyens) autour de l'objectif commun de préservation de la biodiversité est mis en place.

À la suite de la crise de la Covid-19, le plan de relance national de 2020 rappelle l'importance stratégique de la biodiversité et de l'urgence climatique dans le renouveau des politiques publiques.

Sur la scène internationale, l'année 2021 devrait être marquée par un agenda chargé et des échéances cruciales comme le Congrès mondial de la nature, organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et la COP 15 de la convention de l'Organisation des Nations unies sur la biodiversité. Cette conférence est une échéance politique d'importance, fixant la feuille de route et les engagements de chaque État sur la décennie à venir.



Saga pedo

© MARIN MARMIER | CEN PACA

UNE MÉTROPOLE QUI AGIT POUR LA BIODIVERSITÉ

Consciente de la valeur de son patrimoine naturel et des menaces qui pèsent sur sa conservation, la Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite aujourd'hui renforcer sa politique en matière de biodiversité et d'espaces naturels.

L' atlas métropolitain de la biodiversité s'inscrit dans cet objectif. Il propose, à partir d'un état des lieux des connaissances de la faune, la flore et les habitats naturels connus sur le territoire, d'identifier et de qualifier les secteurs d'intérêt écologique.

Il a pour ambition d'intégrer dans les politiques sectorielles animées par la Métropole Aix-Marseille-Provence, une meilleure prise en compte des équilibres fragiles et des enjeux de conservation de la nature du territoire. Il permettra, entre autres, d'évaluer les politiques publiques mises en œuvre.

La réalisation de l'atlas est une démarche pluriannuelle et multi-partenariale. Pour en faire un document de référence scientifique la Métropole Aix-Marseille-Provence a collaboré avec les organismes régionaux reconnus dans la conservation de la nature : Le Conservatoire d'espaces naturels, la Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire botanique national de méditerranée.

UNE STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES RICHESSES ÉCOLOGIQUES DE LA MÉTROPOLE

2018

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ CONTINENTALE (FAUNE-FLORE)

Stratégie d'amélioration des connaissances :

- État des lieux des connaissances
- Enjeux d'amélioration de la connaissance
- Inventaires faune-flore sur des secteurs ciblés en lacune

2019

Définition de la patrimonialité et des enjeux de conservation de la biodiversité continentale.

2020

HABITATS NATURELS

Stratégie d'amélioration de la connaissance :

- État des lieux des connaissances
- Enjeux de conservation

Vers un plan d'actions spécifiques pour la Métropole

2021

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ MARINE

2022 →



Forêt de Saint-Pons à Gémenos

© JEAN-MARIE MUGGIANU

L'ATLAS MÉTROPOLITAIN DE LA BIODIVERSITÉ POUR :

- Produire une connaissance exploitable et valorisable de la faune, la flore et les habitats naturels à l'échelle de la métropole
- Assurer une meilleure prise en compte du patrimoine naturel dans les politiques publiques portées par la Métropole
- Identifier les enjeux de richesse écologique et les enjeux de conservation du patrimoine naturel
- Définir une stratégie d'intervention prioritaire : connaissance, protection, gestion, restauration, valorisation
- Développer une « culture métropolitaine autour de la biodiversité »

MÉTHODOLOGIE



Genêt de Lobel
© CBNMED | Y. MORVANT

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE

La réalisation de l'état des connaissances de la faune et de la flore continentale sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a débuté en 2018 avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB). Il repose sur la mobilisation d'un réseau d'experts scientifiques et naturalistes en région : le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) et le Conservatoire botanique national méditerranéen (CBNMed) ont défini la méthodologie d'évaluation de la connaissance. La Ligue de protection des oiseaux (LPO PACA) y a également contribué.

UN CHAMP D'ÉTUDE CENTRÉ SUR LA BIODIVERSITÉ CONTINENTALE

La biodiversité continentale est la cible de ce rapport. Le champ d'étude concerne l'ensemble des espèces animales et végétales connues sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence. Elles sont regroupées en 18 groupes taxonomiques par souci de classification et de simplification des analyses : les amphibiens, les arachnides, les mousses et lichens, les coléoptères, les crustacés, les hémiptères, les hétérocères, les mammifères dont les chauves-souris, les mollusques, les neuroptères, les odonates, les oiseaux, les orthoptères, les plantes vasculaires, les poissons d'eau douce, les reptiles et les rhopalocères.

La biodiversité marine, qui sera traitée en 2022, complétera cet atlas.

UNE MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE ET INNOVANTE

Forte du niveau d'expertise et des compétences du CEN PACA et du CBNMed, la démarche d'évaluation de la connaissance se décline en plusieurs étapes consistant à évaluer, pour chaque groupe taxonomique, la liste des espèces connues, sa complétude puis, quand cela est possible, leur répartition spatiale sur le territoire d'AMP.

ÉVALUATION DE LA CONNAISSANCE TAXONOMIQUE :

>>Quelles sont les espèces connues sur le territoire ?

Ce premier travail a consisté à lister, pour chaque groupe taxonomique retenu, les espèces connues sur le territoire métropolitain soit au regard des données d'observations naturalistes disponibles et/ou au regard d'ouvrages de référence (bibliographie, collection, etc.) documentant la présence d'espèces sur le territoire. Pour chaque groupe taxonomique, les experts ont pu définir un «niveau de connaissance taxonomique » : très lacunaire, partiel ou complet. Lorsque la liste des espèces est complète, elle est dénommée « liste taxonomique référence ».

ÉVALUATION DE LA CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE :

>> Comment sont réparties les espèces sur le territoire ?

Pour chaque groupe taxonomique, une analyse cartographique de la richesse spécifique a été réalisée à différentes échelles, par maille de 10 x 10 km et de 5 x 5 km. Cette analyse a permis d'avoir une répartition de la richesse spécifique par secteur géographique et de mettre en lumière ceux en lacune de connaissance.

L'analyse des données est aussi disponible à l'échelle communale et consultable auprès des services de la Métropole.

ESTIMATION DU NIVEAU DE COMPLÉTUDE DE LA CONNAISSANCE :

>> Est-ce que la richesse spécifique connue correspond à la richesse réelle ?

Pour chaque maille territoriale, un indice d'exhaustivité de la connaissance a été calculé. Cet indice témoigne de la relation entre, d'une part, le nombre cumulé d'espèces détectées sur la maille et, d'autre part, l'effort de prospection réalisé sur cette maille. Une courbe de raréfaction a été modélisée suivant l'idée simple selon laquelle le nombre de nouvelles espèces détectées diminuera lorsque le nombre de relevés sera suffisamment important sur la maille. Cet indice d'exhaustivité traduit l'état de la connaissance de chaque maille et peut être qualifié d'insatisfaisant, peu satisfaisant ou satisfaisant.

Cet outil a permis d'orienter les prospections vers les secteurs en lacune de connaissance et les espèces les moins bien connues.

ESTIMATION DU NIVEAU GLOBAL DE CONNAISSANCE GRÂCE À UN INDICATEUR SYNTHÉTIQUE


Le CEN PACA et le CBNMed, ont créé un indicateur synthétique d'état des connaissances scientifiques pour chaque groupe taxonomique. Il se base sur une échelle graduelle à 8 niveaux traduisant une progression de la connaissance de la faune et de la flore. Cette évaluation de la connaissance globale s'appuie sur le principe « qu'il n'est possible d'inventorier que ce que l'on connaît ».

La méthode d'évaluation s'appuie sur des critères de notation précis attribuant un indicateur de connaissance ayant une valeur de 0 à 8 pour chaque groupe d'espèces considéré :

- La note 0 signifiant qu'aucune source d'information n'est disponible.
- Les premières valeurs allant de 1 à 4 représentent le niveau de la connaissance taxonomique, c'est-à-dire quels taxons sont présents.
- Les niveaux supérieurs (note de 5 à 8) représentent la connaissance chorologique, c'est à dire la couverture géographique de l'inventaire.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE



CONNAISSANCE TAXONOMIQUE TRÈS LACUNAIRE

Échantillonnage très partiel à l'échelle du territoire ; très peu ou pas de données mobilisables ; bibliographie très lacunaire ; pas d'experts dans le territoire. Liste taxonomique très partielle pour le territoire.

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

Échantillonnage partiel à l'échelle du territoire ; données mobilisables mais non compilées ; bibliographie existante ou experts présents dans le territoire. Liste taxonomique partielle pour le territoire.


CONNAISSANCE TAXONOMIQUE NON ACTUALISÉE

Échantillonnage satisfaisant à l'échelle du territoire ; présence des taxons non systématiquement actualisée ; bibliographie ou experts mobilisables. Liste taxonomique de référence pour le territoire.

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE ACTUALISÉE

Échantillonnage satisfaisant à l'échelle du territoire ; présence des taxons actualisée pour la grande majorité ; bibliographie ou experts mobilisés. Liste taxonomique de référence actualisée pour le territoire.

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE



CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE TRÈS LACUNAIRE

Couverture du territoire très hétérogène ; fréquence et rareté des taxons non fiables ; données bibliographiques et réseau d'experts ou d'observateurs non mobilisés.

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE PARTIELLE

Couverture du territoire hétérogène ; données bibliographiques et réseau d'experts ou d'observateurs mobilisés ; inventaire non systématiquement actualisé (beaucoup de données >20-30 ans).

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE À LA RÉSOLUTION 10 KM

Couverture spatiale homogène à la résolution 10 km (exhaustivité >85 % pour plus de 90 % des mailles) ; moins de 10 % d'espèces à chorologie jugée lacunaire ; inventaire actualisé (données < 20-30 ans).

EXCELLENTE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE À LA RÉSOLUTION 5 KM


Couverture spatiale homogène à la résolution 5 km (exhaustivité >85 % pour plus de 90 % des mailles) ; moins de 5 % d'espèces à chorologie jugée lacunaire ; inventaire actualisé (données < 20-30 ans).

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

DES DONNÉES RÉCENTES ET NOMBREUSES


L'élaboration de l'atlas métropolitain de la biodiversité d'Aix-Marseille-Provence s'appuie sur l'analyse d'un jeu de données de près de 2 000 000 d'observations, dont 94 % datent d'après l'année 2000.

Les extractions des bases de données SILENE-PACA et Faune-PACA ont été réalisées respectivement en novembre 2018 et décembre 2018. Le jeu de données est constitué de toutes les données d'observations faunistiques et floristiques historiques et récentes sans borne d'ancienneté.



DYNAMIQUE DE GÉNÉRATION DES DONNÉES D'OCCURRENCE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SUR LA MÉTROPOLE AMP

Nombre d'observations par maille de 5 x 5 km



SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020 - RÉALISATION : AUPA

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Aucune donnée d'observation disponible ne signifie pas l'absence d'une espèce. En effet, il se peut qu'il n'y ait eu aucune campagne d'observation organisée dans un secteur et pour une espèce donnée ou que l'espèce n'aie pas été observée lors de campagnes pour de nombreuses raisons (saisonnalité, horaires d'observations, manque de compétence pour la reconnaissance...).

Le nombre d'observations sur les mailles périphériques ne concerne que le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

BASES DE DONNÉES

La connaissance de la biodiversité s'appuie sur un réseau collaboratif d'observateurs comprenant des professionnels, des bénévoles, des universités, des établissements publics de gestion et de protection de la nature ainsi que d'autres institutions. Ces données sont enregistrées dans différentes bases qui servent de portes d'entrée aux études naturalistes plus approfondies.

SILENE-PACA et Faune-PACA sont deux bases de données naturalistes régionales, véritables outils de mutualisation des connaissances de la faune et de la flore et dotées d'une garantie scientifique :

- SILENE-PACA est une plateforme publique animée par le CEN PACA sous l'égide de la DREAL et la Région. Elle vise l'amélioration des connaissances naturalistes et la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la biodiversité.
- Faune-PACA est un site collaboratif géré par la LPO PACA assurant la collecte, l'organisation et la restitution synthétique des données d'observation de la faune dans la région.

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes

UNE AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE EN CONTINUE

À la suite de l'analyse de l'état des lieux de la connaissance sur le territoire de la métropole, une stratégie d'amélioration de la connaissance faunistique a été proposée par le CEN PACA en 2019 et mise en œuvre entre 2019 et 2020. L'expertise du Conservatoire d'espaces naturels a eu pour objectif de compléter les listes d'espèces de certaines familles d'insectes (coléoptères et lépidoptères hétérocères) ne disposant pas de listes complètes grâce à des recherches d'ouvrages ciblées et de la saisie de données bibliographiques. En complément, le CEN PACA a réalisé des prospections ciblées sur des mailles identifiées en lacunes de connaissances pour certains groupes (odonates, orthoptères, rhopalocères, malacofaune, herpétofaune et avifaune). Ces prospections ont eu pour objectif de compléter l'inventaire de ces mailles en améliorant la liste des taxons présents sur ces secteurs.

Ces inventaires ont permis d'actualiser la liste d'espèces de 30 mailles au total. Sur les 1660 taxons contactés, 895 taxons ont vu leur répartition précisée puisqu'ils ont été observés pour la première fois sur à minima une nouvelle maille.
Au total, 123 856 nouvelles données ont été renseignées dans les bases de données régionales, tous groupes taxonomiques confondus, entre 2019 et 2020. Ces nouvelles données d'observations n'ont pas été intégrées à la présente analyse, elles seront exploitées lors de l'actualisation de l'état de la connaissance dans cinq ans.



© THOMAS DELATTRE



© PAULINE ROCHOTTE

ACTIONS PARTICIPATIVES

La LPO a organisé :

- Des camps de prospections sur 5 secteurs mal connus du territoire : la Côte Bleue, Marseille, le Pays d'Aix, le Pays Salonais et le Val de Durance (81 naturalistes mobilisés et 5 211 données collectées).
- Un concours naturaliste auprès de la communauté des naturalistes locaux afin d'accumuler de la connaissance sur les mailles méconnues pré-identifiées.
- Des journées de sciences participatives ont été animées sur plusieurs communes de la métropole, en proposant des comptages de nids d'Hirondelle, des balades « découverte de la nature » ainsi que des ateliers familiaux.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS



Bruant ortolan

© LPO | AURÉLIEN AUDEVARD

1 984 671 DONNÉES D'OBSERVATIONS SOURCES

5 801 TAXONS AVEC AU MOINS 1 OBSERVATION

94 % DES DONNÉES DATANT D'APRÈS 2000

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE*

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE*

*EXPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE EN PAGE 11

PLANTES VASCULAIRES

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

2 753
espèces rencontrées

385 881
observations

LES OISEAUX

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

385
espèces rencontrées

1 258 274
observations

LES LIBELLULES

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE PARTIELLE

58
espèces rencontrées

44 382
observations

LES MOLLUSQUES

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE TRÈS LACUNAIRE

171
espèces rencontrées

3 142
observations

LES COLÉOPTÈRES

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

636
espèces rencontrées

3 265
observations

LES PAPILLONS DE NUIT

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

962
espèces rencontrées

12 973
observations

LES REPTILES

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

20
espèces rencontrées

12 714
observations

LES AMPHIBIENS

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

11
espèces rencontrées

8 190
observations

LES MAMMIFÈRES

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE PARTIELLE

45
espèces rencontrées

26 243
observations

LES PAPILLONS DE JOUR

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE PARTIELLE

141
espèces rencontrées

198 602
observations

LES ORTHOPTÈRES

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE TRÈS LACUNAIRE

102
espèces rencontrées

25 814
observations

LES CHAUVES-SOURIS

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE TRÈS LACUNAIRE

25
espèces rencontrées

983
observations

LES POISSONS

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE NON ACTUALISÉE

51
espèces rencontrées

244
observations

LES MOUSSES ET LICHENS

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

144
espèces rencontrées

697
observations

LES NEUROPTÈRES

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

23
espèces rencontrées

304
observations

LES ARACHNIDES

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

170
espèces rencontrées

637
observations

LES CRUSTACÉS

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE TRÈS LACUNAIRE

14
espèces rencontrées

221
observations

LES HÉMIPTÈRES

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE TRÈS LACUNAIRE

149
espèces rencontrées

1 122
observations

MODE D'EMPLOI

La suite du document détaille l'état des connaissances de la biodiversité continentale sur le territoire de la métropole (jeu de données de novembre et décembre 2018).

Il est organisé sous forme de fiches synthétiques qui présentent les informations essentielles pour les 18 groupes d'espèces étudiés dans l'atlas. Selon le niveau de connaissance du groupe d'espèces, la fiche est structurée en une ou deux pages :

- Habitat et écologie
- Niveau de connaissance
- Chiffres clés pour les groupes d'espèces évalués
- Les cartes illustrant l'état de la connaissance des groupes d'espèces les mieux connus, c'est-à-dire dont l'indicateur de connaissance est supérieur ou égal à 5.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Afin de faciliter la compréhension de ce portrait de la biodiversité continentale, voici la définition de quelques termes utilisés qui ont été simplifiés par souci de compréhension de tous :

- **Les observations ou données d'observations** correspondent aux occurrences ou données d'occurrence pour une espèce
- **Un groupe d'espèces**, notion utilisée dans la présente étude correspond à un groupe taxonomique. Par exemple, les oiseaux.
- **La richesse spécifique** correspond au nombre d'espèces.

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE :

NIVEAU DE CONNAISSANCE

BILAN DES DONNÉES EXISTANTES ET ENJEU PRINCIPAL POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE TAXONOMIQUE DU GROUPE D'ESPÈCES CONSIDÉRÉ

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CHIFFRES CLÉS PRINCIPAUX SUR LE TERRITOIRE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE DU GROUPE D'ESPÈCES PRÉSENTÉ



HABITAT ET ÉCOLOGIE

La classe des arachnides regroupe plusieurs ordres d'arthropodes à huit pattes dont les araignées, opilions, scorpions, pseudoscorpions, acariens.
Ce groupe très diversifié est représenté dans tous les types de milieux naturels et artificiels, principalement terrestres.
Bien que les acariens soient nombreux, mais très peu connus, le plus grand nombre d'espèces concerne les araignées. Ces prédateurs chassent dans quasiment toutes les niches écologiques terrestres : prairies, feuillages des arbres, grottes, cultures même intensives, rocailles, zones humides. Chaque habitat est occupé par des associations particulières d'espèces. Beaucoup d'entre elles sont spécialisées, et certaines sont rares ou même en voie de disparition.

Trois espèces de scorpions sont connus localement, dont le rare Scorpion languedocien (*Buthus occitanus)*, grande espèce jaunâtre et au venin puissant, qui recherche les surfaces sablonneuses dans les milieux chauds. Le plus commun est le Scorpion noir à queue jaune (*Euscorpius flavicaudis)*, souvent trouvé dans les habitations humaines.
Concernant les autres arthropodes, les opilions ou faucheuses, sont des arachnides carnivores et inoffensifs, souvent détritivores.
Les pseudoscorpions sont des prédateurs ne mesurant que quelques millimètres, chassant leurs proies, par exemple des collemboles ou des larves d'acariens et de mouches. Bien qu'ils soient peu observés en raison de leur taille, leur présence est bénéfique dans les maisons.

.32

NIVEAU DE CONNAISSANCE

Avec 170 taxons recensés en base de données, la liste de référence est très incomplète. Elle représente probablement moins de 20 % de la richesse spécifique réelle du territoire d'Aix-Marseille-Provence.

Les rares mailles bénéficiant d'inventaire ponctuel d'arachnides sont au nombre de trois sur Beaurecueil, La Roque-d'Anthéron et le Puy-Sainte-Réparade avec respectivement 50, 74 et 64 espèces connues. Toutes les autres communes sont qualifiées de terra incognita.

Toutefois, il est a priori possible de constituer une liste d'espèces avancée (mais non exhaustive), les spécialistes sont présents et des données mobilisables. L'indicateur de connaissance des arachnides est estimé à 2 : connaissance taxonomique partielle.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

170 ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

1900 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

637 OBSERVATIONS

GROUPE EN DÉFAUT DE CONNAISSANCE ET DE RECONNAISSANCE
À L'ÉCHELLE MONDIALE



LE SAVIEZ-VOUS ?

DES ESPECES MENACÉES, CHEZ LES ARACHNIDES AUSSI

La Dolomède des marais est une belle et grande araignée pêcheuse, capable de capturer des têtards ou des petits poissons. Elle ne peuple que les marais préservés, dont la dégradation a conduit à sa régression généralisée. Désormais, elle est menacée de disparition dans la métropole comme ailleurs, et chaque site qui l'abrite devrait être protégé.

HABITAT ET ÉCOLOGIE

DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES MAJEURES DU GROUPE D'ESPÈCES ET DE LEURS SPÉCIFICITÉS D'HABITATS

" LE SAVIEZ-VOUS "

PRÉSENTATION D'UNE ESPÈCE DU GROUPE, D'UNE ANECDOTE OU D'UN SERVICE ECOSYSTÉMIQUE RENDU

LES AMPHIBIENS



Grenouille de Perez
© LPO | FRANCOIS GRIMAL

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Amphibien vient de *amphi*, signifiant « des deux côtés » et *bio*, « la vie ». Ce nom fait donc référence à leur cycle « à vie double » : aquatique et terrestre. Ce sont les premiers vertébrés qui ont conquis la terre ferme suivis des reptiles, oiseaux et mammifères.

Ils se répartissent en 2 groupes :

- Les anoures comprenant les grenouilles, les rainettes et les crapauds ;
- Les urodèles comprenant les tritons et les salamandres.

Ils ont la particularité de respirer en partie par leur peau qui est recouverte de mucus pour faciliter les échanges gazeux, maintenir l'humidité et les protéger de certaines contaminations fongiques.

Leur cycle de vie est rythmé en fonction des saisons. Ils ont ainsi besoins de milieux spécifiques pour chaque phase de vie (mares, forêts, prairies, etc.) qui doivent être reliés par des continuités écologiques pour permettre leur déplacement (ruisseaux, haies, canaux et ripisylve...).

Sur le territoire métropolitain, les étangs littoraux, zones humides et ripisylves sont des habitats privilégiés pour ce groupe.

Ces ambassadeurs des zones humides sont de très bons « bio-indicateurs » de la qualité des milieux.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

Onze espèces d'amphibiens sont connues sur la métropole Aix-Marseille-Provence. La liste taxonomique de référence est complète et actualisée. Des données d'occurrence sont présentes dans les bases de données pour la totalité des taxons connus, l'échantillonnage est satisfaisant à l'échelle du territoire.
La couverture du territoire en données est relativement homogène au maillage 10 x 10 km, la majorité des taxons ayant une bonne représentativité spatiale. Par contre, avec une analyse plus fine à la maille 5 x 5 km, de nombreux secteurs en lacunes de connaissance apparaissent.
En conclusion, l'indicateur de connaissance des amphibiens à l'échelle du territoire est évalué à 7 : bonne connaissance chorologique.



Rainette méridionale
© LPO | AURÉLIEN AUDEVARD

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

11
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

21 ESPÈCES EN RÉGION PACA
41 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

8190
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

11 ESPÈCES PROTÉGÉES RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE

3 ESPÈCES MENACÉES SUR LISTE ROUGE **RÉGIONALE**

2 ESPÈCES MENACÉES SUR LISTE ROUGE **NATIONALE**


LE SAVIEZ-VOUS ?

LES AMPHIBIENS, D'EXCELLENTS AUXILIAIRES DES CULTURES

Ils sont carnivores et se nourrissent essentiellement d'insectes et de mollusques (chenilles, limaces, escargots...). Ils sont extrêmement utiles aux abords des parcelles cultivées en agroécologie participant à la lutte contre les ravageurs de cultures.

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE

ENJEU PRINCIPAL POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE DU GROUPE D'ESPÈCES CONSIDÉRÉ




RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : AMPHIBIENS

Nombre d'espèces connues par maille de 5 x 5 km
- Aucune espèce connue*
- 1 espèce
- 2 espèces
- 3 espèces
- 4 espèces
- Plus de 4 (maximum : 7 espèces)

11 espèces recensées sur le territoire

*. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : AMPHIBIENS

Connaissance à la maille 5 x 5 km :
- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020
© AUPA

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE SUR LES AMPHIBIENS

La répartition de la plupart des taxons emblématiques est connue à l'échelle du territoire, cependant des lacunes de connaissance sont visibles pour certaines espèces. Les taxons présentant un enjeu de conservation et un déficit de connaissance sur le territoire métropolitain sont les suivants : le Triton palmé *Lissotriton helveticus*, l'Alyte accoucheur *Alytes obstetricans*, le Pélobate cultripède *Pelobates cultripes*, la Grenouille de Pérez *Pelophylax perezi*, le Grenouille de Graf *Pelophylax kl. Grafi*, le Discoglosse sarde *Discoglossus sardus* découvert récemment sur la commune de Marseille.

Les représentations cartographiques de l'état des connaissances démontrent des secteurs en manque de connaissance : la plaine de Trets-Auriol-Saint-Zacharie et la montagne de Vautubière sur les communes de Jouques, St-Paul-lès-Durance. Les prospections menées en 2019 et 2020 par les herpétologues du CEN PACA ont permis d'augmenter la complétude de la connaissance sur ces secteurs et 4 espèces ont bénéficié d'amélioration de la connaissance. Des recherches spécifiques pourraient confirmer la présence de la Salamandre tachetée, espèce inconnue dans les Bouches-du-Rhône mais historiquement mentionnée sur le secteur.



Salamandre tachetée
© AUPA

CARTOGRAPHIES

- RICHESSE SPÉCIFIQUE (NOMBRE D'ESPÈCES CONNUES POUR LE GROUPE CONSIDÉRÉ)
- L'ÉTAT GLOBAL DE LA CONNAISSANCE RÉPARTI EN TROIS CLASSES : SATISFAISANT/ PEU SATISFAISANT / INSATISFAISANT

LES MAMMIFÈRES
(HORS CHIROPTÈRES)



Hérisson d'Europe
© LPO | AURÉLIE JOHANET

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les populations de mammifères ont beaucoup évolué : certaines espèces, autrefois largement répandues, avaient disparu de la région. Elles recolonisent peu à peu leur zone historique de présence, depuis l'Italie pour le Loup gris (*Canis lupus*) et vraisemblablement depuis la vallée du Rhône pour la Loutre (*Lutra lutra*) ou encore le castor (*Castor fiber*). D'autres ont été introduites comme le Ragondin, le Lièvre ibérique ou la Genette commune.

Plus de la moitié des espèces de mammifères présentes en France métropolitaine sont représentées sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Très diversifiés dans leurs rythmes de vie et régimes alimentaires, les mammifères sont présents dans l'ensemble des milieux. Néanmoins, certaines espèces sont inféodées à des habitats particuliers comme les taupes (*Talpa europaea)* et campagnols (*Microtus agrestis*) en milieux agricoles ou le Lérot (*Eliomys quercinus*) dans les zones rocheuses.
Enfin, pour les grands mammifères, comme par exemple le Mouflon méditerranéen (*Ovis gmelinii*), il est crucial que de vastes espaces naturels soient reliés.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La liste d'espèces des mammifères est complète pour le territoire d'Aix-Marseille-Provence. Parmi les 45 espèces, la majorité des données concernent les macro-mammifères, en opposition au micro-mammifères de petite taille : il s'agit des carnivores, des ongulés, les lagomorphes, les grands rongeurs.
La couverture spatiale à la maille 10 x 10 km est bien connue et la connaissance est homogène à l'exception de certains secteurs moins prospectés.
A une échelle plus fine (maille 5 x 5 km), de nombreuses mailles présentent des lacunes de connaissance.
Pour les micro-mammifères, la plupart des secteurs sont mal connus dès la maille 10 x 10 km.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE PARTIELLE

45
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

72 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

26 243
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

8
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE

2
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE NATIONALE




Renard roux
© WIKIMEDIA COMMONS | PETER TRIMMING

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE RENARD ROUX, UN ACTEUR PRÉCIEUX DES CHAÎNES ALIMENTAIRES

Le Renard roux (*Vulpes vulpes*) joue un rôle indispensable dans l'élimination des animaux faibles ou malades, évitant ainsi pullulations et épidémies.

Il est aussi très utile pour l'agriculture en se délectant des petits rongeurs ravageurs de cultures.




RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)

Nombre d'espèces connues par maille de 5 x 5 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 4 espèces
- 5 à 9
- 10 à 14
- 15 à 19
- Plus de 19 (maximum : 29 espèces)

45 espèces recensées sur le territoire

[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)

Connaissance à la maille 5 x 5 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES MAMMIFÈRES

Le principal enjeu de connaissance pour les mammifères est d'améliorer la connaissance chorologique des espèces. Le 1er objectif est d'améliorer la connaissance chorologique des macro-mammifères à l'échelle 5 x 5 km en ciblant les mailles en gros déficit de connaissance. En 2ème lieu, il s'agit de préciser la répartition de la connaissance des micro-mammifères à la maille 10 x10 km, comme le Crossope aquatique et le Pachyure étrusque.

La difficulté d'étudier ce groupe, en particulier les petits mammifères terrestres, réside dans la nécessité d'engager une pression d'échantillonnage très élevée pour obtenir des résultats probants. De plus, les méthodes d'acquisitions de connaissances sont complexes à mettre en œuvre, les protocoles sont très contraignants et logistiquement lourds (autorisation de capture des animaux par pose de pièges non vulnérants).

D'un point de vue territorial, pour l'ensemble des 45 taxons, on observe des lacunes de connaissance sur les secteurs situés au nord de Salon-de-Provence, à la périphérie ouest de Venelles et d'Aix-en-Provence ainsi que dans la plaine de Trets.

La plupart des taxons emblématiques sont connus à l'échelle du territoire, cependant des lacunes de connaissance de leur répartition existent pour certains d'entre eux.



Campagnol amphibie

© JC. TEMPIER | CEN PACA

LES CHAUVES-SOURIS
OU CHIROPTÈRES



Minioptère de Schreiber
© LPO | LAURENT ROUSCHMEYER

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La liste d'espèces de chiroptères est complète pour le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
La répartition géographique des espèces n'est en revanche pas bien connue, des lacunes de connaissance dans de multiples secteurs apparaissent à l'échelle communale. La couverture spatiale est très hétérogène et le niveau de connaissance est globalement insatisfaisant. Le réseau d'experts est présent sur le territoire et mobilisable.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE TRÈS LACUNAIRE

25
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

30 ESPÈCES EN RÉGION PACA
34 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

983
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

25
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE

1
ESPÈCE MENACÉE
SUR LISTE ROUGE NATIONALE

HABITAT ET ÉCOLOGIE


Les chauves-souris (ou chiroptères) sont un sous-groupe de mammifères qui sont les seuls capables de vol actif. Elles chassent et se déplacent grâce à l'écholocation, en émettant des ultrasons qui se réfléchissent et leur permettent de localiser avec précision leurs proies.

Les cours d'eau et leurs abords boisés sont les habitats privilégiés de bon nombre d'espèces comme le Murin de Capaccini qui chasse ses proies au-dessus de la surface de l'eau.

Les milieux agricoles extensifs avec leurs cultures en mosaïque, les haies, les vieilles bâtisses sont des secteurs d'intérêt pour les chauves-souris.

Elles sont des indicateurs du bon état écologique des milieux, notamment pour les espèces spécialistes comme le Murin de Bechstein. Sa présence est en effet directement influencée par la gestion des milieux forestiers et le bon état écologique de ces derniers.

Le territoire d'Aix-Marseille-Provence abrite des gites d'importance pour la conservation des chauves-souris, notamment les massifs calcaires de Sainte-Victoire, de la Sainte-Baume, des Calanques, la Camargue et le pourtour de l'étang de Berre. Des sites historiques autour de l'aire marseillaise sont également connus, en l'occurrence sur le massif de l'Étoile.




Petit rhinolophe
© JC. TEMPIER | CEN PACA

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES GÎTES INÉDITS

Les sites souterrains d'origine humaine, parfois marqueurs de l'histoire industrielle des territoires (mines, carrières, tunnels artificiels...), représentent des gîtes de substitution aux cavités naturelles et aux milieux rupestres, favorables pour les chauves-souris cavernicoles comme le Murin de Capaccini et le Minioptère de Schreibers. Elles peuvent les utiliser pour assurer toute ou partie de leur cycle de vie soit en reproduction, en hibernation ou encore en transit (déplacements vers les gites d'été et d'automne).



[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : CHAUVES-SOURIS

Nombre d'espèces connues par commune

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 3 espèces
- 4 à 5
- 6 à 8
- 9 à 12
- Plus de 12 (maximum : 16 espèces)


25 espèces recensées sur le territoire

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE SUR LES CHIROPTÈRES

Le jeu de données utilisé pour l'analyse est partiel car une partie des observations des chauves-souris, considérées comme sensibles, n'est pas disponible.

Parmi les 25 taxons présents sur le territoire, certains à forts enjeux sont identifiés en lacune de connaissance et méritent de bénéficier d'inventaires : le Murin de Bechstein, le Murin de Capaccini, le Murin à oreilles échancrées, le Minioptère de Schreibers, le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Petit Murin.

Le groupe chiroptères de Provence, association spécialisée dans la connaissance et la protection des chauves-souris, dispose de plus de 45 000 données dans toute la région.



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : CHAUVES-SOURIS

Connaissance à la commune :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA



Murins de Bechstein

© JOSEPH CELSE

LES OISEAUX



Traquet oreillard
© LPO | AURÉLIEN AUDEVAR

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les oiseaux sont présents dans la quasi-totalité des écosystèmes mondiaux et représentent le groupe faunistique le plus étudié au monde.

Une grande diversité d'espèces est observable localement en lien avec la mosaïque des milieux et la situation géographique d'interface de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, entre le littoral méditerranéen et l'arrière pays provençal. Certains oiseaux ne font que transiter (période de migration), d'autres espèces sont strictement sédentaires.

Les oiseaux occupent tous les écosystèmes mais beaucoup affectionnent les zones humides (lagunes méditerranéennes, lacs, retenues, salins...) dont la préservation est à ce titre prioritaire. Les rivages accueillent plus de 70 % des espèces d'oiseaux de France qui s'y alimentent en halte migratoire, notamment des espèces très rares comme le Gravelot à collier interrompu, la Sterne hansel ou encore le Goéland railleur.

Le territoire accueille des espèces emblématiques, notamment des oiseaux marins, des grands rapaces mais aussi des oiseaux « communs » rattachés aux milieux forestiers, aux bâtis ou aux milieux agricoles.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La liste taxonomique de référence est complète et actualisée sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence. La couverture spatiale à l'échelle 10 x 10 km est homogène à quelques secteurs près et le niveau de connaissance est considéré comme satisfaisant. La couverture spatiale à l'échelle 5 x 5 km est, quant à elle, assez hétérogène. Si l'on constate une bonne couverture des données d'espèces nicheuses, les données des espèces hivernantes et migratrices sont quant à elles assez hétérogènes. Les experts sont présents et organisés en groupe de travail.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

385
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

581 ESPÈCES EN RÉGION PACA
596 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

1 258 274
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

296
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE

101
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE RÉGIONALE

72
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE NATIONALE




Goéland railleur
© LPO | AURÉLIEN AUDEVARD

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES OISEAUX, TÉMOINS DE LA SANTÉ DES ÉCOSYSTÈMES

Ils jouent plusieurs rôles clés dans le fonctionnement des milieux naturels : les espèces phytophages (folivores et granivores) régulent la production végétale et contribuent à la dispersion des végétaux en disséminant leurs graines. Les prédateurs (insectivores, piscivores et carnivores), quant à eux, contrôlent les populations des autres espèces, évitant ainsi leur prolifération. Pour leur part, les charognards jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les maladies en nettoyant les écosystèmes.




[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : OISEAUX

Nombre d'espèces connues par maille de 5 x 5 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 51 espèces
- 52 à 102
- 103 à 138
- 139 à 189
- Plus de 189 (maximum : 285 espèces)

385 espèces recensées sur le territoire



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : OISEAUX

Connaissance à la maille 5 x 5 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE SUR LES OISEAUX

L'enjeu de connaissance pour les oiseaux est de préciser la connaissance chorologique des taxons en déficit de connaissance et de combler les secteurs en lacune à une échelle de maille 5 x 5 km.
Les mailles bénéficiant de recherches prioritaires sont :

- La montagne du Regagnas, le massif Concors, la montagne des Ubacs, la forêt communale de Peyrolles et de la Keyrié ;
- La Chaîne de l'Estaque entre Carro et Le Rove ; le sud de la vallée de l'Arc entre Cabriès et Trets et entre Lambesc et Venelles.

Le camp de prospection participatif organisé par la LPO PACA au printemps 2019 sur la chaîne de l'Estaque, a confirmé la présence déjà connue de 53 espèces d'oiseaux nicheurs dont l'Aigle de Bonelli, le Monticole bleu, l'Alouette Lulu, la Fauvette pitchou, le Pipit rousseline, le Fou de Bassan.

Six secteurs en lacune de connaissance ont fait l'objet d'inventaires ciblés de la part du CEN PACA, en 2019 et 2020. Les prospections réalisées ont permis d'inventorier de nouvelles espèces sur plusieurs mailles d'étude et ont aussi permis de préciser les aires de répartition pour 430 espèces :

- 4 nouvelles espèces inventoriées sur les 2 mailles des piémonts de Concors et de la montagne des Ubacs, dont 2 protégées au niveau national (Busard cendré, Bondrée apivore) ;
- 21 nouvelles espèces inventoriées sur les 3 mailles des plaines agricoles entre Rognes et Venelles dont 19 protégées au niveau national, 1 espèce classée en danger sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, ainsi que 1 espèce classée vulnérable et 2 espèces en danger critique d'extinction au niveau national.

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA

LES REPTILES



Couleuvre de Montpellier
© NICOLAS FUENTO | LPO

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Reptile vient du latin reptare qui signifie ramper. Ils comprennent les serpents, lézards, crocodiles et tortues qui ont tous une peau couverte d'écailles.

Ce sont des animaux « à température variable » donc très sensibles au climat et à la météo. L'hiver, ils doivent trouver des gîtes ne risquant pas d'être inondés et leur permettant de maintenir une température corporelle supérieure à 8 °C. L'été, contrairement aux idées reçues, ils sont sensibles aux fortes chaleurs.

Les reptiles sont présents dans l'ensemble des milieux méditerranéens, des massifs secs aux zones humides et petits cours d'eau.

De nombreuses espèces apprécient les milieux anthropisés tels que les murets en pierres sèches des restanques, les haies des espaces agricoles ou encore les tas de bois.

L'entretien des milieux ouverts, notamment par le pâturage, est indispensable au maintien des habitats pour les espèces autochtones méditerranéennes.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

Un total de 20 taxons a été identifié sur la métropole Aix-Marseille-Provence. L'échantillonnage est satisfaisant à l'échelle du territoire. Des données d'observations sont présentes dans les bases de données pour la totalité des espèces. La connaissance des reptiles à l'échelle du territoire est bonne.
La couverture est relativement homogène à la maille 10 x 10 km. À une échelle plus fine, des secteurs apparaissent en lacune de connaissance. Le réseau d'observateurs et d'experts est présent et organisé en territoire.



Tarente de Maurétanie
© MARION DI LIELLO | AMP

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

20
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

32 ESPÈCES EN RÉGION PACA
39 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

12 714
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

17
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE


2
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE RÉGIONALE

3
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE NATIONALE

LE SAVIEZ-VOUS ?

PAS DE LÉZARD !

Les geckos sont des lézards qui disposent, sous leurs doigts, des lamelles adhésives microscopiques leur permettant de grimper à quasi toutes les surfaces. Un seul doigt leur suffit pour rester suspendus au plafond. L'espèce la plus connue est la Tarente de Maurétanie que l'on peut observer facilement sur les murs des maisons.



[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : REPTILES

Nombre d'espèces connues par maille de 5 x 5 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 2 espèces
- 3 à 5
- 6 à 8
- 9 à 11
- Plus de 11 (maximum : 15 espèces)


20 espèces recensées sur le territoire

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE SUR LES REPTILES

Les deux principaux objectifs sont de maintenir le bon niveau de connaissance actuel en visant la meilleure connaissance chorologique possible à la maille 5 x 5 km et en améliorant les connaissances de la répartition des espèces les plus menacées présentes sur le territoire.

Les camps de prospection, organisés en 2019 par la LPO, ont déjà permis de recueillir 78 données supplémentaires, qui ont été versées dans les bases de données. Par exemple, le camp organisé sur le Pays Salonais a mis en évidence la présence du Psammodrome d'Edwards, de la Couleuvre de Montpellier, du Lézard à deux raies, de la Tarente de Maurétanie et du Lézard des Murailles.

Les secteurs de la plaine de Trets, des piémonts nord du Regagnas ainsi que le nord-est du territoire sur Jouques et Saint-Paul-lès-Durance ont fait l'objet de prospections ciblées. Grâce aux herpétologues du CEN PACA, ces inventaires supplémentaires ont permis d'actualiser les données de présence déjà connue de certaines espèces et d'ajouter 3 nouvelles espèces non inventoriées jusqu'alors sur ces secteurs.



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : REPTILES

Connaissance à la maille 5 x 5 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA



Lézard ocellé

© NICOLAS FUENTO | LPO

LES AMPHIBIENS



Grenouille de Perez
© LPO | FRANÇOIS GRIMAL

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Amphibien vient de *amphi*, signifiant « des deux côtés » et *bio*, « la vie ». Ce nom fait donc référence à leur cycle « à vie double » : aquatique et terrestre. Ce sont les premiers vertébrés qui ont conquis la terre ferme suivis des reptiles, oiseaux et mammifères.

Ils se répartissent en 2 groupes :

- Les anoures comprenant les grenouilles, les rainettes et les crapauds ;
- Les urodèles comprenant les tritons et les salamandres.

Ils ont la particularité de respirer en partie par leur peau qui est recouverte de mucus pour faciliter les échanges gazeux, maintenir l'humidité et les protéger de certaines contaminations fongiques.

Leur cycle de vie est rythmé en fonction des saisons. Ils ont ainsi besoins de milieux spécifiques pour chaque phase de vie (mares, forêts, prairies, etc.) qui doivent être reliés par des continuités écologiques pour permettre leur déplacement (ruisseaux, haies, canaux et ripisylve...).

Sur le territoire métropolitain, les étangs littoraux, zones humides et ripisylves sont des habitats privilégiés pour ce groupe.

Ces ambassadeurs des zones humides sont de très bons « bio-indicateurs » de la qualité des milieux.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

Onze espèces d'amphibiens sont connues sur la métropole Aix-Marseille-Provence. La liste taxonomique de référence est complète et actualisée. Des données d'occurrence sont présentes dans les bases de données pour la totalité des taxons connus, l'échantillonnage est satisfaisant à l'échelle du territoire.
La couverture du territoire en données est relativement homogène au maillage 10 x 10 km, la majorité des taxons ayant une bonne représentativité spatiale. Par contre, avec une analyse plus fine à la maille 5 x 5 km, de nombreux secteurs en lacunes de connaissance apparaissent.
En conclusion, l'indicateur de connaissance des amphibiens à l'échelle du territoire est évalué à 7 : bonne connaissance chorologique.



Rainette méridionale
© LPO | AURÉLIEN AUDEVARD

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

11
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

21 ESPÈCES EN RÉGION PACA

41 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

8 190
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

11
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE


3
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE RÉGIONALE

2
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE NATIONALE

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES AMPHIBIENS, D'EXCELLENTS AUXILIAIRES DES CULTURES

Ils sont carnivores et se nourrissent essentiellement d'insectes et de mollusques (chenilles, limaces, escargots...). Ils sont extrêmement utiles aux abords des parcelles cultivées en agroécologie participant à la lutte contre les ravageurs de cultures.




[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : AMPHIBIENS

Nombre d'espèces connues par maille de 5 x 5 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 espèce
- 2 espèces
- 3 espèces
- 4 espèces
- Plus de 4 (maximum : 7 espèces)

11 espèces recensées sur le territoire



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : AMPHIBIENS

Connaissance à la maille 5 x 5 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE SUR LES AMPHIBIENS

La répartition de la plupart des taxons emblématiques est connue à l'échelle du territoire, cependant des lacunes de connaissance sont visibles pour certaines espèces. Les taxons présentant un enjeu de conservation et un déficit de connaissance sur le territoire métropolitain sont les suivants : le Triton palmé (*Lissotriton helveticus)*, l'Alyte accoucheur (*Alytes obstetricans)*, le Pélobate cultripède (*Pelobates cultripes)*, la Grenouille de Pérez (*Pelophylax perezi)*, le Grenouille de Graf (*Pelophylax kl. Grafi)* et le Discoglosse sarde (*Discoglossus sardus),* découvert récemment sur la commune de Marseille.

Les représentations cartographiques de l'état des connaissances démontrent des secteurs en manque de connaissance : la plaine de Trets-Auriol-Saint-Zacharie et la montagne de Vautubière sur les communes de Jouques et Saint-Paul-lès-Durance. Les prospections menées en 2019 et 2020 par les herpétologues du CEN PACA ont permis d'augmenter la complétude de la connaissance sur ces secteurs et 4 espèces ont bénéficié d'amélioration de la connaissance. Des recherches spécifiques pourraient confirmer la présence de la Salamandre tachetée, espèce inconnue dans les Bouches-du-Rhône mais historiquement mentionnée sur le secteur.



Salamandre tachetée

© AUPA

LES POISSONS D'EAU DOUCE
(HORS MILIEUX MARINS)



Brochet
© GILLES SAN MARTIN | FLICKR

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La liste taxonomique comprend 51 espèces. Cependant, ce ne sont que 25 taxons qui ont des données d'occurrence. Le jeu de données ayant été utilisé ne représente pas la connaissance réelle de ce groupe. Par conséquent, l'indicateur de connaissance est évalué à 3 avec une connaissance taxonomique non actualisée.

La bibliographie est existante et les experts sont présents dans le territoire. L'état des lieux fera l'objet d'une analyse spécifique ultérieurement.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE NON ACTUALISÉE

51
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

822 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

244
OBSERVATIONS

GROUPE EN DÉFAUT DE CONNAISSANCE ET DE RECONNAISSANCE
À L'ÉCHELLE MONDIALE

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Leurs habitats varient en fonction de paramètres tels que la température et la teneur en oxygène de l'eau, l'organisation physique du cours d'eau (berges ou zones plus profondes) ainsi qu'en fonction de leurs stratégies reproductives et alimentaires.

Parmi les espèces d'eau douce présentes, certaines sont en danger d'extinction et protégées (inter) nationalement comme l'Apron du Rhône qui n'est plus présent que dans la partie avale de la Durance et du Rhône.
Le Brochet (*Esox lucius*), qui se reproduit sur les prairies inondables et herbiers aquatiques en régression, est également une espèce menacée.

Ou encore, le Barbeau méridional, considéré comme quasi-menacé, qui peut survivre dans des flaques et vasques d'eau temporaires.

Enfin, on rencontre également certaines espèces introduites et invasives susceptibles de créer des déséquilibres biologiques comme la Perche soleil ou le Silure glane.



Apron du Rhône
© RÉMI CHAPPAZ

LE SAVIEZ-VOUS ?

DE L'IMPORTANCE DU MAINTIEN DES CONTINUITÉS AQUATIQUES

Certains poissons vivent alternativement en eau douce et en mer, on les appelle « amphihalins ». Afin de garantir le cheminement des espèces migratrices qui parcourent les cours d'eau métropolitains, il est crucial de préserver les écoulements naturels afin de ne pas créer de discontinuités qui priveraient ces espèces de leurs lieux de reproduction ou d'hivernage.

LES CRUSTACÉS
(HORS MILIEUX MARINS)



Cloporte commun
© WIKIMEDIA COMMONS | FRANCO FOLINI

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les crustacés représentent un groupe faunistique diversifié de plus 50 000 espèces dans le monde (4 080 en France métropolitaine, INPN 2020), dont la plupart sont aquatiques.

Ils sont constitués d'un exosquelette, c'est-à-dire d'une carapace imprégnée de calcium. Ils marchent ou rampent sur les fonds marins (surtout vase et sable) ou nagent à leur voisinage et existent à toutes les latitudes.
Pour autant, il existe des crustacés terrestres dont les isopodes. Parmi les crustacés terrestres, le Cloporte est l'espèce la plus connue. Ils sont adaptés à de nombreux milieux : frange littorale, garrigue, forêt, pelouse rocailleuse, pinède, ripisylve.

Les autres crustacés continentaux sont aquatiques et colonisent toutes sortes de milieux, par exemple des rivières (notamment des décapodes et amphipodes), des eaux souterraines ou des mares temporaires, surtout des branchiopodes et copépodes.

On y trouve des espèces comestibles comme les crevettes, crabes et écrevisses.

Les espèces marines (langoustes, homards et araignées de mer) ne sont pas incluses dans la présente analyse et seront abordées dans le volet marin de l'atlas métropolitain de la biodiversité.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La connaissance taxonomique des crustacés est très lacunaire (indicateur de connaissance IC = 1), puisque l'échantillonnage sur lequel s'appuie l'état des lieux des connaissances des crustacés est très partiel (14 taxons identifiés).
Une liste des espèces connues pour le territoire est envisageable mais elle nécessite un travail conséquent de compilation des données bibliographiques et de mobilisation des experts. Dans un premier temps, l'effort pourrait être concentré sur certaines familles pour lesquelles des experts et de la bibliographie sont facilement mobilisables.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE TRÈS LACUNAIRE

14
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

4080 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

221
OBSERVATIONS

GROUPE EN DÉFAUT DE CONNAISSANCE ET DE RECONNAISSANCE
À L'ÉCHELLE MONDIALE



Artemia salina
© WIKIMEDIA COMMONS | FUNDACIONVALLESALADO

Flamants roses - Camargue
© AUPA

LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE COULEUR SI IDENTITAIRE

Symbole de la Camargue, le flamant rose que l'on retrouve dans les anciens salins à l'ouest du territoire, acquiert un plumage coloré à l'âge adulte, par la consommation importante de petits crustacés, notamment l'*Artemia salina*, dont il fixe les pigments (caroténoïdes) en fouillant dans la vase avec son bec filtrant.

LES MOLLUSQUES
(HORS MILIEUX MARINS)



Helicodonta obvoluta
© MARIN MARMIER | CEN PACA

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les mollusques « continentaux » comprennent les gastéropodes (escargots et limaces) et bivalves (strictement aquatiques). La malacofaune se retrouve dans une grande diversité d'habitats, et chacun d'eux abrite un cortège spécifique.

On peut retrouver cette richesse dans les zones humides telles que les marais, ripisylves ou encore les prairies hygrophiles. À titre d'exemple, le Planorbe des étangs (*Planorbarius corneus*) est spécifique aux eaux stagnantes ou de faible débit.

Certaines espèces sont inféodées aux milieux secs, dans les garrigues, pinèdes et pelouses xériques comme la très rare Brillante fragile (*Hypnophila boissii*) ou l'Hélice caracol (*Caracollina lenticula*).

D'autres sont exclusivement présentes sur les falaises, elles sont dites « rupestres » comme le très localisé Maillot de la Sainte-Baume (*Granaria stabilei anceyi*).

Parmi elles, des escargots préfèrent la litière des forêts de feuillus. La Luisante des oliviers (*Retinella olivetorum*) ainsi que la Limace léopard (*Limax maximus*) affectionnent les boisements frais et humides.

Enfin, certains fréquentent des milieux anthropisés, comme les cultures, jardins et bords de routes. On peut citer le Petit-gris (*Cornu aspersum*) et des limaces comme la Loche laiteuse (*Deroceras reticulatum*).

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La liste taxonomique de référence est actualisée et comprend 171 espèces. Des données d'occurrence sont présentes pour une majorité des taxons à l'échelle du territoire. La connaissance est donc actualisée. Cependant, pour la grande majorité des taxons, la connaissance de leur répartition n'est pas actualisée par manque de données récentes.
La couverture du territoire en données d'occurrence est très hétérogène. Dès le maillage 10 x 10 km, seulement quelques mailles présentent une bonne connaissance.
L'indicateur de connaissance des mollusques terrestres est évalué à 5 : connaissance chorologique très lacunaire.



Monacha cartusiana
© MARIN MARMIER | CEN PACA

LE SAVIEZ-VOUS ?

TÉMOIN DE LA QUALITÉ ET DE L'ÉVOLUTION DES MILIEUX

Les coquilles d'escargot sont étudiées pour retracer l'histoire des paysages et de l'homme puisqu'elles peuvent se conserver sur de longues périodes. Les mollusques continentaux de petites tailles, caractérisés par une faible mobilité, sont plus vulnérables aux phénomènes de perturbations des écosystèmes.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE TRÈS LACUNAIRE


171
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON
344 ESPÈCES EN RÉGION PACA
705 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

3 142
OBSERVATIONS

STATUT DES ESPÈCES

1
ESPÈCE PROTÉGÉE
RECENSÉE SUR LE TERRITOIRE




[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : MOLLUSQUES

Nombre d'espèces connues par maille de 10 x 10 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 3 espèces
- 4 à 12
- 13 à 22
- 23 à 35
- Plus de 35 (maximum : 56 espèces)

171 espèces recensées sur le territoire



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : MOLLUSQUES

Connaissance à la maille 10 x 10 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES MOLLUSQUES

Le principal enjeu est d'améliorer la connaissance de la répartition spatiale des taxons à la maille 10 x 10 km en ciblant les mailles en important déficit de connaissance afin d'avoir un inventaire homogène à cette échelle. Le second objectif est de préciser la répartition des espèces emblématiques.

Des inventaires ciblés de la malacofaune, en 2019 et 2020, ont permis d'actualiser la présence déjà connue de certaines espèces et d'ajouter de nouvelles espèces non recensées jusqu'alors :

- Sur le secteur de Fos, 3 nouvelles espèces typiques des milieux littoraux méditerranéens ont été recensées. Deux espèces ciblées spécifiquement par cet inventaire (*Xerosecta explanata* et *Cochlicella conoidea*) n'ont pas été contactées. La connaissance est jugée encore insatisfaisante sur ce secteur.
- Sur 2 mailles d'étude de Sainte-Victoire : 9 nouvelles espèces typiques des montagnes calcaires provençales ont été recensées.



Zebrina detrita

© MARIN MARMIER | CEN PACA

LES ARACHNIDES



Philaeus chrysops
©MARIN MARMIER | CEN PACA

HABITAT ET ÉCOLOGIE

La classe des arachnides regroupe plusieurs ordres d'arthropodes à huit pattes dont les araignées, opilions, scorpions, pseudoscorpions, acariens.
Ce groupe très diversifié est représenté dans tous les types de milieux naturels et artificiels, principalement terrestres.
Bien que les acariens soient nombreux, mais très peu connus, le plus grand nombre d'espèces concerne les araignées. Ces prédateurs chassent dans quasiment toutes les niches écologiques terrestres : prairies, feuillages des arbres, grottes, cultures même intensives, rocailles, zones humides. Chaque habitat est occupé par des associations particulières d'espèces. Beaucoup d'entre elles sont spécialisées, et certaines sont rares ou même en voie de disparition.

Trois espèces de scorpions sont connues localement, dont le rare Scorpion languedocien (*Buthus occitanus)*, grande espèce jaunâtre et au venin puissant, qui recherche les surfaces sablonneuses dans les milieux chauds. Le plus commun est le Scorpion noir à queue jaune (*Euscorpius flavicaudis)*, souvent trouvé dans les habitations humaines.
Concernant les autres arthropodes, les opilions ou faucheuses, sont des arachnides carnivores et inoffensifs, souvent détritivores.
Les pseudoscorpions sont des prédateurs ne mesurant que quelques millimètres, chassant leurs proies, par exemple des collemboles ou des larves d'acariens et de mouches. Bien qu'ils soient peu observés en raison de leur taille, leur présence est bénéfique dans les maisons.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

Avec 170 taxons recensés en base de données, la liste de référence est très incomplète. Elle représente probablement moins de 20 % de la richesse spécifique réelle du territoire d'Aix-Marseille-Provence.

Les rares mailles bénéficiant d'inventaire ponctuel d'arachnides sont au nombre de trois sur Beaurecueil, La Roque-d'Anthéron et le Puy-Sainte-Réparade avec respectivement 50, 74 et 64 espèces connues. Toutes les autres communes sont qualifiées de terra incognita.

Toutefois, il est a priori possible de constituer une liste d'espèces avancée (mais non exhaustive), les spécialistes sont présents et des données mobilisables. L'indicateur de connaissance des arachnides est estimé à 2 : connaissance taxonomique partielle.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

170
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

1900 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

637
OBSERVATIONS

GROUPE EN DÉFAUT DE CONNAISSANCE ET DE RECONNAISSANCE
À L'ÉCHELLE MONDIALE



Thomisus onustus
© SONIA RICHAUD | CEN PACA

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES ESPECES MENACÉES, CHEZ LES ARACHNIDES AUSSI

La Dolomède des marais est une belle et grande araignée pêcheuse, capable de capturer des têtards ou des petits poissons. Elle ne peuple que les marais préservés, dont la dégradation a conduit à sa régression généralisée. Désormais, elle est menacée de disparition dans la métropole comme ailleurs, et chaque site qui l'abrite devrait être protégé.

LES COLÉOPTÈRES



Oryctes nasicornis
© MARIE-LINE BOISSY

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les coléoptères sont des insectes qui ont la particularité d'avoir une paire d'ailes coriaces (les élytres) qui protège la seconde paire d'ailes membraneuses, généralement fonctionnelles pour le vol.

Un grand nombre d'espèces sont spécialisées, grâce à leur régime alimentaire ou la niche écologique qu'elles occupent. Ainsi, au sein du territoire métropolitain, 71 espèces appartiennent à la liste des espèces « Remarquables » et « Déterminantes », qui servent au niveau régional, à désigner et décrire les Zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF).

Parmi ces espèces rares ou spécialisées, se trouvent des bousiers coprophages (qui mangent les excréments de mammifères) et qui jouent un rôle essentiel de dispersion des graines, notamment dans les espaces pastoraux comme la Crau. D'autres espèces, comme la Cicindèle des sables (*Cylindera arenaria)*, ne sont trouvées qu'en bordure de la Durance, sur les plages de limons et de sable, et permettent d'évaluer l'état écologique des rivières naturelles. Dans les milieux forestiers, ce sont les espèces saproxyliques, liées au bois sénescent ou mort, qui sont de précieux bio-indicateurs pour décrire le milieu et connaître son degré de naturalité. Parmi ces dernières, citons le Pique-prune (*Osmoderma eremita*), qui peuple notamment la chênaie de Cadarache. Enfin, le territoire métropolitain se distingue par la présence d'espèces endémiques, comme l'Orthome barbare (*Orthomus barbarus),* qui n'existe que dans l'archipel marseillais, ou le Bupreste de Crau (*Acmaeoderella perroti)*, dont la répartition va de la Crau au nord de Marseille.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

Certaines familles de coléoptères sont mieux connues que d'autres, citons les Longicornes, les Carabes et les Cétoines. La connaissance taxonomique est partielle.

La constitution d'une liste de référence à l'échelle de la métropole revêt un intérêt d'autant plus important que de nombreuses espèces rares, en régression, et/ou endémique de Provence sont concernées, occupants divers habitats et secteurs géographiques.

Dans le cadre de l'atlas, le CEN a analysé le Catalogue des coléoptères de Provence d'Henri Caillol (1908). Plus de 500 données bibliographiques ont été compilées, concernant 208 espèces, dont 71 qui ne disposaient pas encore de saisie en base de données sur le territoire.



Anthaxia hungarica
© SONIA RICHAUD | CEN PACA

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

636
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

5 000 ESPÈCES EN RÉGION PACA

10 862 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

3 265
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

3
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE

AUCUNE LISTE ROUGE À L'ÉCHELLE RÉGIONALE OU DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES COLÉOPTÈRES ET LA POLLINISATION

Ils jouent un rôle intéressant dans la pollinisation et peuvent être très présents dans les lisières entre espaces agricoles et naturels. Ce sont des bons indicateurs de l'état écologique de ces écotones.

LES HÉMIPTÈRES



Zicrona caerulea
© SONIA RICHAUD | CEN PACA

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les hémiptères regroupent entre autres les punaises, cigales, cicadelles, cochenilles et pucerons.

Ce groupe très diversifié est représenté dans la plupart des milieux naturels terrestres et aquatiques, les cultures et même les habitations humaines.

Certaines espèces sont spécialisées et ne se rencontrent que dans les milieux sablonneux littoraux, comme la Punaise fouisseuse (*Macroscytus brunneus)*.
D'autres ne sont associées qu'à une seule plante hôte, comme *Ventocoris rusticus*, dont la larve et l'adulte ne se nourrissent que de la Nigelle de Damas, en ponctionnant les fruits et les capsules.

Toutefois, ce sont dans les formations herbacées (prairies, friches) et arborées que l'on rencontre le plus grand nombre d'individus et d'espèces. Ces dernières sont trouvées au sol voire sous la surface, et surtout parmi la végétation grâce au régime alimentaire phytophage d'une majorité d'espèces.

Alors que des punaises, des cicadelles et des pucerons ont mauvaise réputation auprès de jardiniers, beaucoup d'autres espèces sont de précieux auxiliaires de cultures, par exemple la Punaise prédatrice (*Zicrona caerulea)*.

On retrouve parmi les hémiptères des espèces endémiques comme la Cigale argentée (*Tettigettalna argentata*), typique des milieux xérophiles ouverts comme les pelouses sèches.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La connaissance taxonomique des hémiptères est très lacunaire, puisque l'échantillonnage sur lequel s'appuie le présent état des lieux des connaissances est très partiel. Or, une liste des espèces connues pour le territoire est envisageable. Elle nécessite un travail conséquent de compilation des données bibliographiques et de mobilisation des experts taxonomiques.

Quarante-quatre espèces d'hémiptères ont bénéficié d'amélioration des connaissances par les expertises ciblées du CEN PACA de 2019 et 2020.
La recherche bibliographique réalisée également dans le cadre de cette étude par le CEN a permis d'ajouter 42 taxons à la liste d'espèces portant à 187 le nombre d'espèces connues sur le territoire.



Tibicina garricola
© SONIA RICHAUD | CEN PACA

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE TRÈS LACUNAIRE

149
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

1500 ESPÈCES EN RÉGION PACA
3361 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

1 122
OBSERVATIONS

GROUPE EN DÉFAUT DE CONNAISSANCE ET DE RECONNAISSANCE
À L'ÉCHELLE MONDIALE

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA CIGALE, EMBLÈME DE PROVENCE

Dix espèces de cigales sont recensées sur le territoire de la métropole. Le son qu'elles émettent, la cymbalisation, est caractéristique de chaque espèce et permet de les identifier. Les milieux colonisés par les cigales ne se limitent pas aux pins et leur système racinaire (habitat des larves), des espèces moins communes ne fréquentent que les garrigues (Cigale du garric *Tibicina garricola*) ou les pelouses sèches les plus arides (Cigale argentée *Tettigettalna argentata*).

LES NEUROPTÈRES



Libelloides Ictericus
© SONIA RICHAUD | CEN PACA

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Leur cycle de vie s'effectue par une métamorphose complète, nécessitant que la larve, à son dernier stade, forme une nymphe (chrysalide) d'où éclora l'adulte une fois la métamorphose accomplie.
Au stade adulte, la majorité des espèces ont une activité crépusculaire ou nocturne, hormis les ascalaphes et quelques fourmilions.

Les neuroptères forment un groupe relativement peu diversifié, dont les représentants peuplent les milieux arborés, notamment des chrysopes et les hémérobes, et les milieux ouverts pour ce qui est surtout des fourmilions et des ascalaphes.

Les neuroptères sont des insectes dont les adultes possèdent deux paires d'ailes presque identiques, bien développées et très nervurées.

Nombre d'espèces sont rares et exigeantes, spécialisées sur des milieux plus ou moins steppiques, comme l'Ascalaphon (*Deleproctophyla dusmeti*), ou à des milieux sablonneux littoraux comme le Fourmilion des sables (*Neuroleon arenarius*).

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La connaissance des neuroptères sur le territoire de la métropole est insuffisante, tant sur le nombre d'espèces que leur répartition géographique. Le principal enjeu de la connaissance identifié dans l'atlas est d'améliorer la liste des espèces de neuroptères connues sur le territoire. La mobilisation de spécialistes et de données bibliographiques permettra une liste taxonomique de référence pour certaines familles, dont les Ascalaphes.

Les inventaires menés en 2019 et 2020 sur les mailles en lacune de connaissance ont amélioré les connaissances de 17 espèces de neuroptères. Ils ont permis de révéler la présence du rare Ascalaphe blanc sur la Côte Bleue.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

23
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

170 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

304
OBSERVATIONS

GROUPE EN DÉFAUT DE CONNAISSANCE ET DE RECONNAISSANCE
À L'ÉCHELLE MONDIALE



Mantispe commune
© SONIA RICHAUD | CEN PACA

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES CHRYSOPES ET LES HÉMÉROBES, AUXILIAIRES DES CULTURES

De stature frêle, les chrysopes et les hémérobes sont pourtant de redoutables prédateurs qui chassent dans le feuillage, au stade de larve et souvent aussi d'adulte. Ce sont des régulateurs des populations de pucerons, acariens ainsi que d'œufs et de jeunes chenilles ou larves de coléoptères. Des milieux naturels en bord de cultures présentent donc un atout à cet égard.

LES CRiQUETS, SAUTERELLES ET GRiLLONS
OU ORTHOPTÈRES



Decticelle des ruisseaux
© LPO | FRANÇOIS GRIMAL

NiVEAU DE CONNAiSSANCE

La liste taxonomique de référence des orthoptères est complète et actualisée pour le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

La couverture spatiale de la connaissance est très hétérogène et lacunaire dès la maille 10 x 10 km avec les 2/3 des mailles insuffisamment connues. L'indicateur de connaissance des orthoptères est évalué à 5 : connaissance chorologique très lacunaire.

iNDiCATEUR DE CONNAiSSANCE

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE TRÈS LACUNAIRE

102
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAiSON

180 ESPÈCES EN RÉGiON PACA
236 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLiTAiNE

25 814
OBSERVATiONS

STATUTS DES ESPÈCES

3
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE

10
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE RÉGIONALE

HABiTAT ET ÉCOLOGiE

Les orthoptères sont des insectes à métamorphose incomplète (pas de stade nymphal, ou chrysalide) qui regroupent les criquets, sauterelles, grillons et courtilières. Certaines espèces ont des ailes très développées et sont capables de se déplacer sur de grandes distances, tandis que d'autres sont seulement marcheuses et incapables de voler.

La plupart des orthoptères stridulent, le jour ou la nuit en fonction des espèces, et fournissent un moyen pratique de détecter leur présence et de les identifier.

Les orthoptères sont trouvés dans toutes sortes de milieux naturels, qu'ils soient forestiers ou sur le sol nu, dans les prairies et les cultures, parfois aussi dans les grottes et les habitations humaines.

Beaucoup d'espèces sont rares et menacées, car strictement associées à des milieux fragiles, comme le Tridactyle panaché sur les plages humides en bord de Durance, le Criquet des dunes sur des arrières plages littorales, ou la Courtilière provençale dans les marais.




Courtilière commune
© Marie-Line BOISSY

LE SAViEZ-VOUS ?

LES ORTHOPTÈRES, INDICATEUR DE LA STRUCTURE D'UN ÉCOSYSTÈME

Fidèles indicateurs des conditions écologiques et de la structure physique de leur milieu de vie, les orthoptères sont des bio-indicateurs très intéressants. L'étude de leurs peuplements apporte des informations précieuses pour connaître l'état de conservation et faire le suivi de leur milieu de vie.



[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : CRIQUETS, SAUTERELLES ET GRILLONS

Nombre d'espèces connues par maille de 10 x 10 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 11 espèces
- 12 à 25
- 26 à 35
- 36 à 52
- Plus de 52 (maximum : 73 espèces)


102 espèces recensées sur le territoire

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES ORTHOPTÈRES

L'enjeu identifié dans l'atlas métropolitain de la biodiversité est l'amélioration des connaissances dans les habitats naturels les plus riches en orthoptères, comme les pelouses steppiques, les milieux littoraux sablonneux, les prairies humides et les zones marécageuses lesquels abritent les espèces les plus rares et menacées.

Les camps de prospection, organisés en 2019 par la LPO, ont permis de recueillir 47 données supplémentaires versées dans la base de données faune-PACA.
Par exemple, un spécimen de phasme *Pijnackeria masettii* a été reconnu lors du camp de prospection LPO du Val de Durance.

Le CEN PACA a réalisé, en 2019 et 2020, des inventaires complémentaires sur 7 secteurs de la métropole, répartis en 21 mailles d'étude. Concernant le groupe des orthoptères, ces prospections ont permis d'ajouter des données pour 76 espèces d'orthoptères, de mantes et de phasmes et d'ajouter de nombreuses espèces non inventoriées jusqu'alors sur certains secteurs.



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : ORTHOPTÈRES

Connaissance à la maille 10 x 10 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA



Arcyptère provençale

© SONIA RICHAUD | CEN PACA

LES LIBELLULES
OU ODONATES



Agrion de Mercure
© AURÉLIEN AUDEVARD | LPO

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Plus connus sous le nom de libellules et demoiselles, les odonates se reconnaissent aisément au stade adulte à leur abdomen très allongé, leurs grandes ailes et leurs yeux proéminents. Ce sont des insectes parmi les plus anciens, depuis plus de 300 millions d'années, et au régime carnivore au stade de larve et d'adulte, dans l'eau et dans les airs.

Les odonates sont souvent observés aux abords des eaux courantes et stagnantes, car leurs larves sont aquatiques. Ces dernières dévorent des larves de moustiques et d'autres invertébrés, tandis que les adultes capturent leurs proies en vol.
Bien que les odonates soient peu diversifiés en comparaison des autres insectes, l'étude de leurs cortèges apporte beaucoup d'informations utiles sur l'état des ruisseaux, rivières, mares et marais. Chaque espèce présente des exigences écologiques propres, en lien avec la vitesse du courant, le type de végétation aquatique, la température moyenne de l'eau, etc. Il en résulte que la présence de certaines espèces exigeantes traduit le bon état de conservation de milieux fragiles et particuliers, par exemple le Leste à grands stigmas (*Lestes macrostigma)* dans certaines mares temporaires saumâtres, ou l'Agrion bleuâtre (*Coenagrion caerulescens)* dans de modestes écoulements à eau claire, ensoleillés et peu végétalisés.

La dégradation et la destruction généralisées des milieux aquatiques ont entraîné la diminution de beaucoup d'odonates, comme tout le reste de la faune associée à ces milieux.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La liste de référence des libellules du territoire est complète : elle comprend 58 espèces. Il reste néanmoins à améliorer la connaissance en terme de couverture spatiale qui reste partielle dans certains secteurs. Toutefois, la plupart des espèces emblématiques sont connues à l'échelle du territoire.



Anax parthenope
© SONIA RICHAUD | CEN PACA

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE PARTIELLE

58
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

73 ESPÈCES EN RÉGION PACA
96 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

44 382
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

3
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE


4
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE RÉGIONALE

4
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE NATIONALE

LE SAVIEZ-VOUS ?

SENSIBLES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Face au réchauffement climatique, des odonates bénéficient d'un vol suffisamment puissant pour progresser vers le nord. Mais en zone méditerranéenne, le risque de disparition est plus fort que la possibilité d'arrivée de nouvelles espèces par le sud. Dans la métropole, la Libellule purpurine, une africaine, s'est déjà implantée, mais les sécheresses menacent l'équilibre de milieux où vivent des espèces déjà menacées.



[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : LIBELLULES

Nombre d'espèces connues par maille de 5 x 5 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 5 espèces
- 6 à 13
- 14 à 23
- 24 à 34
- Plus de 34 (maximum : 47 espèces)


58 espèces recensées sur le territoire

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES ODONATES

L'enjeu identifié par l'atlas métropolitain de la biodiversité pour les odonates est d'affiner l'état de la connaissance pour l'ensemble de mailles 5 x 5 km.

Les camps de prospection participatifs, organisés en 2019, ont permis de recueillir des données d'observations supplémentaires, notamment sur le Pays Salonais identifié en lacune de connaissance.

Les inventaires ciblés, réalisés par le CEN PACA en 2019 et 2020 sur 7 secteurs de la métropole, ont permis de produire des données pour 37 espèces d'odonates et de contacter de nombreuses espèces non inventoriées jusqu'alors sur certains secteurs.



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : LIBELLULES

Connaissance à la maille 5 x 5 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA



Sympetrum fonscolombii

© SONIA RICHAUD | CEN PACA

LES PAPILLONS DE JOUR
OU RHOPALOCÈRES



Diane (Zerynthia polynexa)
© MARION FOUCHARD | LPO

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Le cycle de vie des papillons de jour -Rhopalocères- est composé de 4 stades distincts : œuf, chenille, chrysalide et papillon. La durée de vie au stade adulte va de quelques jours à plus de dix mois comme par exemple pour le Citron de Provence (*Gonepteryx cleopatra).*

La plupart des papillons de jour se rencontrent dans les milieux plus ou moins ouverts : prairies, friches, pelouses sèches, garrigues.
Outre leur période d'activité diurne, les papillons de jour se distinguent des papillons de nuit – hétérocères – par la position de leurs ailes plaquées ensemble au-dessus du corps une fois au repos.

La présence de chaque espèce est conditionnée par celle d'une ou plusieurs plantes qui nourrissent la chenille. Mais bien souvent, d'autres conditions doivent être remplies par le milieu, qui doit offrir par exemple des fleurs nectarifères durant la période de vol des papillons. Par ailleurs, les papillons de jour sont sensibles aux pesticides ou à d'autres polluants chimiques, et sont influencés par la température moyenne et l'hygrométrie. Pour toutes ces raisons, ils sont considérés comme des bio-indicateurs de l'état de conservation des milieux qu'ils occupent, et leur suivi permet de mieux comprendre les effets de l'évolution du climat.

Le territoire de la métropole abrite une forte proportion d'espèces strictement méditerranéennes, mais aussi plusieurs espèces d'affinité montagnarde sur la Sainte-Baume, toutes menacées de disparition, comme le Semi-Apollon (*Parnassius mnemosyne).*

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La liste de référence des papillons de jour est complète et actualisée pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Parmi les 141 espèces répertoriées, deux espèces sont migratrices. La répartition géographique des espèces est bien connue et de manière homogène. Des secteurs en lacune de connaissance peuvent apparaître à une échelle plus fine. On peut citer notamment les grandes plaines agricoles autour de Salon-de-Provence, la haute vallée de l'Arc et la Côte Bleue. Le principal enjeu de la connaissance des rhopalocères est de compléter les dernières mailles en lacune de connaissance. Au cours des inventaires 2019 et 2020 sur les mailles concernées par des lacunes de connaissances, les entomologistes du CEN PACA ont amélioré les connaissances pour 89 espèces.



Polyommatus amandus
© MARIN MARMIER | CEN PACA

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE PARTIELLE

141
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

219 ESPÈCES EN RÉGION PACA

257 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

198 602
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

5
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE


8
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE RÉGIONALE

4
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE NATIONALE

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES BIO-INDICATEURS DES MILIEUX NATURELS

Les papillons de jour jouent un rôle déterminant au sein des écosystèmes en participant à la pollinisation des plantes à fleurs. Ils constituent une ressource alimentaire pour de nombreux oiseaux insectivores et de petits mammifères et contribuent, au stade de chenille, à la régulation de la production végétale. Ces insectes sont étudiés par les scientifiques et gestionnaires de sites pour évaluer l'état de santé des milieux ouverts (pelouses naturelles, praires, friches...). La pauvreté ou la richesse de leur peuplement traduit celle d'une quantité d'autres espèces vivantes.




[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : PAPILLONS DE JOUR

Nombre d'espèces connues par maille de 5 x 5 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 22 espèces
- 23 à 44
- 45 à 63
- 64 à 86
- Plus de 86 (maximum : 118 espèces)

141 espèces recensées sur le territoire



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : RHOPALOCÈRES

Connaissance à la maille 5 x 5 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES RHOPALOCÈRES

L'enjeu principal est d'atteindre un niveau de connaissance satisfaisant pour l'ensemble des mailles du territoire. La répartition de la grande majorité des espèces est actualisée par des données d'occurrence récentes. La plupart des espèces emblématiques sont connues à l'échelle du territoire, cependant des lacunes de connaissances apparaissent pour certaines (ex : le Louvet *Hyponephele lupina* ou l'Hespérie de la ballote *Carcharodus baeticus*).

Les camps de prospection, organisés en 2019 et 2020 par la LPO, ont permis de recueillir 1 013 données supplémentaires pour les rhopalocères.

Le CEN PACA a réalisé, en 2019 et 2020, des inventaires complémentaires sur 7 secteurs de la métropole (21 mailles d'étude) ciblant l'ensemble des invertébrés terrestres. Concernant le groupe des papillons de jour, ces prospections ont permis d'améliorer la connaissance de la répartition géographique de 162 espèces.



Citron de Provence

© SONIA RICHAUD | CEN PACA

LES PAPILLONS DE NUIT
OU HÉTÉROCÈRES



Grand Paon de nuit
© ALEXANDRE LESACHÉ

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les hétérocères regroupent tous les papillons nocturnes, soit des milliers d'espèces, ainsi que des dizaines d'espèces diurnes.

Le terme « hétérocères » signifie « antennes de formes diverses », contrairement aux papillons de jour (rhopalocères) dont les antennes se terminent en forme de massue.
Les formes, tailles et couleurs des hétérocères sont très variées. Beaucoup d'espèces présentent une livrée terne pour se camoufler sur des troncs ou des rochers, tandis que d'autres espèces portent des couleurs vives pour signifier aux prédateurs qu'elles ne sont pas comestibles.

Comme tous les papillons, les hétérocères sont des insectes pollinisateurs dont la présence est conditionnée à celle des plantes auxquelles chaque espèce est associée par sa chenille.

Sensibles aux pesticides agricoles et autres polluants chimiques, leurs populations sont également très impactées par la pollution lumineuse qui les perturbe.

Très diversifié, ce groupe est représenté dans tous les milieux ouverts ou forestiers, marécageux ou steppiques, littoraux ou montagneux, avec des cortèges d'espèces propres pour chacun d'eux.

Beaucoup d'espèces rares et en régression concernent les hétérocères. À ce jour, 32 espèces classées sur la liste régionale ZNIEFF, servant à décrire ou désigner les Zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique, sont connues sur le territoire de la métropole.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

La connaissance des papillons de nuit est partielle en terme de richesse spécifique sur la métropole, avec une liste d'espèces incomplète. Pour autant, l'état des connaissances de certaines familles de papillons de nuit est complet ou quasi-complet, on citera les Zygènes et les Géomètres.

La couverture spatiale de la connaissance pour ce groupe sur le territoire est très hétérogène et non évaluable. L'enjeu de connaissance est de consolider une liste taxonomique de référence pour certaines familles d'hétérocères. La mobilisation des informations bibliographiques et de spécialistes et l'organisation d'inventaires des papillons permettront d'améliorer le niveau de connaissance taxonomique et géographique.



Camptogramma bilineata
© SONIA RICHAUD | CEN PACA

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

962
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

2 500 ESPÈCES EN RÉGION PACA
5 585 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

12 973
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

4
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE

1
ESPÈCE MENACÉE
SUR LISTE ROUGE RÉGIONALE

LE SAVIEZ-VOUS ?

SENSIBILITÉ AUX POLLUTIONS LUMINEUSES

Les hétérocères régressent à cause de la pollution lumineuse, car la lumière lunaire sert de repère fixe aux papillons de nuit pour se diriger. Les éclairages artificiels sont autant de pièges car leur angle d'approche se modifie au fur et à mesure du déplacement du papillon, le conduisant à former une spirale attractive vers le point lumineux.

La trame noire du territoire est un outil nécessaire pour la préservation des espèces animales nocturnes ainsi que pour la flore. La Métropole Aix-Marseille-Provence, accompagnée par le Cerema, l'élabore.

LES MOUSSES ET LICHENS
OU BRYOPHYTES



Apopellia endiviifolia
© BENOIT OFFERHAUS

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les bryophytes sont un groupe taxonomique qui dériverait des plantes terrestres primitives (il y a 350 millions d'années). Ce groupe comprend les plantes plus communément appelées mousses, hépatiques et anthocérotes. On en dénombre environ 23 000 espèces dans le monde.

Ces végétaux terrestres sont souvent de petite taille et vivent de préférence dans des milieux humides et ombragés.

Néanmoins, certains sont capables de supporter de longues périodes de sécheresse grâce à leur revivis-cence (ils peuvent supporter des températures de + 70 °C et rester longtemps dans une forme de vie « ralentie »).

Ce sont des plantes chlorophyl-liennes (capable de photosynthèse) avec une forme « rudimentaire » (ni vraie feuille, ni vraie racine, pas de tige et pas de fleur).

Ces végétaux pionniers sont ca-pables de coloniser des milieux très variés recouvrant des rochers nus, les troncs et les vieilles souches, tapissant le sol des forêts ...

Ainsi, partout, ils contribuent d'une façon importante à la formation d'humus, à ralentir l'évaporation de l'eau et à maintenir une humidité des sols.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

Le nombre de données d'oc-currence disponibles ne reflète pas la diversité présente sur le territoire d'Aix-Marseille-Pro-vence. Ceci étant probable-ment dû à des inventaires bi-bliographiques inachevés et un échantillonnage du terri-toire encore trop incomplet. La connaissance taxonomique est partielle.

L'enjeu principal est de dresser une liste d'espèces complète et actualisée. La mobilisation de la bibliographie et des experts taxonomiques disponibles permettront de renforcer la connaissance des bryophytes. Des inventaires de terrain amélioreront la connaissance de la répartition des taxons re-marquables.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

CONNAISSANCE TAXONOMIQUE PARTIELLE

144
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

880 ESPÈCES EN RÉGION PACA
937 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

697
OBSERVATIONS

STATUT DES ESPÈCES

1
ESPÈCE PROTÉGÉE
RECENSÉE SUR LE TERRITOIRE




Exsertotheca crispa
© BENOIT OFFERHAUS

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES BRYOPHYTES ENDÉMIQUES

Bien que globalement peu favorable à une grande diversité de bryophytes du fait de son climat sec et des vents fréquents asséchants, le territoire métropolitain héberge quelques espèces méditerranéennes uniques en France comme *Pterygoneurum sampaianum* dans les argiles de la pointe de Bonnieu (Martigues), *Tortula pallida* dans les milieux salés de Port-Saint-Louis-du-Rhône ou encore *Riccia atromarginata* dans les collines d'Allauch.

LES PLANTES VASCULAIRES
OU TRACHÉOPHYTES



Asphodelle de Crau
© F. ANDRIEU | CBNMED

HABITAT ET ÉCOLOGIE

Les plantes « vasculaires » sont constituées d'un ensemble de canaux et vaisseaux, formant un système circulatoire, qui leur permet de transporter des nutriments et de l'eau des racines vers les autres organes (tronc, tiges, feuilles…) et les produits de la photosynthèse (sucres complexes) depuis les feuilles vers le reste de leur organisme, grâce à la sève. Grâce à ce système de transport, la plante acquiert une certaine rigidité et peut avoir une taille très grande (jusqu'à plus de 100 mètres de haut dans certains pays du monde).

Les trachéophytes présentent d'autres traits évolutifs d'adaptation au milieu terrestre comme l'homéohydrie, c'est-à-dire la capacité à maintenir leur teneur en eau constante malgré les variations de l'hygrométrie de l'air et du sol en puisant l'eau dans le sous-sol grâce à leurs racines.

Elles peuvent avoir des formes très différentes, de la Pâquerette (*Bellis perennis*) au Micocoulier (*Celtis australis*), et s'adapter à de nombreux milieux. Elements structurants des écosystèmes terrestres, on les retrouve dans l'ensemble des milieux de la métropole, constituant différentes formations végétales : pelouses, garrigues, forêts, etc.

Les plantes vasculaires servent d'abris, de gîte et de nourriture à de nombreuses espèces et sont un maillon fondamental des chaînes alimentaires.

NIVEAU DE CONNAISSANCE

Les plantes vasculaires figurent parmi les groupes d'espèces les mieux connus au monde.
La liste de référence de la flore vasculaire est actualisée pour le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
2 753 espèces végétales sont répertoriées par le Conservatoire botanique national méditerranéen, représentant près des 2/3 de la flore régionale. La répartition géographique des espèces est bien connue même si de minimes lacunes peuvent apparaître à une échelle plus fine.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE

BONNE CONNAISSANCE CHOROLOGIQUE

2753
ESPÈCES RECENSÉES SUR LA MÉTROPOLE AMP

EN COMPARAISON

4313 ESPÈCES EN RÉGION PACA
7734 ESPÈCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

385 881
OBSERVATIONS

STATUTS DES ESPÈCES

76
ESPÈCES PROTÉGÉES
RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE

131
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE RÉGIONALE

74
ESPÈCES MENACÉES
SUR LISTE ROUGE NATIONALE




Ulex parviflorus
© B. HUYNH-TAN | CBNMED

LE SAVIEZ-VOUS ?

ADAPTATIONS VÉGÉTALES

Le climat méditerranéen a contraint les plantes à déployer un éventail d'adaptations morphologiques et/ou physiologiques. Certaines ont des organes pour rechercher ou stocker l'eau, d'autres développent des éléments pour réduire la perte par évapotranspiration : réduction de la surface foliaire, feuille recouverte d'une cuticule (Chêne vert) ou de poils (Ciste cotonneux). Les plantes d'affinité méditerranéenne sont généralement de petite taille. L'aridité de la saison estivale les rend peu favorables à l'activité végétale (pousse, floraison, fructification), ainsi certaines adaptent leur cycle de vie.




[1]. absence d'observation compilée dans la base de données régionale SILENE et Faune-PACA

RICHESSE SPÉCIFIQUE CONNUE : PLANTES VASCULAIRES

Nombre d'espèces connues par maille de 5 x 5 km

- Aucune espèce connue[1]
- 1 à 157 espèces
- 158 à 344
- 345 à 501
- 502 à 667
- Plus de 667 (maximum : 954 espèces)

2 753 espèces recensées sur le territoire



ÉTAT DE LA CONNAISSANCE : PLANTES VASCULAIRES

Connaissance à la maille 5 x 5 km :

- Satisfaisante
- Peu satisfaisante
- Insatisfaisante

SOURCE : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE CONNAISSANCE CEN PACA, 2020

© AUPA

STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES PLANTES VASCULAIRES

Relativement faciles d'approche et objet d'étude des botanistes depuis plusieurs siècles, les plantes vasculaires comptent certainement parmi les compartiments les mieux connus de la biodiversité. La compilation de l'ensemble des travaux historiques, le travail constant d'inventaire mené par le Conservatoire botanique national méditerranéen en lien avec un milieu associatif et amateur actif permettent aujourd'hui de disposer d'une bonne connaissance de la répartition de chacune des espèces. Le travail n'est, bien entendu, pas terminé et l'évolution des connaissances reste nécessaire sur des groupes complexes et des taxons nouvellement mis en évidence. Tous les taxons répertoriés sur le territoire bénéficient d'une donnée d'occurence récente, c'est-à-dire après l'année 2000.

L'objectif de la stratégie d'amélioration de la connaissance de la flore vasculaire sur Aix-Marseille-Provence se décline en 2 niveaux :

- optimiser l'homogénéité de la connaissance à la maille 5 x 5 km,
- identifier les stations d'espèces remarquables non revues depuis dix ans afin d'actualiser leur statut de présence.



Ophrys de Bertoloni

© V. NOBLE | CBNMED

CONCLUSION

L'état des lieux de la connaissance de la biodiversité continentale révélé ici démontre que parmi les 18 groupes d'espèces évalués, seuls 10 présentent une connaissance taxonomique satisfaisante, soit 55 % de la faune et de la flore. Les amphibiens, les reptiles les oiseaux, les mammifères dont les chiroptères, les libellules, les papillons de jour, les mollusques et les orthoptères sont les mieux connus sur la métropole mais également en région, en France et partout dans le monde.
L'enjeu pour les groupes taxonomiques moins bien connus, les poissons et les invertébrés, réside dans l'acquisition de données d'occurrence précises afin d'affiner la répartition de ces espèces.
Ainsi, la définition des enjeux de connaissance de la biodiversité continentale sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, est une étape préalable indispensable pour accompagner les politiques publiques sectorielles portées par l'institution.

Cette stratégie d'amélioration de la connaissance faunistique et floristique s'inscrit dans l'objectif d'orienter au mieux les choix de gestion de l'espace territorial dans un souci de soustraire des portions du territoire du risque d'érosion de la biodiversité.

Ce diagnostic est complété par la définition des enjeux de conservation de la biodiversité continentale. La patrimonialité permet de statuer sur la responsabilité du territoire vis-à-vis de la conservation des espèces faunistiques et floristiques qui le composent.
Le quatrième cahier de l'atlas présentera l'ensemble des secteurs abritant les enjeux écologiques de la biodiversité continentale pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Ainsi, l'atlas métropolitain de la biodiversité permettra de répondre au défi fixé dans le plan de relance et de renouveau « AMP2R » en faveur de la transition écologique d'une Métropole-Nature.

DOCUMENTS RESSOURCES

- Stratégie en faveur de l'amélioration de la connaissance du patrimoine naturel du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence : État des lieux et enjeux de connaissance, Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, août 2019.
- Inventaires ciblés, Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, décembre 2020.
- Rapport inventaires participatifs, LPO PACA, août 2019

INDEX DES ESPÈCES

CR En danger critique
EN En danger
VU Vulnérable
LC Préoccupation mineure

Niveau de menace au niveau régional
Niveau de menace au niveau national
Espèce protégée au niveau national
Nom scientifique | *nom commun*

AMPHIBIENS

- Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) ***Salamandre tachetée***
- Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) ***Triton palmé***
- Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) ***Alyte accoucheur***
- Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) ***Pélobate cultripède***
- Bufo spinosus Daudin, 1803 ***Crapaud épineux***
- Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837 ***Discoglosse sarde***
- Epidalea calamita (Laurenti, 1768) ***Crapaud calamite***
- Hyla meridionalis Boettger, 1874 ***Rainette méridionale***
- Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) ***Pélodyte ponctué***
- Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995) ***Grenouille de Graf***
- Pelophylax perezi (Seoane, 1885) ***Grenouille de Pérez***
- Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) ***Grenouille rieuse***
- Bombina variegata (Linnaeus, 1758) ***Sonneur à ventre jaune***

ARACHNIDES

Aculepeira armida (Audouin, 1826)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ***Épeire de velours***
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) ***Agroeca brune***
Agroeca cuprea Menge, 1873
Agroeca inopina O. Pickard-Cambridge, 1886
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1758)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758)
Amaurobius erberi (Keyserling, 1863)
Antistea elegans (Blackwall, 1841) ***Hahnie élégante***
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) ***Anyphène à chevrons***
Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866)
Aphantaulax trifasciata (O. Pickard-Cambridge, 1872)
Araneus diadematus Clerck, 1758 ***Épeire diadème***
Araniella cucurbitina (Clerck, 1758) ***Épeires concombres***
Arctosa perita (Latreille, 1799)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ***Épeire frelon***
Argiope lobata (Pallas, 1772)
Asianellus festivus (C.L. Koch, 1834)
Atypus affinis Eichwald, 1830 ***Mygales à chaussette***
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ***Aulonie mains-blanches***
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)
Buthus occitanus (Amoreux, 1789) ***Scorpion languedocien***
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
Cercidia prominens (Westring, 1851)
Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868)
Civizelotes caucasius (C.L. Koch, 1866)
Civizelotes civicus (Simon, 1878)
Civizelotes dentatidens (Simon, 1914)
Clubiona comta C.L. Koch, 1839
Clubiona terrestris Westring, 1851
Crustulina guttata (Wider, 1834)
Crustulina scabripes Simon, 1881
Crustulina sticta (O. Pickard-Cambridge, 1861)
Cyclosa algerica Simon, 1885
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ***Épeire conique***
Cyrba algerina (Lucas, 1846)
Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)
Cyrtophora citricola (Forskål, 1775) ***Épeire de l'Opuntia***
Dasumia laevigata (Thorell, 1873)
Dictyna uncinata Thorell, 1856
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ***Drassode lapidicole***
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
Drassodex hypocrita (Simon, 1878)
Dysdera crocata C.L. Koch, 1838
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) ***Dysdère érythrine***
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ***Thomise à trois tâches***
Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846)
Enoplognatha testacea Simon, 1884
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Episinus truncatus Latreille, 1809 ***Épisine tronqué***
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)
Eratigena fuesslini (Pavesi, 1873)
Eratigena picta (Simon, 1870)
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778)
Ero furcata (Villers, 1789)
Euophrys herbigrada (Simon, 1871)
Euscorpius flavicaudis (De Geer, 1778)
Euscorpius tergestinus (C. L. Koch, 1837)
Evarcha arcuata (Clerck, 1758)
Filistata insidiatrix (Forskål, 1775) ***Filistate perfide***
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) ***Épeire à bosses***
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)
Gnaphosa alacris Simon, 1878
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)
Hahnia petrobia Simon, 1875
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)
Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ***Saltique cuivré***
Heliophanus melinus L. Koch, 1867
Heliophanus tribulosus Simon, 1868
Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)
Heriaeus oblongus Simon, 1918
Hogna radiata (Latreille, 1817) ***Lycose tarentuline***
Iberina candida (Simon, 1875)
Iberina montana (Blackwall, 1841)
Icius hamatus (C.L. Koch, 1846)
Icius subinermis Simon, 1937
Larinioides cornutus (Clerck, 1758) ***Épeire des roseaux***
Leptorchestes berolinensis (C.L. Koch, 1846)
Liocranoeca striata (Kulczynski, 1882)
Liophrurillus flavitarsis (Lucas, 1846)
Lycosa tarantula (Linnaeus, 1758) ***Tarentules***
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ***Mangore petite-bouteille***
Maso sundevalli (Westring, 1851)
Mendoza canestrinii (Ninni in Canestrini & Pavesi, 1868)
Micrommata ligurinum (C. L. Koch, 1845)
Minicia marginella (Wider, 1834)
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) ***Saltique fourmi***
Neon levis (Simon, 1871)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) ***Épeires fougères***
Neriene clathrata (Sundevall, 1830)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841)
Nomisia celerrima (Simon, 1914)
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
Oecobius maculatus Simon, 1870
Oecobius navus Blackwall, 1859
Oxyopes lineatus Latreille, 1806
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) ***Ozyptile sablée***
Ozyptila pauxilla (Simon, 1870)
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)
Pardosa wagleri (Hahn, 1822)
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) ***Saltique sanguinolent***
Philodromus aureolus (Clerck, 1758)
Philodromus buxi Simon, 1884
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Philodromus collinus C.L. Koch, 1835
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ***Philodrome disparate***
Philodromus rufus Walckenaer, 1826
Phintella castriesiana (Grube, 1861)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835) ***Phrurolithus drôle***
Piratula latitans (Blackwall, 1841)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) ***Pisaure admirable***
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)
Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837) ***Thomise rayé***
Saitis barbipes (Simon, 1868)
Salticus unciger (Simon, 1868)
Salticus zebraneus (C.L. Koch, 1837)
Scotina celans (Blackwall, 1841)
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) ***Araignée cracheuse***
Sintula retroversus (O. Pickard-Cambridge, 1875)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)
Synema globosum (Fabricius, 1775) ***Thomise Napoléon***
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ***Tétragnathes***
Tetragnatha montana Simon, 1874
Thanatus atratus Simon, 1875
Thanatus coloradensis Keyserling, 1880
Thanatus vulgaris Simon, 1870
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 ***Thomise replet***
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ***Philodrome oblong***
Titanoeca schineri L. Koch, 1872
Tmarus staintoni (O. Pickard-Cambridge, 1873)
Trachyzelotes barbatus (L. Koch, 1866)
Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)
Trichopterna cucurbitina (Simon, 1881)
Trochosa hispanica Simon, 1870
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 ***Ulobore de Walckenaer***
Uroctea durandi (Walckenaer in Latreille, 1809) ***Araignée Clotho***
Walckenaeria antica (Wider, 1834)
Xysticus acerbus Thorell, 1872
Xysticus bufo (Dufour, 1820)
Xysticus cristatus (Clerck, 1758) ***Xystique crêté***
Xysticus ferrugineus Menge, 1876
Xysticus kempeleni Thorell, 1872
Xysticus kochi Thorell, 1872
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)
Zelotes gallicus Simon, 1914
Zelotes manius (Simon, 1878)
Zelotes segrex (Simon, 1878)
Zelotes thorelli Simon, 1914
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) ***Diodie tête de mort***
Zodarion elegans (Simon, 1873)
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) ***Zodarion italien***
Zodarion pusio Simon, 1914
Zora parallela Simon, 1878
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ***Zora***

CHIROPTÈRES

- Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) ***Barbastelle d'Europe, Barbastelle***
- Myotis myotis (Borkhausen, 1797) ***Grand Murin***
- Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) ***Grand rhinolophe***
- Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) ***Grande Noctule***
- Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) ***Minioptère de Schreibers***
- Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) ***Molosse de Cestoni***
- Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) ***Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches***
- Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) ***Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées***
- Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 ***Murin d'Alcathoe***
- Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) ***Murin de Bechstein***
- Myotis brandtii (Eversmann, 1845) ***Murin de Brandt***
- Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) ***Murin de Capaccini, Vespertilion de Capaccini***
- Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) ***Murin de Daubenton***
- Myotis nattereri (Kuhl, 1817) ***Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer***
- Nyctalus noctula (Schreber, 1774) ***Noctule commune***
- Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) ***Noctule de Leisler***
- Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) ***Oreillard gris, Oreillard méridional***

- Plecotus macrobullaris Kuzjakin, 1965 ***Oreillard montagnard***
- Myotis blythii (Tomes, 1857) ***Petit Murin***
- Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) ***Petit rhinolophe***
- Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) ***Pipistrelle commune***
- Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) ***Pipistrelle de Kuhl***
- Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) ***Pipistrelle de Nathusius***
- Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) ***Pipistrelle pygmée***
- Rhinolophus euryale Blasius, 1853 ***Rhinolophe euryale***
- Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) ***Sérotine commune***
- Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) ***Vespère de Savi***
- Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 ***Vespertilion bicolore, Sérotine bicolore***

COLÉOPTÈRES

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)
Acinopus picipes (Olivier, 1795)
Acmaeodera bipunctata (Olivier, 1790)
Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)
Acmaeodera pilosellae (Bonelli, 1812) ***Acméodère de la Piloselle***
Acmaeoderella adspersula (Illiger, 1803)
Acmaeoderella cyanipennis (Lucas, 1846)
Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)
Acmaeoderella perroti (Schaefer, 1950)
Acrossus luridus (Fabricius, 1775)
Acupalpus elegans (Dejean, 1829)
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) ***Coccinelle à deux points***
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) ***Coccinelle à dix points***
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) ***Acanthodère à fémurs renflés***
Agapanthia asphodeli (Latreille, 1804) ***Agapanthie de l'Asphodèle***
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) ***Agapanthie du Charbon***
Agapanthia dahli (Richter, 1820)
Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884
Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1817)
Agapanthia suturalis (Fabricius, 1787)
Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)
Agrilus ater (Linnaeus, 1767)
Agrilus laticornis (Illiger, 1803)
Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857
Agrilus solieri Gory & Laporte, 1837
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) ***Taupin à plaques velues***
Aleochara haematoptera Kraatz, 1858
Allophylax picipes (Olivier, 1811)
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
Amara eximia Dejean, 1828
Amara ingenua (Duftschmid, 1812)
Amidorus thermicola (Sturm, 1800)
Ammoecius elevatus (Olivier, 1789)
Amphimallon ochraceum (Knoch, 1801)
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) ***Hanneton de la Saint-Jean***
Anacaena bipustulata (Marsham, 1802)
Anaglyptus gibbosus (Fabricius, 1787)
Anaspis quadrimaculata Gyllenhal, 1817
Anisoplia remota Reitter, 1889 ***Anisoplie du Languedoc***
Anisoplia tempestiva Erichson, 1847
Anisoplia villosa (Goeze, 1777)
Anogcodes seladonius (Fabricius, 1792) ***Oedemère à corselet rouge***
Anomala ausonia Erichson, 1847
Anomala dubia (Scopoli, 1763) ***Hanneton bronzé***
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
Anoxia australis (Gyllenhal, 1817)
Anoxia villosa (Fabricius, 1782)
Anthaxia chevrieri Gory & Laporte de Castelnau, 1839
Anthaxia cichorii (Olivier, 1790)
Anthaxia confusa Gory, 1841
Anthaxia cyanescens Gory, 1841
Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789)
Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) ***Bupreste hongrois***
Anthaxia hypomelaena (Illiger, 1803)
Anthaxia millefolii (Fabricius, 1801)
Anthaxia parallela Gory & Laporte de Castelnau, 1839
Anthaxia salicis (Fabricius, 1777) ***Anthaxie du Saule***
Anthaxia scutellaris (Gené, 1839) ***Anthaxie ecussonnée***
Anthaxia semicuprea Küster, 1851
Anthaxia suzannae Théry, 1942
Anthaxia umbellatarum (Fabricius, 1787)
Anthonomus multifasciatus Pic, 1926
Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758)
Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767) ***Anthrène des tapis, Anthrène bigarré des tapis, Anthrène du bouillon blanc***
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)
Aphodius foetidus (Herbst, 1783)
Aphthona venustula (Kutschera, 1861)
Aplocnemus calidus Mulsant & Rey, 1868
Aplocnemus virens (Suffrian, 1843)
Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802)
Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
Arhopalus syriacus (Reitter, 1895)
Arima marginata (Fabricius, 1781)
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Arrhenocoela lineata (Rossi, 1790)
Asaphidion caraboides (Schrank, 1781)
Asaphidion curtum (Heyden, 1870)
Asida dejeanii Solier, 1836
Asida sericea (Olivier, 1795)
Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775)
Aspidapion radiolus (Marsham, 1802)
Atheta amicula (Stephens, 1832)
Atheta dilaticornis (Kraatz, 1856)
Atheta fungi (Gravenhorst, 1806)
Atheta gagatina (Baudi di Selve, 1848)
Atheta oblita (Erichson, 1839)
Atheta pervagata G. Benick, 1975
Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758)
Athous puncticollis Kiesenwetter, 1858
Athous vittatus (Fabricius, 1792)
Attagenus trifasciatus (Fabricius, 1787) ***Attagène à trois bandes***
Aulonium ruficorne (Olivier, 1790)
Baris rufa (Boheman, 1844)
Bembidion andreae (Fabricius, 1787)
Bembidion azurescens Dalla Torre, 1877
Bembidion decorum (Zenker, 1801)
Bembidion geniculatum Heer, 1837
Bembidion latiplaga Chaudoir, 1850
Bembidion minimum (Fabricius, 1792)
Bembidion normannum Dejean, 1831
Bembidion tibiale Duftschmid, 1812
Bioplanes meridionalis Mulsant, 1854
Blaps gigas (Linnaeus, 1767)
Blaps mucronata Latreille, 1804 ***Scarabée funèbre, Scarabée puant***
Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758)
Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)
Brachycerus lutosus Gyllenhal, 1833
Brachycerus undatus Fabricius, 1798
Brachyderes pubescens Boheman, 1833
Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816)
Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855)
Brachypera dauci (Olivier, 1807)
Bradycellus brevitarsis Normand, 1946
Brindalus porcicollis (Illiger, 1803)
Bruchela suturalis (Fabricius, 1792)
Bruchidius bimaculatus (Olivier, 1795)
Bruchidius lividimanus (Gyllenhal, 1833)
Bruchidius marginalis (Fabricius, 1777)
Bruchidius rubiginosus (Desbrochers des Loges, 1869)
Bruchidius seminarius (Linnaeus, 1767)
Bruchidius tibialis (Boheman, 1829)
Bruchidius villosus (Fabricius, 1792)
Bruchus affinis Frölich, 1799
Bruchus brachialis Fåhraeus, 1839
Bruchus rufimanus Boheman, 1833
Brundinia meridionalis (Mulsant & Rey, 1853)
Brychius C.G. Thomson, 1859
Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780
Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 ***Bupreste à neuf tâches***
Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758
Calamobius filum (Rossi, 1790)
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)
Calathus mollis (Marsham, 1802)
Calomera littoralis (Fabricius, 1787) ***Cicindèle des plages***
Calomicrus circumfusus (Marsham, 1802)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) ***Grand calosome (Le)***
Cantharis annularis Ménétriés, 1836
Cantharis livida Linnaeus, 1758
Cantharis pallida Goeze, 1777
Cantharis rustica Fallén, 1807 ***Téléphone moine, Cantharide rustique***
Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790) ***Capnode de l'Oseille***
Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1760) ***Capnode du Pêcher***
Carabus alysidotus Illiger, 1798 ***Carabe à chainons***
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 ***Carabe chagriné***
Cardiophorus anticus Erichson, 1840
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777) ***Taupin noir à pattes fauves***
Catapion pubescens (Kirby, 1811)
Catops coracinus Kellner, 1846
Cebrio gigas (Fabricius, 1787)
Cephalota circumdata (Dejean in Latreille & Dejean, 1822)
- Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 ***Grand Capricorne (Le)***

Cerambyx miles Bonelli, 1812
Cerambyx scopolii Fuessly, 1775 ***Petit capricorne (Le)***
Cerambyx welensii (Küster, 1845) ***Capricorne velouté***
Cerocoma schreberi Fabricius, 1781
Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767) ***Cartalle des crucifères***
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) ***Cétoine dorée (la), Hanneton des roses***
Cetonischema speciosissima (Scopoli, 1786) ***Grande cétoine dorée***
Chaetocnema depressa (Boieldieu, 1859)
Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) ***Altise noire dorée***
Chaetocnema tibialis (Illiger, 1807)
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)
Charagmus intermedius (Küster, 1847)
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1791)
Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781)
Chlaenius tibialis Dejean, 1826
Chlaenius velutinus (Duftschmid, 1812)
Chlorophanus pollinosus (Fabricius, 1792)
Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758)
Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777) ***Clyte poilu***
Chlorophorus glaucus (Fabricius, 1781)
Chlorophorus ruficornis (Olivier, 1790)
Chlorophorus sartor (Müller, 1766)
Chlorophorus trifasciatus (Fabricius, 1781)
Chlorophorus varius (Müller, 1766) ***Clyte varié***
Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758) ***Chrysanthie verte***
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) ***Chrysobothre ressemblant***
Chrysolina americana (Linnaeus, 1758) ***Chrysomèle du Romarin***
Chrysolina bankii (Fabricius, 1775)
Chrysolina carnifex (Fabricius, 1792)
Chrysolina fuliginosa (Olivier, 1807)
Chrysolina grossa (Fabricius, 1792)
Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825)
Chrysolina lepida (Olivier, 1807)
Chrysolina quadrigemina (Suffrian, 1851)
Chrysolina sanguinolenta (Linnaeus, 1758) ***Chrysomèle noire à bordure rouge***
Chrysomela populi Linnaeus, 1758 ***Grande chrysomèle rouge à corselet bleu***
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 ***Cicindèle champêtre***
Cicindela maroccana Fabricius, 1801
Cistapion cyanescens (Gyllenhal, 1833)
Clanoptilus elegans (Olivier, 1790)
Clanoptilus marginellus (Olivier, 1790)
Clanoptilus rufus (Olivier, 1790) ***Malachie rousse***
Clytra atraphaxidis (Pallas, 1773)
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Clytus arietis (Linnaeus, 1758) ***Clyte bélier (Le), Clyte guêpe (Le)***
Clytus rhamni Germar, 1817
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 ***Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu***
Coccinella undecimpunctata Linnaeus, 1758
Colotes javeti Jacquelin du Val, 1852
Colotes maculatus (Laporte de Castelnau, 1838)
Coniatus tamarisci (Fabricius, 1787) ***Charançon du Tamaris***
Contacyphon variabilis (Thunberg, 1787)
Copris hispanus (Linnaeus, 1764)
Coptocephala linnaeana Petitpierre & Alonzo-Zagara, 2000
Coraebus fasciatus (Villers, 1789)
Coraebus rubi (Linnaeus, 1767) ***Bupreste du rosier***
Coraebus undatus (Fabricius, 1787)
Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802)
Cordicollis instabilis (W.L.E. Schmidt, 1842)
Corimalia tamarisci (Gyllenhal, 1838)
Cratosilis denticollis (Schummel, 1844)
Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) ***Criocère porte-croix de l'asperge***
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) ***Criocère rouge à points noirs***
Crioceris paracenthesis (Linnaeus, 1767)
Cryphaeus cornutus (Fischer von Waldheim, 1823)
Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1760)
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790
Cryptocephalus crassus Olivier, 1791 ***Cryptocéphale massif***
Cryptocephalus fulvus (Goeze, 1777)
Cryptocephalus globicollis Suffrian, 1847

Cryptocephalus macellus Suffrian, 1860
Cryptocephalus marginellus Olivier, 1791
Cryptocephalus mariae Mulsant & Rey, 1852
Cryptocephalus ocellatus Drapiez, 1819
Cryptocephalus politus Suffrian, 1853
Cryptocephalus pulchellus Suffrian, 1848
Cryptocephalus rufipes (Goeze, 1777)
Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791 ***Cryptocéphale à corselet rugueux***
Cryptocephalus sexmaculatus Olivier, 1791
Cryptocephalus trimaculatus Rossi, 1790 ***Cryptocéphale à trois tâches***
Cryptocephalus turcicus Suffrian, 1847
Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781
Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763)
Cryptophonus tenebrosus (Dejean, 1829)
Curculio glandium Marsham, 1802
Curculio pellitus (Boheman, 1843)
Cylindera arenaria (Fuessly, 1775)
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)
Cylindera paludosa (Dufour, 1820)
Cylindera trisignata (Dejean in Latreille & Dejean, 1822)
Cylindromorphus parallelus Fairmaire, 1859
Cyrtosus cyanipennis (Erichson, 1840)
Danacea ambigua Mulsant & Rey, 1868
Danacea nigritarsis (Küster, 1850)
Dasytes subaeneus Schönherr, 1817
Deilus fugax (Olivier, 1790)
Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)
Dendarus coarcticollis (Mulsant, 1854) ***Ténébrion triste***
Dermestes frischii Kugelann, 1792
Dermestes undulatus Brahm, 1790
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) ***Diapère du bolet***
Dicerca aenea (Linnaeus, 1760)
Dichillus minutus (Solier, 1838)
Dichromacalles diocletianus (Germar, 1817)
Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767)
Dicronychus incanus
Dienerella parilis (Rey, 1889)
Dienerella vincenti Johnson, 2007
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Divales bipustulatus (Fabricius, 1781)
Divales quadrimaculatus (Olivier, 1790)
Dixus capito (Audinet-Serville, 1821)
Dolichosoma lineare (Rossi, 1794)
Donus philanthus (Olivier, 1807)
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) ***Petite biche, Petite lucane***
Dromius agilis (Fabricius, 1787)
Dryops luridus (Erichson, 1847)
Duvalius raymondi Delarouzée, 1859
Dyschirius nitidus (Dejean, 1825)
Edaphus dissimilis (Aubé, 1863)
Elenophorus collaris (Linnaeus, 1767) ***Elénophore***
Enicopus pilosus (Scopoli, 1763) ***Enicopus pilosus***
Epuraea luteola Erichson, 1843
Eremobaris picturata (Schönherr, 1849)
Ergates faber (Linnaeus, 1760)
Ethelcus denticulatus (Schrank, 1781)
Euconnus cornutor Csiki, 1919
Eudolus quadriguttatus (Herbst, 1783)
Eupotosia affinis (Andersch, 1797) ***Cétoine verte***
Eurythyrea micans (Fabricius, 1792)

Eutrichapion punctiger (Paykull, 1792)
Eutrichapion viciae (Paykull, 1800)
Eutrichapion vorax (Herbst, 1797)
Exapion ulicis (Forster, 1771)
Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
Exomala succincta (Laporte de Castelnau, 1840)
Exosoma lusitanicum (Linnaeus, 1767) ***Lupérus portugais***
Galeruca interrupta Illiger, 1802
Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) ***Gastrophyse de la Renouée***
Gnatocerus cornutus (Fabricius, 1798)
Gompelia neglecta (Jacquelin du Val, 1863)
Gonodera luperus (Herbst, 1783)
Gracilia minuta (Fabricius, 1781)
Graniger cordicollis (Audinet-Serville, 1821)
Guignotus pusillus
Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787)
Gyrinus paykulli Ochs, 1927
Gyrinus urinator Illiger, 1807
Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775)
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) ***Coccinelle asiatique (la)***
Harpalus attenuatus Stephens, 1828
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)
Harpalus sulphuripes Germar, 1824
Helophorus rufipes (Bosc, 1791)
Helops caeruleus (Linnaeus, 1758)
Henosepilachna argus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) ***Coccinelle argus***
Hesperophanes sericeus (Fabricius, 1787)
Hippodamia variegata (Goeze, 1777) ***Coccinelle des friches***
Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758 ***Hister à quatre tâches***
Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801)
Hoplia argentea (Poda, 1761)
Hycleus duodecimpunctatus (Olivier, 1811)
Hydraena testacea Curtis, 1830
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) ***Hydrophile noir picoté***
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) ***Grand hydrophile***
Hylesinus toranio (D'Anthoine in Bernard, 1788)
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) ***Hyménalia à pattes rouges***
Hypera conmaculata (Herbst, 1795)
Hypera meles (Fabricius, 1792)
Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853
Hypocacculus rubripes (Erichson, 1834)
Hypocaccus crassipes (Erichson, 1834)
Hypocoprus latridioides (Motschulsky, 1839)
Hypophyes pallidulus (Gravenhorst, 1807)
Hypurus bertrandi (Perris, 1852)
Icosium tomentosum Lucas, 1854
Kalcapion semivittatum (Gyllenhal, 1833)
Kissister minimus (Laporte de Castelnau, 1840)
Korynetes geniculatus Klug, 1842
Labidostomis cyanicornis (Germar, 1822)
Labidostomis humeralis (D.H. Schneider, 1792)
Labidostomis lusitanica (Germar, 1824)
Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792)
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)
Lachnaia cylindrica (Lacordaire, 1848)
Lachnaia pubescens (Dufour, 1820) ***Chrysomèle du Chêne***
Lachnaia tristigma (Lacordaire, 1848)

Lacon punctatus (Herbst, 1779)
Lamprodila festiva (Linnaeus, 1767) ***Bupreste du Genévrier***
Lamprodila mirifica (Mulsant, 1855)
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758) ***Ver luisant, Lampyre***
Langelandia anophtalma Aubé, 1842
Larinus cynarae (Fabricius, 1787)
Larinus leuzeae H. Fabre, 1870
Larinus maurus (Olivier, 1807) ***Larin des Maures***
Latipalpis plana (Olivier, 1790) ***Latipalpe à dos plat***
Leichenum pulchellum (Lucas, 1846)
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) ***Doryphore (Le)***
Leucohimatium arundinaceum Forskål, 1775
Leucomigus candidatus (Pallas, 1771)
Licinus planicollis Fauvel, 1888
Licinus silphoides (P. Rossi, 1790)
Lignyodes enucleator (Panzer, 1798)
Lixomorphus algirus (Linnaeus, 1758)
Lixus albomarginatus Boheman, 1842
Lixus angustus (Herbst, 1795)
Lixus cardui Olivier, 1807
Lixus cylindrus (Fabricius, 1781)
Lixus filiformis (Fabricius, 1781)
Lixus iridis Olivier, 1807 ***Lixe des ombellifères***
Lixus mucronatus (Olivier, 1791)
Lixus pulverulentus (Scopoli, 1763) ***Lixe poudreux***
Lixus punctiventris Boheman, 1835
Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781)
Longitarsus exsoletus (Linnaeus, 1758)
Longitarsus obliteratoides Gruev, 1973
Lophyra flexuosa (Fabricius, 1787)
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) ***Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane***
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) ***Mouche d'Espagne (la), Cantharide (la)***
Magdalis rufa Germar, 1824
Malvapion malvae (Fabricius, 1775) ***Becmare puce***
Mantura mathewsii (Curtis, 1833)
Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775)
Maurobaris spoliata (Boheman, 1836)
Mecinus simus (Mulsant & Rey, 1859)
Mediimorda angeliquae Leblanc, 2002
Mediimorda bipunctata (Germar, 1827)
Megischia curvipes (Brullé, 1832)
Melanimon tibiale (Fabricius, 1781)
Melanobaris morio (Boheman, 1844)
Melanobaris sinapis (Normand, 1937)
Melanophthalma fuscipennis (Mannerheim, 1844)
Melanotus tenebrosus (Erichson, 1841)
Meliboeus amethystinus (Olivier, 1790)
Meliboeus fulgidicollis (P.H. Lucas, 1846)
Meliboeus graminis (Panzer, 1799)
Meloe mediterraneus J. [G.] Müller, 1925
Meloe violaceus Marsham, 1802
Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) ***Hanneton commun (le)***
Merophysia sicula Kiesenwetter, 1872
Mesauletobius pubescens (Kiesenwetter, 1851)
Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) ***Mésose nébuleuse***
Metophthalmus niveicollis (Jacquelin du Val, 1859)
Microhoria fasciata (Chevrolat, 1834)
Microhoria terminata (W.L.E. Schmidt, 1842)
Microrhagus emyi (Rouget, 1856)

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) ***Monochame de Provence***
Mononychus pseudacori
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784) ***Charançon de l'Iris des marais***
Mordellistena pentas Mulsant, 1856
Mordellistena perroudi Mulsant, 1856
Mordellistena pumila (Gyllenhal, 1810)
Morimus asper (Sulzer, 1776)
Mycterus curculioides (Fabricius, 1781)
Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767) ***Mylabre à quatre points***
Mylabris variabilis (Pallas, 1781) ***Mylabre variable***
Myriochila melancholica (Fabricius, 1798)
Myrmecopora fugax (Erichson, 1839)
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) ***Coccinelle des pins***
Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758)
Nacerdes carniolica (Gistel, 1834)
Nacerdes raymondi (Mulsant & Godart, 1860)
Nalassus dryadophilus (Mulsant, 1854)
Nanodiscus transversus (Aubé, 1850)
Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)
Neoglocianus maculaalba (Herbst, 1795)
Netocia morio (Fabricius, 1781) ***Cétoine noire (la)***
Netocia oblonga (Gory & Percheron, 1833) ***Cétoine oblongue***
Niphona picticornis Mulsant, 1839
Noterus crassicornis (O.F. Müller, 1776)
Notiophilus rufipes Curtis, 1829
Notoxus trifasciatus Rossi, 1792
Nustera distigma (Charpentier, 1825)
Nycteus meridionalis Laporte de Castelnau, 1836
Ocypus fortunatarum Wollaston, 1871
Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763)
Oedemera atrata W.L.E. Schmidt, 1846
Oedemera barbara (Fabricius, 1792)
Oedemera crassipes Ganglbauer, 1881
Oedemera femoralis Olivier, 1803
Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)
Oedemera lurida (Marsham, 1802)
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763) ***Oedemère noble***
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767) ***Oedemère ochracée***
Oedemera simplex (Linnaeus, 1767)
Oenopia lyncea (Olivier, 1808)
Omophlus lepturoides (Fabricius, 1787) ***Omophlus orangé***
Omophlus rugosicollis (Brullé, 1832)
Omophron limbatum (Fabricius, 1777) ***Omophron bordé***
Onthophagus lemur (Fabricius, 1782) ***Onthophage lémur***
Onthophagus opacicollis Reitter, 1892
Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767) ***Onthophage vacca***
Oochrotus unicolor Lucas, 1852
Ophonus incisus (Dejean, 1829)
Ophonus subquadratus (Dejean, 1829)
Opilo abeillei Korge, 1960
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) ***Phytoécie bleuâtre***
Orphilus niger (Rossi, 1790)
Orsodacne lineola (Panzer, 1795)
Orthomus barbarus Dejean, 1828
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) ***Scarabée rhinocéros européen, Rhinocéros***
Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) ***Barbot, Pique-prune***
Othius punctulatus (Goeze, 1777) ***Staphylin à étuis marons pointillés***
Otiorhynchus armatus Boheman, 1842 ***Otiorhynque granuleux***

Otiorhynchus meridionalis Gyllenhal, 1834 ***Otiorhynque méridional***
Oxystoma pomonae (Fabricius, 1798)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) ***drap mortuaire (le)***
Pachybrachis azureus Suffrian, 1848
Pachylister inaequalis (Olivier, 1789)
Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)
Pachytychius hordei (Brullé, 1832)
Paederidus rubrothoracicus (Goeze, 1777) ***Staphylin noir à corselet rouge***
Paradromius longiceps (Dejean, 1826)
Paraphloeostiba gayndahensis (MacLeay, 1873)
Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777)
Parmena solieri Mulsant, 1839
Penichroa fasciata (Stephens, 1831)
Pentodon bidens (Pallas, 1771)
Perapion hydrolapathi (Marsham, 1802)
Perapion violaceum (W. Kirby, 1808)
Perigona nigriceps (Dejean, 1831)
Perileptus areolatus (Creutzer, 1799)
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)
Phaleria bimaculata (Linnaeus, 1767)
Phaleria provincialis Fauvel, 1901
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802)
Philorhizus notatus (Stephens, 1827)
Phrissotrichum tubiferum (Gyllenhal, 1833)
Phylan pilipes (Herbst, 1797)
Phyllobius roboretanus Gredler, 1882
Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781)
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775)
Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)
Phyllotreta foudrasi Brisout de Barneville, 1873
Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758)
Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775)
Phyllotreta procera (L. Redtenbacher, 1849)
Phyllotreta punctulata (Marsham, 1802)
Phytoecia icterica (Schaller, 1783)
Phytoecia rufipes (Olivier, 1795) ***Phytoécie à fémurs rouges***
Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)
Pimelia muricata Olivier, 1795
Pirapion immune (Kirby, 1808)
Pissodes piceae (Illiger, 1807)
Pityophagus quercus Reitter, 1877
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796)
Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1767) ***Altise de la Guimauve***
Podagrica fuscipes (Fabricius, 1775) ***Altise des mauves***
Podagrica menetriesii (Faldermann, 1837)
Poecilium fasciatum (Villers, 1789)
Poecilium lividum (Rossi, 1794)
Poecilonota variolosa (Paykull, 1799)
Pogonus riparius Dejean, 1828
Polydrusus impressifrons Gyllenhal, 1834 ***Charançon vert pâle***
Polydrusus marginatus Stephens, 1831
Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) ***Hanneton foulon, Hanneton des pins***
Potosia cuprea (Fabricius, 1775) ***Cétoine cuivrée (La)***
Potosia opaca (Fabricius, 1787) ***Cétoine mate (la)***
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) ***Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points***
Protapion filirostre (Kirby, 1808)
Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785)
Protapion nigritarse (Kirby, 1808)
Protapion pedale (Mulsant & Rey, 1858)
Psammodius asper (Fabricius, 1775)
Psammodius basalis Mulsant & Rey, 1870
Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 1833)
Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775)
Pseudoophonus griseus (Panzer, 1797)
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)
Pseudoprotapion elegantulum (Germar, 1818)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777) ***Pseudovadonie livide***
Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) ***Psilothrix vert***
Psylliodes marcida (Illiger, 1807)
Psylliodes puncticollis Rosenhauer, 1856
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) ***Coccinelle à vingt-deux points***
Ptinus bidens Olivier, 1790
Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784)
Purpuricenus budensis (Götz, 1783) ***Purpuricène du Chêne vert***
Rantus pulverosus
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) ***Téléphore fauve***
Rhantus suturalis (W.S. MacLeay, 1825) ***Ditique picoté***
Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792) ***Charançon du Chardon penché***
Rhinoncus castor (Fabricius, 1792)
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)
Rhynchites giganteus Krynicki, 1832
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1791)
Rhynchophorus palmarum (Linnaeus, 1758)
Rhyssemus sulcatus (Olivier, 1789)
Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) ***Rosalie des Alpes***
Rutpela maculata (Poda, 1761) ***Lepture tacheté (Le)***
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Saperda populnea (Linnaeus, 1758)
Saprinus tenuistrius Marseul, 1855
Scarabaeus pius (Illiger, 1803)
Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792 ***Scarabée semi-ponctuée***
Scarabaeus typhon (Fischer, 1823)
Scaurus atratus Fabricius, 1775
Scaurus tristis Olivier, 1795
Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815)
Scraptia dubia Olivier, 1790
Scymnus auritus Westman in Thunberg, 1795
Scymnus bivulnerus Capra & Fürsch, 1967
Scymnus frontalis (Fabricius, 1787)
Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1777)
Scymnus suturalis Westman in Thunberg, 1795
Sericotrupes niger (Marsham, 1802) ***Géotrupe noir***
Sibinia seriata Desbrochers des Loges, 1873
Sibinia viscariae (Linnaeus, 1760)
Smicronyx cyaneus (Gyllenhal, 1835)
Spermophagus calystegiae (Lukjanovitch & Ter-Minassian, 1957)
Spermophagus kuesteri Schilsky, 1905
Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) ***Mylabre satiné***
Sphaeroderma rubidum (Graells, 1858)
Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775)
Sphenoptera barbarica (Gmelin, 1790)
Sphenoptera gemmata (Olivier, 1790)
Sphinginus lobatus (Olivier, 1790)
Squamapion atomarium (Kirby, 1808)
Stenolophus discophorus (Fischer von Waldheim, 1823)
Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)
Stenopterus ater (Linnaeus, 1767) ***Sténoptère noir***
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767) ***Sténoptère roux***
Stenosis sardoa (Küster, 1848)
Stenurella bifasciata (Müller, 1776)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) ***Lepture noir***
Stephanopachys quadricollis (Marseul, 1878)
Stereonychus fraxini (De Geer, 1775)
Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775)
Stictoleptura fontenayi (Mulsant, 1839)
Stictoleptura fulva (De Geer, 1775) ***Lepture fauve***
Stictoleptura hybrida (Rey, 1885)
Stictoleptura trisignata (Fairmaire, 1852)
Stylosomus tamarisci (Herrich-Schäffer, 1836)
Styphlus penicillus Schönherr, 1826
Symbiotes gibberosus (P.H. Lucas, 1846)
Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787)
Temnorhinus mendicus (Gyllenhal, 1834)
Tentyria interrupta Latreille, 1807
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) ***Crache-sang***
Tituboea biguttata (Olivier, 1791)
Tituboea sexmaculata (Fabricius, 1781) ***Antipe à six tâches***
Tolyphus granulatus (Guérin-Méneville, 1834)
Tomicus destruens (Wollaston, 1865)
Trachypteris picta (Pallas, 1773)
Trachys minutus (Linnaeus, 1758)
Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) ***Trichie fasciée***
Trichius gallicus Dejean, 1821 ***Trichie du rosier***
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792) ***Clairon des ruches***
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) ***Clairon des abeilles***
Trichodes leucopsideus (Olivier, 1795) ***Clairon à épaulettes***
Trichoferus fasciculatus (Faldermann, 1837)
Trichoferus griseus (Fabricius, 1792)
Trichoferus holosericeus (Rossi, 1790)
Triodontella aquila (Laporte de Castelnau, 1840)
Trogoderma versicolor (Creutzer, 1799)
Tropinota hirta (Poda, 1761)
Tropinota squalida (Scopoli, 1763) ***Cétoine hérissée***
Trox perlatus (Goeze, 1777)
Tychius aureolus Kiesenwetter, 1852
Tychius meliloti Stephens, 1831
Tychius sharpi Tournier, 1874
Tychius tibialis Boheman, 1843
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1760)
Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787) ***Vadonie à un point***
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) ***Cétoine punaise***
Vesperus luridus (Rossi, 1794)
Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) ***Galéruque de l'orme (La)***
Xyleborus monographus (Fabricius, 1792)
Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906
Zonitis flava Fabricius, 1775
Zonitis immaculata (Olivier, 1789)

CRUSTACÉS

Acaeroplastes melanurus (Budde-Lund, 1885)
Armadillidium assimile Budde-Lund, 1879
Armadillidium granulatum Brandt, 1833
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) ***Cloporte commun (Le), Armadille commune (L'), Armadille mélangée (L')***
Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) ***Caridine, Crevette d'eau douce***
Branchipus schaefferi Fischer von Waldheim, 1834
Chaetophiloscia cellaria (Dollfus, 1884)
Chirocephalus diaphanus Prévost, 1803 ***Chirocéphale diaphane (Le)***
Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) ***Écrevisse américaine (L')***
Lucasius pallidus (Budde-Lund, 1885)
Niphargus Schiødte, 1849
Porcellio dilatatus Brandt, 1833
Porcellio lamellatus Budde-Lund, 1885
Procambarus clarkii (Girard, 1852) ***Écrevisse de Louisiane (L'), Écrevisse rouge de Louisiane (L'), Écrevisse rouge des marais (L')***
Echinogammarus pungens (Milne-Edwards, 1840)
Echinogammarus tabu G.S. Karaman, 1971

HÉMIPTÈRES

Acrosternum heegeri Fieber, 1861
Acrosternum millierei (Mulsant & Rey, 1866)
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) ***Punaise à tête allongée***
Aelia germari Küster, 1852
Aelia rostrata Boheman, 1852
Aethus pilosus (Herrich-Schäffer, 1834)
Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1790)
Antheminia absinthii (Wagner, 1952)
Arma custos (Fabricius, 1794)
Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
Beosus quadripunctatus (Müller, 1766)
Berytinus montivagus (Meyer-Dür, 1841)
Brachynema cinctum (Fabricius, 1775)
Brachynema germarii (Kolenati, 1846)
Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794)
Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787) ***Miride variable, Punaise décorée***
Camptopus lateralis (Germar, 1817) ***Alydide des genêts***
Canthophorus dubius (Scopoli, 1763)
Canthophorus maculipes (Mulsant & Rey, 1852)
Capsodes flavomarginatus (Donovan, 1798)
Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Carpocoris mediterraneus Tamanini, 1959
Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
Centrocoris spiniger (Fabricius, 1781)
Centrocoris variegatus Kolenati, 1845
Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) ***Demi-diable***
Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868
Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)
Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758)
Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)
Cicada orni Linnaeus, 1758 ***Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale panachée (la), Cacan (le)***
Cicadatra atra (Olivier, 1790) ***Cigale noire (la)***
Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) ***Cicadelle verte***
Cicadetta brevipennis Fieber, 1876
Cicadetta petryi Schumacher, 1924 ***Cigalette à ailes courtes (la)***
Codophila varia (Fabricius, 1787)
Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) ***Punaise cuirasse***
Coranus griseus (Rossi, 1790)
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) ***Corée marginée***
Coriomeris affinis (Herrich-Schäffer, 1839)

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)
Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794)
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) ***Corise de la jusquiame***
Cydnus aterrimus (Forster, 1771)
Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)
Deraeocoris punctum (Rambur, 1839)
Deraeocoris ribauti Wagner, 1943
Deraeocoris schach (Fabricius, 1781)
Derula flavoguttata Mulsant & Rey, 1856
Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)
Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781)
Dicranocephalus setulosus (Ferrari, 1874)
Dictyla echii (Schrank, 1782)
Dictyla nassata (Puton, 1874)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) ***Punaise brune à antennes & bords panaches***
Dryadocoris apicalis (Herrich-Schäffer, 1842)
Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775)
Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)
Enoplops scapha (Fabricius, 1794)
Erianotus lanosus (Dufour, 1834)
Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) ***Punaise verte à raies & rouges ou blanches***
Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)
Eurydema ventralis Kolenati, 1846
Eurygaster austriaca (Schrank, 1776)
Eurygaster hottentotta (Fabricius, 1775)
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) ***Punaise tortue brune***
Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)
Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776)
Gampsocoris punctipes (Germar, 1822)
Geocoris erythrocephalus (Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1825) ***Géocore à tête rouge***
Geotomus elongatus (Herrich-Schäffer, 1840)
Geotomus punctulatus (A. Costa, 1847)
Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804)
Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) ***Gonocère du buis***
Gonocerus insidiator (Fabricius, 1787)
Gonocerus juniperi Herrich-Schäffer, 1839 ***Gonocère du genévrier***
Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) ***Punaise arlequin***
Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 1775)
Heterogaster artemisiae Schilling, 1829
Holcogaster fibulata (Germar, 1831)
Holcostethus albipes (Fabricius, 1781)
Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794)
Horvathiolus superbus (Pollich, 1781)
Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) ***Hydromètre stagnant, Hydromètre des étangs***
Ischnocoris flavipes Signoret, 1865
Ischnopeza hirticornis (Herrich-Schäffer, 1850)
Issus coleoptratus (Fabricius, 1781) ***Issside commun***
Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)
Lasiacantha histricula (Puton, 1878)
Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845)
Ledra aurita (Linnaeus, 1758) ***Grand Diable***
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 ***Punaise americaine du pin, Punaise du pin, Leptoglosse américain***
Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758)
Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794)
Loxocnemis dentator (Fabricius, 1794)
Lygaeosoma sardeum Spinola, 1837
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) ***Punaise écuyère***
Lygus gemellatus (Herrich-Schäffer, 1835)
Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) ***Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la)***
Maccevethus corsicus Signoret, 1862
Macroplax fasciata (Herrich-Schäffer, 1835)
Macroscytus brunneus (Fabricius, 1803)
Menaccarus arenicola (Scholz, 1847)
Metcalfa pruinosa (Say, 1830) ***Cicadelle blanche, Cicadelle pruineuse, Cicadelle américaine***
Myrmus miriformis (Fallén, 1807)
Neottiglossa bifida (A. Costa, 1847)
Neottiglossa flavomarginata (Lucas, 1849)
Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 1830)
Neottiglossa lineolata (Mulsant & Rey, 1852)
Nepa cinerea Linnaeus, 1758 ***Nèpe cendrée, Nèpe rousse, Scorpion d'eau, Punaise scorpion***
Neurocladus brachiidens (Dufour, 1851)
Nezara viridula (Linnaeus, 1758) ***Punaise verte ponctuée***
Ochetostethus tarsalis (Mulsant & Rey, 1852)
Ochterus marginatus (Latreille, 1804) ***Ochterus marginé***
Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1760)
Odontoscelis lineola Rambur, 1839
Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790)
Odontotarsus robustus Jakovlev, 1884
Oncocephalus pilicornis Reuter, 1882
Oncocephalus squalidus (Rossi, 1790)
Orius niger (Wolff, 1811)
Orsillus reyi Puton, 1871
Orthocephalus saltator (Hahn, 1835)
Oxycarenus pallens (Herrich-Schäffer, 1850)
Pachyxyphus lineellus (Mulsant & Rey, 1852)
Palomena prasina (Linnaeus, 1760) ***Punaise verte***
Peirates stridulus (Fabricius, 1787) ***Rèduve pirate***
Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) ***Punaise à pattes rousses, Punaise des bois***
Peribalus strictus (Fabricius, 1803)
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) ***Philène spumeuse***
Phymata monstrosa (Fabricius, 1794)
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
Picromerus nigridens (Fabricius, 1803) ***Asopine***
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
Platyplax inermis (Rambur, 1839)
Plinthisus putoni Horváth, 1876
Podops curvidens Costa, 1843
Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) ***Punaise ponctuée***
Psacasta granulata (A. Costa, 1847)
Psacasta tuberculata (Fabricius, 1781)
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) ***Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse***
Raglius confusus (Reuter, 1886)
Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) ***Punaise nébuleuse, Punaise grise***
Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)
Rhynocoris cuspidatus Ribaut, 1921
Rhynocoris erythropus (Linnaeus, 1767) ***Rèduve à pattes rouges***
Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)
Sciocoris conspurcatus majusculus Linnavuori, 1964
Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794)
Sciocoris helferi Fieber, 1851
Sciocoris homalonotus Fieber, 1851
Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851
Sciocoris maculatus Fieber, 1851
Sciocoris sideritidis Wollaston, 1858
Sciocoris sulcatus Fieber, 1851
Scolopostethus patruelis Horváth, 1892
Sehirus morio (Linnaeus, 1760)
Sphedanolestes sanguineus (Fabricius, 1794)
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) ***Punaise à damier***
Stagonomus amoenus (Brullé, 1832)
Stagonomus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
Staria lunata (Hahn, 1835)
Stephanitis pyri (Fabricius, 1775)
Sternodontus obtusus Mulsant & Rey, 1856
Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977 ***Membracide bison***
Strobilotoma typhaecornis (Fabricius, 1803)
Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)
Taphropeltus contractus (Herrich-Schäffer, 1835)
Tettigettalna argentata (Olivier, 1790) ***Cigalette argentée (la)***
Tettigettula pygmea (Olivier, 1790) ***Cigalette pygmée (la)***
Tholagmus flavolineatus (Fabricius, 1798)
Tibicina garricola Boulard, 1983 ***Cigale du garric (la)***
Tibicina haematodes (Scopoli, 1763) ***Cigale rouge (la)***
Tingis cardui (Linnaeus, 1758)
Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758) ***Punaise noire à quatre taches blanches***
Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)
Ventocoris falcatus (Cyrillus, 1791)
Ventocoris rusticus (Fabricius, 1781) ***Pentatome de la nigelle***
Vilpianus galii (Wolff, 1802)
Xanthochilus saturnius (Rossi, 1790)
Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758) ***Punaise verte bleuâtre***

HÉTÉROCÈRES

Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) ***Zérène du Groseillier (La)***
Abraxas pantaria (Linnaeus, 1767) ***Zérène du Frêne (La), Bizarre (La), Phalène méridionale (La)***
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) ***Plusie de l'Ortie (La)***
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) ***Plusie à lunettes (La)***
Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) ***Sphinx Tête-de-Mort (Le)***
Achroia grisella (Fabricius, 1794)
Achyra nudalis (Hübner, 1796)
Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) ***Collier blanc (Le)***
Acontia trabealis (Scopoli, 1763) ***Arlequinette jaune (L')***
Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
Acrobasis legatea (Haworth, 1811)
Acrobasis obliqua (Zeller, 1847)
Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Chevelure dorée (La)***
Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle de l'Euphorbe (La)***
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle mégacéphale (La)***
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) ***Psi (Le)***
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) ***Noctuelle de la Patience (La)***
Actinotia polyodon (Clerck, 1759) ***Camomillière (La)***
Adactylotis contaminaria (Hübner, 1813) ***Boarmie souillée (La)***
Adela australis (Heydenreich, 1851)
Adscita geryon (Hübner, 1813) ***Procris de l'Hélianthème (Le), Turquoise des Hélianthèmes (La)***
Adscita mannii (Lederer, 1853) ***Procris vert brillant (Le), Turquoise des Cistes (La)***
Adscita statices (Linnaeus, 1758) ***Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la Sarcille (La)***
Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) ***Clair-obscur (Le)***
Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aethes williana (Brahm, 1791)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Aglaope infausta (Linnaeus, 1767) ***Aglaopé des haies (L'), Zygène des Épines (La)***
Aglossa brabanti Ragonot, 1884
Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Hibernie grisâtre (L')***
Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriphila latistria (Haworth, 1811)
Agriphila selasella (Hübner, 1813)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) ***Sphinx du Liseron (Le)***
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) ***Xanthie ferruginée (La)***
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) ***Xanthie rufine (La)***
Agrochola litura (Linnaeus, 1760) ***Xanthie liturée (La)***
Agrochola lota (Clerck, 1759) ***Xanthie lavée (La)***
Agrochola lunosa (Haworth, 1809)
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Xanthie cannellée (La)***
Agrochola meridionalis (Staudinger, 1871) ***Xanthie lilas (La)***
Agrotis bigramma (Esper, 1790) ***Noctuelle trapue (La)***
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle Cendrée (La)***
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766) ***Pointillée (La)***
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) ***Point d'Exclamation (Le)***
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle baignée (La)***
Agrotis obesa Boisduval, 1829 ***Noctuelle obèse (La)***
Agrotis puta (Hübner, 1803) ***Noctuelle des Renouées (La)***
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle des Moissons (La)***
Agrotis spinifera (Hübner, 1808) ***Agrotide sagittée (L')***
Agrotis trux (Hübner, 1824) ***Noctuelle farouche (La)***
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) ***Porte-Flèches (Le)***
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) ***Boarmie recourbée (La)***
Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839) ***Phalène distincte (La), Lomographe précoce (Le)***
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) ***Aubépinière (L')***
Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 1855)
Amephana anarrhini (Duponchel, 1840) ***Cléophane de l'Anarrhine (La)***
Amephana aurita (Fabricius, 1787) ***Cléophane radiée (La)***
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Tache effacée (La), Noctuelle aveugle (La)***
Ammoconia senex (Geyer, 1828) ***Noctuelle sénile (La)***
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890)
Amphipyra effusa (Boisduval, 1828) ***Noctuelle diffuse (La)***
Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle livide (La)***
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) ***Pyramide (La)***
Anania crocealis (Hübner, 1796)
Anania testacealis (Zeller, 1847)
Anarta myrtilli (Linnaeus, 1760) ***Noctuelle de la Myrtille (La)***
Anarta sodae (Rambur, 1829)
Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylolomia disparalis Hübner, 1825
Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)
Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Violette (La), Cidarie dérivée (La)***
Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)

Antitype chi (Linnaeus, 1758) ***Chi (Le)***
Apaidia mesogona (Godart, 1824) ***Lithosie de Godart (La)***
Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Double-Feston (Le)***
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Doucette (La)***
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) ***Monoglyphe (La)***
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle basilaire (La)***
Aphelia viburnana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
Aplasta ononaria (Fuessly, 1783) ***Phalène de l'Arrête-Boeuf (La)***
Aplocera efformata (Guenée, 1858) ***Petite Rayure (La)***
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) ***Triple Raie (La), Rayure commune (La)***
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Nyssie hispide (La)***
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) ***Tortue (La)***
Apopestes spectrum (Esper, 1787) ***Spectre (Le)***
Aporophyla australis (Boisduval, 1829) ***Xyline australe (La)***
Aporophyla canescens (Duponchel, 1826) ***Xyline blanchissante (La), Xyline de l'Asphodèle (La)***
Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) ***Noctuelle boueuse (La)***
Aporophyla nigra (Haworth, 1809) ***Noctuelle anthracite (La)***
Apterona crenulella (Bruand, 1853)
Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Arctia caja (Linnaeus, 1758) ***Ecaille Martre (L'), Hérissonne (La)***
Arctia festiva (Hufnagel, 1766) ***Ecaille rose (L')***
Arctia tigrina (Villers, 1789) ***Ecaille fasciée (L')***
Arctia villica (Linnaeus, 1758) ***Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')***
Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Boarmie lunulée (La)***
Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Aspilate jaunâtre (L')***
Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) ***Aspilate ochracée (L')***
Atethmia centrago (Haworth, 1809) ***Xanthie topaze (La)***
Atypha pulmonaris (Esper, 1790) ***Caradrine de la Pulmonaire (La)***
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) ***Gamma (Le)***
Autographa jota (Linnaeus, 1758) ***Iota (Le)***
Autophila cataphanes (Hübner, 1813) ***Chéirophane des Genêts (La)***
Autophila dilucida (Hübner, 1808) ***Chéirophane du Sainfoin***
Axia margarita (Hübner, 1813) ***Timie-Perle (La)***
Axylia putris (Linnaeus, 1760) ***Noctuelle putride (La)***
Bankesia desplatsella Nel, 1999
Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Sésie ichneumon (La)***
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) ***Halias du Chêne (La)***
Biston strataria (Hufnagel, 1767) ***Biston marbré (Le)***
Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
Bradyrrhoa cantenerella (Duponchel, 1837)
Brithys crini (Fabricius, 1775) ***Noctuelle du Pancrais (La)***
Bryophila domestica (Hufnagel, 1766) ***Bryophile perlée (La)***
Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Bryophile fraisillée (La)***
Bryophila ravula (Hübner, 1813) ***Bryophile lupuline (La)***
Bryophila vandalusiae (Duponchel, 1842) ***Bryophile andalouse***
Bryotropha plebejella (Zeller, 1847)
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) ***Fidonie du Pin (La)***
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) ***Cabère virginale (La), Délicate (La)***
Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
Calamodes occitanaria (Duponchel, 1829) ***Boarmie occitane (La)***
Callopistria latreillei (Duponchel, 1827) ***Flammèche (La)***
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) ***Linariette (La)***
Calophasia opalina (Esper, 1794) ***Cléophane opaline (La)***
Calophasia platyptera (Esper, 1788) ***Cléophane platyptère (La)***
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) ***Brocatelle d'or (La)***

Caradrina aspersa Rambur, 1834 ***Caradrine aspergée (La)***
Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) ***Noctuelle cubiculaire (La)***
Caradrina flavirena Guenée, 1852 ***Caradrine trouée (La)***
Caradrina fuscicornis Rambur, 1832 ***Caradrine trouée (La)***
Caradrina germainii (Duponchel, 1935) ***Caradrine noirâtre (La)***
Caradrina kadenii Freyer, 1836 ***Caradrine rouillée***
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle des Haies (La)***
Caradrina noctivaga Bellier, 1863 ***Caradrine aveugle (La)***
Caradrina proxima Rambur, 1837 ***Caradrine maculée (La)***
Caradrina selini Boisduval, 1840 ***Caradrine du Sélin***
Carcina quercana (Fabricius, 1775)
Cardepia sociabilis (de Graslin, 1850) ***Hadène de la Camphorine (L')***
Caryocolum mazeli Huemer & Nel, 2005
Casilda consecraria (Staudinger, 1871) ***Phalène consacrée (La)***
Cataclysme riguata (Hübner, 1813) ***Veinée (La)***
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
Catarhoe basochesiata (Duponchel, 1831) ***Mélanthie précoce***
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Eubolie roussâtre (L')***
Catastia marginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Alchimiste (L')***
Catocala coniuncta (Esper, 1787) ***Conjointe (La)***
Catocala conversa (Esper, 1783) ***Compagne (La)***
Catocala dilecta (Hübner, 1808) ***Bien-Aimée (La)***
Catocala electa (Vieweg, 1790) ***Elue (L')***
Catocala elocata (Esper, 1787) ***Déplacée (La)***
Catocala nupta (Linnaeus, 1767) ***Mariée (La)***
Catocala nymphaea (Esper, 1787) ***Lichénée vestale (La)***
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) ***Nymphagogue (La)***
Catocala optata (Godart, 1824) ***Choisie (La), Lichénée de Godart (La)***
Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Promise (La)***
Catocala puerpera (Giorna, 1791) ***Lichénée miniacée (La)***
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) ***Fiancée (La)***
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
Celypha cespitana (Hübner, 1817)
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cerastis faceta (Treitschke, 1835) ***Cérastide australe (La)***
Cerura vinula (Linnaeus, 1758) ***Grande Queue-Fourchue (La)***
Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800) ***Sésie de Montpellier (La)***
Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Sésie tenthrède (La)***
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle trilignée (La)***
Charissa glaucinaria (Hübner, 1799) ***Gnophos glauque (La)***
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ***Gnophos moisie (La)***
Charissa pullata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Gnophos tannée (La)***
Charissa variegata (Duponchel, 1830) ***Gnophos bigarrée (La)***
Chelis maculosa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Ecaille maculée (L'), Ecaille tachetée (L')***
Chemerina caliginearia (Rambur, 1833) ***Hibernie enfumée (L')***
Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Chésias du Genêt (La)***
Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809) ***Philobie du Tamaris (La)***
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) ***Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)***
Chilo luteellus (Motschulsky, 1866)
Chilodes maritima (Tauscher, 1806) ***Nonagrie du Phragmite (La)***
Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle du Millepertuis (La)***
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) ***Chlorée (La)***
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) ***Herbacée (L'), Phalène verte des Callunes (La)***
Choreutis nemorana (Hübner, 1799)
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) ***Plusie chalcite (La)***
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) ***Petite Epine (La)***
Clasperia cuencalis
Cleoceris scoriacea (Esper, 1789) ***Noctuelle du Lys-des-Prés (La)***
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ***Cléophane concave (La)***
Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
Clepsis pallidana (Fabricius, 1777)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758) ***Hausse-Queue blanche (La), Courtaud (Le)***
Clostera pigra (Hufnagel, 1766) ***Hausse-Queue brune (La), Recluse (La)***
Clytie illunaris (Hübner, 1813) ***Ophiuse du Tamaris (L'), Ophiuse de la Lorette (L')***
Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
Cnephasia cupressivorana (Staudinger, 1871)
Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)
Cochylis millierana (Peyerimhoff, 1877)
Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809) ***Phalène lapidée (La)***
Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840) ***Nebuleuse délavée (La)***
Coenotephria salicata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Nébuleuse commune (La)***
Coleophora luteolella Staudinger, 1880
Coleophora mausolella Chrétien, 1908
Colostygia aptata (Hübner, 1813) ***Cidarie olivette (La)***
Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809) ***Cidarie pointillée (La)***
Colotois pennaria (Linnaeus, 1760) ***Himère-plume (L'), Phalène emplumée (La)***
Compsoptera jourdanaria (Serres, 1826) ***Fidonie à festons (La)***
Compsoptera opacaria (Hübner, 1819) ***Fidonie pointue (La)***
Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle limoneuse (La), Noctuelle des Silènes (La)***
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Orrhodie érythrocéphale (L'), Hyacinthe (L')***
Conistra ligula (Esper, 1791) ***Orrhodie ligulée (L')***
Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Orrhodie tigrée (L')***
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) ***Orrhodie grise (L')***
Conistra staudingeri (Graslin, 1863) ***Noctuelle des Abbés (La)***
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1760) ***Orrhodie de l'Airelle (L')***
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) ***Crible (Le)***
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) ***Cosmie Baie (La)***
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) ***Nacarat (Le)***
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) ***Trapèze (Le)***
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) ***Lynx (Le)***
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) ***Cossus gâte-bois (Le)***
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) ***Phalène convexe (La)***
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Crambus perlellus (Scopoli, 1763)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Troënière (La)***
Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 ***Crocalle du Genévrier (La)***
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) ***Phalène de la Mancienne (La), Crocalle commune (La)***
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) ***Crocalle du Prunellier (La), Crocalle brune (La)***
Crocidosema plebejana Zeller, 1847
Cryopega bajaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Hibernie messagère (L')***
Cryphia algae (Fabricius, 1775) ***Bryophile vert-mousse (La)***
Cryphia ochsi (Boursin, 1940) ***Bryophile modeste (La)***
Ctenoplusia accentifera (Lefèbvre, 1827) ***Plusie de la Menthe (La)***
Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle argentée (La)***
Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Cucullie de la Camomille (La)***
Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Cucullie de la Laitue (La)***
Cucullia santolinae Rambur, 1834 ***Cucullie de la Santoline (La)***

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) ***Ombrageuse (L')***
Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840 ***Cucullie de la Linosyride (La)***
Cyclophora pendularia (Clerck, 1759) ***Ephyre orbiculaire (L'), Ephyre lichénée (L')***
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) ***Ephyre ponctuée (L'), Soutenue (La)***
Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799) ***Ephyre pupillée (L')***
Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855) ***Ephyre Trois-Cerceaux (L')***
Cydalima perspectalis (Walker, 1859) ***Pyrale du buis***
Cydia amplana (Hübner, 1799)
Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Cymbalophora pudica (Esper, 1785) ***Ecaille tesselée (L'), Ecaille pudique (L')***
Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) ***Sphinx du Laurier-rose (Le)***
Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) ***Grand Sphinx de la Vigne (Le)***
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) ***petit Sphinx de la Vigne (Le)***
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) ***Noctuelle argentule (La)***
Deltote uncula (Clerck, 1759) ***Ancre (L')***
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) ***Bombyx du Pin (Le)***
Denticera divisella (Duponchel, 1842)
Denticucullus pygmina (Haworth, 1809) ***Nonagrie des Laiches (La)***
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) ***Vert-Doré (Le)***
Diacrisia purpurata (Linnaeus, 1758) ***Ecaille pourprée (L'), Ecaille mouchetée (L')***
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) ***Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)***
Diaphora mendica (Clerck, 1759) ***Ecaille mendiante (L')***
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1760)
Dichagyris constanti (Millière, 1860) ***Agrotide de la Badasse (L')***
Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Agrotide forcipulée (L')***
Digrammia rippertaria (Duponchel, 1830) ***Philobie de Rippert (La)***
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) ***Double-Omega (Le)***
Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859)
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833)
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) ***Synède de l'Osier (La)***
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Triple Tache (La)***
Dryobota labecula (Esper, 1788) ***Ecu blanc (L')***
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) ***Jaspe vert (Le)***
Dryobotodes monochroma (Esper, 1790) ***Jaspe gris (Le)***
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) ***Jaspe menu (Le)***
Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789) ***Jaspe brun (Le)***
Duponchelia fovealis Zeller, 1847
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) ***Servante (La)***
Dysauxes punctata (Fabricius, 1781) ***Ménagère (La)***
Dyscia conspersaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Fidonie aspergée (La)***
Dyscia lentiscaria (Donzel, 1837) ***Fidonie des Lentisques (La)***
Dyscia penulataria (Hübner, 1819) ***Fidonie saumonnée (La)***
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) ***Passagère (La)***
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) ***Petite marbrure (La), Cossus marbré (Le)***
Eana viardi (Réal, 1953)
Earias clorana (Linnaeus, 1760) ***Halias du Saule (La)***
Earias insulana (Boisduval, 1833) ***Halias du Coton (La)***
Earias vernana (Fabricius, 1787) ***Halias du Peuplier (La)***
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ***Petite Boarmie du Cyprès (La)***

Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) ***Conspicillaire (La)***
Eilema caniola (Hübner, 1808) ***Manteau pâle (Le)***
Eilema complana (Linnaeus, 1758) ***Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)***
Eilema lurideola (Zincken, 1817) ***Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)***
Eilema palliatella (Scopoli, 1763) ***Manteau bicolore (Le), Manteau ivoirin (Le)***
Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847) ***Lithosie naine (La)***
Eilema uniola (Rambur, 1866) ***Manteau concolore (Le)***
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) ***Phalène picotée (La)***
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)
Endothenia marginana (Haworth, 1811)
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) ***Ennomos du Tilleul (L')***
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Ennomos rongée (L')***
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) ***Ennomos du Chêne (L')***
Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Deuil (Le), Écaille funèbre (L')***
Ephestia disparella Hampson, 1901
Ephestia elutella (Hübner, 1796)
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle gris-de-lin (La)***
Epimecia ustula (Freyer, 1835) ***Cléophane des Scabieuses (La)***
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
Epinotia dalmatana (Rebel, 1891)
Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
Epirrhoe alternata (O.F. Müller, 1764) ***Alternée (L')***
Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Mélanthie du Caille-Lait (La)***
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) ***Mélanippe claire (La)***
Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Epirrite diluée (L')***
Epischnia prodromella (Hübner, 1799)
Episema glaucina (Esper, 1789) ***Noctuelle du Muscari (La)***
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) ***Hibernie défeuillante (L')***
Eremohadena chenopodiphaga (Rambur, 1832) ***Noctuelle de la Salsovie (La)***
Eremohadena halimi (Millière, 1877) ***Noctuelle lusitanienne (La)***
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) ***Laineuse du Prunellier (La)***
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) ***Laineuse du Cerisier (La), Bombyx laineux (Le)***
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
Ethmia terminella Fletcher, 1938
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
Eublemma amoena (Hübner, 1803) ***Anthophile de l'Herbe-aux-Anes (L')***
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) ***Anthophile superbe (L')***
Eublemma elychrysi (Rambur, 1833) ***Anthophile de l'Immortelle (L')***
Eublemma minutata (Fabricius, 1794) ***Anthophile de la Perlière (L')***
Eublemma ostrina (Hübner, 1808) ***Anthophile pourprée (L')***
Eublemma parva (Hübner, 1808) ***Anthophile des Inules (L')***
Eublemma polygramma (Duponchel, 1842) ***Polygramme (La)***
Eublemma pura (Hübner, 1813) ***Anthophile chaulée (L')***
Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle purpurine (La)***
Eublemma scitula (Rambur, 1833) ***Coccidiphage (La)***
Eucarta amethystina (Hübner, 1803) ***Noctuelle améthyste (La)***
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) ***Cidarie de l'Aulne (La)***
Euchromius anapiellus (Zeller, 1847)
Euchromius cambridgei (Zeller, 1867)
Euchromius gozmanyi Bleszynski, 1961
Euchromius ramburiellus (Duponchel, 1836)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) ***Doublure jaune (La)***
Euclidia mi (Clerck, 1759) ***Mi (Le)***
Eucoptocnemis optabilis (Boisduval, 1837)
Eucosma cana (Haworth, 1811)
Eucosma conterminana (Guenée, 1845)
Eucrostes indigenata (Villers, 1789) ***Smaragdine rouillée (La)***
Eudonia angustea (Curtis, 1827)
Eugnorisma glareosa (Esper, 1788) ***Noctuelle à I double (La)***
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 ***Eupithécie printanière (L')***
Eupithecia breviculata (Donzel, 1837) ***Eupithécie rouillée (L')***
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Eupithécie des Centaurées (L'), Eupithécie oblongue (L')***
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 ***Eupithécie du Kermès (L')***
Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848 ***Eupithécie du Thym (L')***
Eupithecia dodoneata Guenée, 1858 ***Eupithécie sagittée (L')***
Eupithecia ericeata (Rambur, 1833) ***Eupithécie de la Bruyère (L')***
Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) ***Eupithécie de l'Aubépine (L')***
Eupithecia graphata (Treitschke, 1828) ***Eupithécie des Spergulaires (L')***
Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) ***Eupithécie réputée (L')***
Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839) ***Eupithécie embrouillée (L')***
Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848 ***Eupithécie lambrissée (L')***
Eupithecia liguriata Millière, 1884 ***Eupithecie du Sedum (L')***
Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Eupithécie de la Linaire (L')***
Eupithecia massiliata Millière, 1865 ***Eupithécie de Gibraltar (L'), Eupithécie marseillaise (L')***
Eupithecia nanata (Hübner, 1813) ***Eupithécie naine (L')***
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) ***Eupithécie de l'Oxycèdre (L')***
Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840 ***Eupithécie parcimonieuse (L')***
Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834) ***Eupithécie du Cyprès (L')***
Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Eupithécie chétive (L')***
Eupithecia rosmarinata Dardoin & Millière, 1865 ***Eupithécie du Romarin (L')***
Eupithecia scopariata (Rambur, 1833) ***Eupithécie des balais (L')***
Eupithecia semigraphata Bruand, 1850 ***Eupithécie des Labiées (L')***
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) ***Eupithécie du Chénopode (L')***
Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840 ***Eupithécie du Tamaris (L')***
Eupithecia unedonata Mabille, 1868 ***Eupithécie de l'Arbousier (L')***
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787) ***Eupithécie veinée (L')***
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) ***Écaille chinée (L')***
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) ***Luisante (La)***
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) ***Cul-brun (Le)***
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) ***Satellite (Le)***
Eurodachtha pallicornella (Staudinger, 1859)
Eurranthis plummistaria (Villers, 1789) ***Fidonie plumeuse (La), Plumet provençal (Le)***
Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schäffer, 1848)
Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813) ***Noctuelle adulatrice (La)***
Euxoa conspicua (Hübner, 1824) ***Agrotide agricole (L')***
Euxoa cos (Hübner, 1824) ***Agrotide pierreuse (L')***
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1760) ***Noir-Atre (Le)***
Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle Obélisque (La)***
Euxoa temera (Hübner, 1808) ***Noctuelle des Champs (La)***
Euzophera osseatella (Treitschke, 1832)
Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1760)
Furcula bifida (Brahm, 1787) ***Petite Queue-Fourchue (La)***
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) ***Feuille-Morte du Chêne (La)***
Gazoryctra ganna (Hübner, 1808) ***Hépiale à litures (L'), Hépiale plaintive (L')***
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) ***Grande Naïade (La), Papillonaire (La)***
Gerinia honoraria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Phalène honorée (La)***
Globia algae (Esper, 1789)
Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
Gnophos furvata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Gnophos ténébreuse (La), Phalène de la Viorne (La)***
Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Drap d'Or (Le), Noctuelle des Artichauts (La)***
Gortyna xanthenes Germar, 1842 ***Noctuelle de l'Artichaut d'Espagne (La)***
Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) ***Noctuelle de la Salsepareille (La)***
Grammodes stolida (Fabricius, 1775) ***Noctuelle de la Corroyère (La)***
Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) ***Runique (La)***
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) ***Fausse-Eupithécie (La)***
Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle capsulaire (La)***
Hadena caesia (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle bleue (La)***
Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle de l'Oeillet (La)***
Hadena luteocincta (Rambur, 1834) ***Hadène occitane (L')***
Hadena magnolii (Boisduval, 1828) ***Dianthécie de Magnol (La)***
Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle carpophage (La)***
Hadena silenes (Hübner, 1822) ***Hadène du Silène (L'), Dianthécie du Silène (La)***
Hadula pugnax (Hübner, 1824) ***Hadène de l'Anarrhine (L')***
Hadula trifolii (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle de l'Ansérine (La)***
Haemerosia renalis (Hübner, 1813) ***Hémérosie rénigère (L')***
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) ***Dragon (Le)***
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle sereine (La)***
Hecatera cappa (Hübner, 1809) ***Hadène des Dauphinelles (L')***
Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle dysodée (La)***
Hecatera weissi (Draudt, 1934) ***Hadène de Draudt (L')***
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) ***Armigère (L')***
Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851 ***Nubigère (La)***
Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle peltigère (La)***
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle de la Cardère (La)***
Hellula undalis (Fabricius, 1781)
Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) ***Noctuelle de l'Iris (La)***
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) ***Sphinx gazé (Le), Sphinx du Chèvrefeuille (Le)***
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) ***Sphinx-Bourdon (Le), Sphinx de la Scabieuse (Le)***
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) ***Hémithée printanière (L')***
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) ***Phalène sillonnée (La)***
Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Herminie grise (L')***
Herminia tarsipennalis Treitschke, 1835 ***Herminie de la Vigne-blanche (L')***
Heterogynis penella (Hübner, 1819) ***Zygène des Genêts (La)***
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) ***Sphinx Phoenix (Le)***
Homaloxestis briantiella (Turati, 1879)
Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Ambiguë (L')***
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle du Pissenlit (La)***
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) ***Noctuelle de la Morgeline (La)***
Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816) ***Caradrine de la Surelle (La), Noctuelle flatteuse (La)***
Horisme aquata (Hübner, 1813) ***Horisme des Pulsatilles (L'), Phalène aqueuse (La)***
Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Horisme élégant (L'), Essuyée (L')***
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Horisme rayé (L')***
Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) ***Sphinx de l'Euphorbe (Le)***
Hyles gallii (Rottemburg, 1775) ***Sphinx de la Garance (Le)***
Hyles hippophaes (Esper, 1789) ***Sphinx de l'Argousier (Le)***
Hyles lineata (Fabricius, 1775)
Hyles livornica (Esper, 1780) ***Sphinx livournien (Le)***
Hyles nicaea (Prunner, 1798) ***Sphinx Nicéa (Le)***
Hypena obesalis Treitschke, 1829 ***Hypène des Lamiers (L'), Hypène grasse (L')***
Hypena obsitalis (Hübner, 1813) ***Hypène des ponts (L')***
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) ***Toupet (Le)***
Hyphoraia testudinaria (Geoffroy in Fourcroy, 1785) ***Ecaille des steppes (L')***
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) ***Boarmie pointillée (La)***
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Boarmie du Chêne (La)***
Hypotia massilialis (Duponchel, 1832)
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Idaea alyssumata (Himmighoffen & Millière in Millière, 1871) ***Acidalie de l'Alysson***
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) ***Impolie (L), l'Acidalie détournée (L')***
Idaea belemiata (Millière, 1868) ***Acidalie de l'Hélianthème***
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ***Acidalie des Callunaies (L')***
Idaea circuitaria (Hübner, 1819) ***Acidalie entourée (L')***
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) ***Acidalie dégénérée (L')***
Idaea dilutaria (Hübner, 1799) ***Acidalie diluée (L')***
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) ***Acidalie écussonnée (L')***
Idaea distinctaria (Boisduval, 1840) ***Acidalie séparée (L')***
Idaea elongaria (Rambur, 1833) ***Acidalie allongée (L')***
Idaea eugeniata (Dardoin & Millière in Millière, 1870) ***Acidalie pointillée (L')***
Idaea exilaria (Guenée, 1858) ***Acidalie grêle (L')***
Idaea filicata (Hübner, 1799) ***Acidalie rustique du Midi (L')***
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) ***Acidalie familière (L')***
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) ***Acidalie roussie (L'), Phalène à côte rousse (La)***
Idaea infirmaria (Rambur, 1833) ***Acidalie chétive (L')***
Idaea inquinata (Scopoli, 1763) ***Acidalie naine (L')***
Idaea laevigata (Scopoli, 1763) ***Acidalie des herboristes (L')***
Idaea libycata (Bartel, 1906) ***Acidalie discrète (L'), Acidalie de Bartel (L')***
Idaea litigiosaria (Boisduval, 1840) ***Acidalie contestée (La)***
Idaea macilentaria (Herrich-Schäffer, 1846) ***Acidalie maigre (L')***
Idaea mancipiata (Staudinger, 1871) ***Acidalie asservie (L')***
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ***Acidalie traversée (L')***
Idaea moniliata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Coquille (La), Acidalie chapelet (L')***
Idaea obsoletaria (Rambur, 1833) ***Acidalie obsolète (L')***
Idaea ochrata (Scopoli, 1763) ***Acidalie ocreuse (L')***
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) ***Acidalie purpurine (L')***
Idaea politaria (Hübner, 1799) ***Acidalie glacée (L') , Acidalie luisante (L')***
Idaea predotaria (Hartig, 1952) ***Acidalie insignifiante***
Idaea rubraria (Staudinger, 1901) ***Acidalie ombrée (L')***
Idaea rufaria (Hübner, 1799) ***Acidalie rousse (L')***
Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Acidalie campagnarde (L'), Acidalie des ibères (L')***
Idaea sardoniata (Homberg, 1912) ***Acidalie roussillonnaise (L')***
Idaea seriata (Schrank, 1802) ***Vieillie (La) , Voisine (La)***
Idaea sericeata (Hübner, 1813) ***Acidalie soyeuse (L')***
Idaea straminata (Borkhausen, 1794) ***Acidalie sobre (L')***
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) ***Acidalie blanchâtre (L')***

Idaea trigeminata (Haworth, 1809) ***Acidalie retournée (L')***
Idaea typicata (Guenée, 1858) ***Acidalie typique (L')***
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Soumise (La)***
Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
Isturgia limbaria (Fabricius, 1775) ***Phalène bordée (La), Entourée (L')***
Isturgia miniosaria (Duponchel, 1829) ***Fidonie de l'Ajonc (La), Fidonie fardée (La)***
Isturgia murinaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Fidonie du Trèfle (La)***
Itame vincularia (Hübner, 1813) ***Fidonie du Nerprun (La)***
Jodia croceago (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Xanthie safranée (La)***
Jordanita globulariae (Hübner, 1793) ***Procris des Centaurées (Le), Turquoise des Globulaires (La)***
Jordanita hispanica (Alberti, 1937) ***Procris atlante (Le), Turquoise espagnole (La)***
Jordanita subsolana (Staudinger, 1862) ***Turquoise de la Cardoncelle (La), Procris des Cistes (Le)***
Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758) ***Louvette (La)***
Lacanobia aliena (Hübner, 1809) ***Noctuelle des Mélilots (La)***
Lacanobia blenna (Hübner, 1824) ***Noctuelle sablonneuse (La)***
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) ***Noctuelle des Potagers (La)***
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle enfumée (La)***
Laelia coenosa (Hübner, 1808) ***Liparis sale (Le)***
Lamoria anella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) ***Sphinx du Peuplier (Le)***
Larentia clavaria (Haworth, 1809) ***Larentie cloutée (La)***
Larentia malvata (Rambur, 1833) ***Larentie des Mauves (La)***
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) ***Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)***
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Petit minime à bande (Le), Bombyx du Trèfle (Le)***
Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809) ***Nonagrie des Marais (La)***
Leucania comma (Linnaeus, 1760) ***Comma blanc (Le)***
Leucania loreyi (Duponchel, 1827) ***Leucanie irisée (La)***
Leucania obsoleta (Hübner, 1803) ***Leucanie obsolète (La)***
Leucania punctosa (Treitschke, 1825) ***Leucanie éclaircie (La)***
Leucania putrescens (Hübner, 1824) ***Leucanie assombrie (La)***
Leucania zeae (Duponchel, 1827) ***Leucanie du Maïs (La)***
Leucochlaena oditis (Hübner, 1822) ***Noctuelle marquetée (La)***
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) ***Bombyx du Saule (Le), Apparent (L')***
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Phalène du Fusain (La)***
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) ***Xyline du Cyprès (La)***
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) ***Xyline du Chêne (La)***
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809) ***Xyline du Frêne (La)***
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) ***Lithosie quadrille (La)***
Lithostege duponcheli Prout, 1938 ***Phalène neigeuse (La)***
Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) ***Phalène neigeuse (La)***
Lithostege griseata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Phalène argentée (La), Phalène grisette (La)***
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Eudémis de la vigne, Ver de la grappe, Tordeuse de la grappe***
Lobesia limoniana (Millière, 1860)
Loryma egregialis (Herrich-Schäffer, 1838)
Lozotaeniodes cupressana (Duponchel, 1836)
Lozotaeniodes formosana (Frölich, 1830)
Luperina dumerilii (Duponchel, 1826) ***Noctuelle de Duméril (La)***
Luperina nickerlii (Freyer, 1845) ***Lupérine de la Fétuque (La)***
Luperina rubella (Duponchel, 1835) ***Lupérine rougeâtre (La)***
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Lupérine testacée (La)***
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) ***Phalène hérissée (La)***
Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Ophiuse des pois à crapauds (L')***
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) ***Ophiuse de l'Astragale (L')***
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) ***Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)***
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) ***Ensanglantée des Renouées (La)***
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) ***Goutte d'Argent (La)***
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) ***Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)***
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) ***Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)***
Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758) ***Livrée des prés (La)***
Malacosoma franconicum (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Franconienne (La)***
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) ***Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le)***
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) ***Brassicaire (La)***
Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Sphinx du Chêne vert (Le)***
Mecyna asinalis (Hübner, 1819)
Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Nole blanchâtre (La)***
Meganola togatulalis (Hübner, 1796) ***Nole togée (La)***
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) ***Boarmie pétrifiée (La)***
Menophra japygiaria (O. Costa, 1849) ***Boarmie de la Rue (La)***
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831) ***Boarmie noctambule (La)***
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) ***Hiéroglyphe (L')***
Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle furoncule (La)***
Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840) ***Anthophile de la Phalangère (L')***
Metachrostis velox (Hübner, 1813) ***Anthophile prompte (L')***
Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
Metacrambus pallidellus (Duponchel, 1836)
Metasia corsicalis (Duponchel, 1833)
Metasia suppandalis (Hübner, 1823)
Metopoceras felicina (Donzel, 1844) ***Cléophane roussâtre (La)***
Microloxia herbaria (Hübner, 1813) ***Smaragdine graminée (La)***
Micropterix aglaella (Duponchel, 1840)
Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851)
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) ***Sphinx du Tilleul (Le)***
Minoa murinata (Scopoli, 1763) ***Souris (La), Phalène de l'Euphorbe (La)***
Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Lunaire (La)***
Mniotype solieri (Boisduval, 1829) ***Xyline provençale (La)***
Moitrelia obductella (Zeller, 1839)
Myelois circumvoluta (Geoffroy, 1785)
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Point blanc (Le)***
Mythimna congrua (Hübner, 1817) ***Leucanie amnicole (La)***
Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Conigère (La)***
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) ***Noctuelle lythargyrée (La)***
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) ***L blanc (Le)***
Mythimna languida (Walker, 1858) ***Leucanie nonchalante (La)***
Mythimna litoralis (Curtis, 1827) ***Leucanie de l'Oyat (La)***
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) ***Leucanie blafarde (La)***
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Leucanie pudorine (La)***
Mythimna riparia (Rambur, 1829) ***Leucanie riveraine (La)***
Mythimna sicula (Treitschke, 1835) ***Leucanie sicilienne (La)***
Mythimna straminea (Treitschke, 1825) ***Leucanie paillée (La)***
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) ***Leucanie orbicole (La)***
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) ***Leucanie vitelline (La)***
Neognopharmia stevenaria (Boisduval, 1840) ***Fidonie à trois taches (La)***
Neomariania partinicensis (Rebel, 1937)
Neurothaumasia tenuipennella Gaedike, 2011
Noctua comes Hübner, 1813 ***Hulotte (La)***
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) ***Frangée (La)***
Noctua interjecta Hübner, 1803 ***Faux Casque (Le)***
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ***Collier soufré (Le)***
Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775 ***Casque (Le)***
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) ***Hibou (Le)***
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ***Frangée méditerranéenne (La)***
Nodaria nodosalis (Herrich-Schäffer, 1851) ***Herminie noueuse (L')***
Nola chlamitulalis (Hübner, 1813) ***Nole de l'Euphraise (La)***
Nola cicatricalis (Treitschke, 1835) ***Cicatrice (La)***
Nola squalida Staudinger, 1871 ***Nole négligée (La)***
Nola subchlamydula Staudinger, 1871 ***Nole des Germandrées (La)***
Nola thymula Millière, 1867 ***Nole du Thym (La)***
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nonagria typhae (Thunberg, 1784) ***Nonagrie de la Massette (La)***
Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Dromadaire (Le)***
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) ***Bois-Veiné (Le)***
Novotinea reinhardella Nel, 2014
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) ***Nyctéole du Saule (La)***
Nycteola columbana (Turner, 1925) ***Nyctéole du Chêne-Liège (La)***
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) ***Sarrothripe de Revay (La)***
Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794) ***Escortée (L'), Phalène dimorphe (La)***
Nyctobrya muralis (Forster, 1771) ***Bryophile du Lichen (La)***
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831) ***Agrotide à ventre blanc (L')***
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1760) ***Cordon blanc (Le)***
Ocneria rubea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Bombyx rubicond (Le), Liparis rosâtre (Le)***
Odice jucunda (Hübner, 1813) ***Anthophile gracieuse (L')***
Odice suava (Hübner, 1813) ***Anthophile charmante (L')***
Odites kollarella (O. G. Costa, 1832)
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) ***Feuille-Morte du Prunier (La)***
Oiketicoides febretta (Boyer de Fonscolombe, 1835)
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Trompeuse (La)***
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) ***Noctuelle du Dactyle (La)***
Omia cymbalariae (Hübner, 1809) ***Omie de l'Hélianthème (L')***
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) ***Cléophane du Muflier (La)***
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Onychora agaritharia (Dardoin, 1842) ***Fidonie tardive (La)***
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) ***Cheimatobie hiémale (La), Phalène brumeuse (La)***
Ophiuche lividalis (Hübner, 1796) ***Hypène livide (L')***
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) ***Citronnelle rouillée (La)***
Orectis massiliensis (Millière, 1864) ***Herminie marseillaise (L')***
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) ***Etoilée (L'), Bombyx antique (Le)***
Orgyia recens (Hübner, 1819) ***Soucieuse (La)***
Orgyia trigotephras Boisduval, 1828 ***Orgyie du Kermès (L')***
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) ***Orthosie du Cerisier (L')***
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Orthosie farineuse (L')***
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) ***Gothique (La)***
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Orthosie gracile (L')***
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) ***Orthosie variable (L')***
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Orthosie rougeoyante (L')***
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
Oxicesta chamoenices (Herrich-Schäffer, 1845) ***Noctuelle cartographe (La)***
Oxybia transversella (Duponchel, 1836)
Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799) ***Callunaire (La), Pachycnémie des Callunes (La)***
Pachycnemia tibiaria (Rambur, 1829) ***Callunaire discrète (La)***
Pachypasa limosa (Serres, 1826)
Paidia rica (Freyer, 1858) ***Ecaille gris-souris (L')***
Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
Pammene agnotana Rebel, 1914
Pammene purpureana (Constant, 1888)
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) ***Noctuelle héliaque (La)***
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle du Pin (La)***
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) ***Herminie dérivée (L')***
Parahypopta caestrum (Hübner, 1808) ***Cossus-touret (Le), Cossus de l'Asperge (Le)***
Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) ***Petite Sésie du Peuplier (La), Sésie asiliforme (La)***
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
Parascotia nisseni Turati, 1905 ***Petite Inégale (La)***
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) ***Xanthie falote (La)***
Pardoxia graellsi (Feisthamel, 1837) ***Xanthode de la Lavathère (La)***
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) ***Boarmie frottée (La), Boarmie sylvatique (La)***
Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Phalène de l'Epine-Vinette (La)***
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) ***Eupithécie rectangulaire (L')***
Paysandisia archon (Burmeister, 1880) ***Bombyx du Palmier (Le)***
Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) ***Lithosie muscerde (La), Lithosie crotte-souris (La)***
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) ***Cidarie accompagnée (La), Phalène de la Patte-d'Oie (La)***
Pennithera firmata (Hübner, 1822) ***Corythée pectinée (La)***
Pennithera ulicata (Rambur, 1834) ***Corythée des garrigues (La)***
Perconia strigillaria (Hübner, 1787) ***Etrille (L'), Phalène des landes (La)***
Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) ***Boarmie de l'Yeuse (La)***
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Boarmie rhomboïdale (La), Boarmie commune (La)***
Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Boarmie des Résineux (La), Boarmie seconde (La)***
Peribatodes umbraria (Hübner, 1809) ***Boarmie ombrée (La)***
Peridea anceps (Goeze, 1781) ***Timide (La)***
Peridroma saucia (Hübner, 1808) ***Noctuelle blessée (La)***
Perigune binaevata (Mabille, 1869) ***Pétrophore bimaculée (La)***
Perigune convergata (Villers, 1789) ***Pétrophore convergente (La)***
Perigune narbonea (Linnaeus, 1767) ***Pétrophore narbonnaise (La)***
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) ***Périzome coupée (La)***
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) ***Périzome soulignée (La)***
Perizoma hydrata (Treitschke, 1829) ***Périzome du Silène penché (La), Périzome terne (La)***
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) ***Phalène de l'Aquiline (La), Pétrophore de la Fougère (La)***
Phajogramma etruscaria (Zeller, 1849) ***Phalène verte des Ombellifères (La)***
Phaiogramma faustinata (Millière, 1868) ***Phalène verte de Millière (La)***
Phalacropterix graminifera (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) ***Bucéphale (La), Lunule (La)***
Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
Pheosia tremula (Clerck, 1759) ***Porcelaine (La)***
Phigaliohybernia aurantiaria (Hübner, 1799) ***Hibernie orangée (L')***
Phigaliohybernia marginaria (Fabricius, 1777) ***Hibernie hâtive (L')***
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) ***Méticuleuse (La)***
Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) ***Zeuzère du Roseau (La)***
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) ***Ecaille cramoisie (L')***
Phtheochroa duponchelana (Duponchel, 1842)
Phtheochroa purana (Guenée, 1845)
Phtheochroa purpuratella (Geoffroy, 1785)
Phtheochroa rugosana (Hübner, 1799)
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
Phyllodesma ilicifolium (Linnaeus, 1758) ***Feuille-Morte de l'Yeuse (La)***
Phyllodesma tremulifolium (Hübner, 1810) ***Petite Feuille-Morte (La), Feuille-Morte du Tremble (La)***

Phyllophila obliterata (Rambur, 1833) ***Anthophile de l'Armoise (L'), Phyllophile (La)***
Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758) ***Hépatique (L'), Hépiale de la Fougère (L'), Patte-en-Masse (La)***
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) ***Noctuelle couleur de bronze (La)***
Pima boisduvaliella (Guenée, 1845)
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
Pleurota honorella (Hübner, 1813)
Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
Plusia festucae (Linnaeus, 1758) ***Plusie de la Fétuque (La)***
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) ***Bombyx du Peuplier (Le)***
Polia serratilinea Ochsenheimer, 1816 ***Noctuelle dentiligne (La), Polie des Pulsatilles (La)***
Polymixis argillaceago (Hübner, 1822) ***Xyline argillacée (La)***
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ***Xyline floue (La)***
Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Ceinture jaune (La)***
Polymixis lichenea (Hübner, 1813) ***Noctuelle couleur de lichen (La)***
Polymixis rufocincta (Geyer, 1828) ***Ceinture rousse (La)***
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ***Ceinture noire (La)***
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) ***Noctuelle du Camérisier (La)***
Polypogon plumigeralis (Hübner, 1825) ***Herminie de la Garance (L')***
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) ***Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oénothère (Le)***
Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noble (La)***
Proxenus hospes (Freyer, 1831) ***Hydrille domestique (L')***
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) ***Halias du Hêtre (La)***
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) ***Panthère (La)***
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
Pseudosyria soroiella (Zeller, 1839)
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) ***Hémithée de l'Ajonc (L')***
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) ***Hémithée du Genêt (L')***
Psyche casta (Pallas, 1767)
Psyche crassiorella Bruand, 1851
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) ***Museau (Le)***
Ptilocephala agrostidis (Schrank, 1802)
Ptilocephala albida (Esper, 1786)
Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810)
Ptilocephala silphella (Millière, 1871)
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
Pyrausta virginalis Duponchel, 1832
Pyropteron chrysidiforme (Esper, 1782) ***Sésie de l'Oseille (La)***
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) ***Chrysographe (La)***
Raphia hybris (Hübner, 1813) ***Raphie du Peuplier (La)***
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ***Récophore de Cantener (La)***
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) ***Noctuelle du Roseau (La)***
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) ***Phalène sacrée (La)***
Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) ***Phalène calabraise (La)***
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) ***Bande rouge (La)***
Rhoptria asperaria (Hübner, 1817) ***Fidonie du Ciste (La)***
Rhyacionia maritimana Pröse, 1981
Rhyacionia pinivorana (Zeller in Lienig & Zeller, 1846)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) ***Soyeuse (La)***

Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) ***Petit Paon de Nuit (Le)***
Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) ***Paon de nuit austral (Le)***
Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Grand Paon de nuit***
Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Sciota rhenella (Zincken, 1818)
Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) ***Découpure (La)***
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
Scoparia subfusca Haworth, 1811
Scopula asellaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Scopula caricaria (Reutti, 1853) ***Acidalie neigeuse (L')***
Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Acidalie décorée (L'), Cendrée (La)***
Scopula emutaria (Hübner, 1809) ***Acidalie des sables (L')***
Scopula imitaria (Hübner, 1799) ***Acidalie fausse-Timandre (L')***
Scopula incanata (Linnaeus, 1758) ***Acidalie grisonnante (L')***
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) ***Frange picotée (La), Acidalie picotée (L')***
Scopula minorata (Boisduval, 1833) ***Acidalie minime (L')***
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) ***Acidalie étrille (L')***
Scopula ornata (Scopoli, 1763) ***Acidalie ornée (L')***
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) ***Phalène rougeâtre (La), Acidalie rougie (L')***
Scopula submutata (Treitschke, 1828) ***Acidalie embrouillée (L')***
Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847) ***Acidalie virginale (L'), l'Acidalie ponctuée (L')***
Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Orthotite biponctuée (L')***
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) ***Phalène de l'Ansérine (La), Chénopodie (La)***
Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Orthotite rétrécie (L')***
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) ***Orthotite plombée (L')***
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ***Orthotite entourée (L'), Korrigan (Le)***
Scythris scopolella (Linnaeus, 1767)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775) ***Ennomos illunaire (L')***
Selenia lunularia (Hübner, 1788) ***Ennomos lunaire (L') , Croissant (Le)***
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) ***Ennomos illustre (L')***
Selidosema brunnearia (Villers, 1789) ***Boarmie brune (La)***
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ***Boarmie à bandes (La), Boarmie des steppes (La)***
Sesamia cretica Lederer, 1857 ***Nonagrie crétoise (La)***
Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827) ***Nonagrie bétique (La)***
Sesia apiformis (Clerck, 1759) ***Sésie apiforme (La), Sésie du Peuplier (La)***
Setina irrorella (Linnaeus, 1758) ***Endrosie diaphane (L'), Callimorphe arrosée (La)***
Shargacucullia caninae (Rambur, 1833) ***Cucullie de la Rue-des-Chiens (La)***
Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833) ***Cucullie de la Molène-Lychnis (La), Brèchette (La)***
Shargacucullia scrophulariphila (Staudinger, 1859) ***Cucullie basque (La)***
Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) ***Brèche (La)***
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775) ***Noctuelle du Cucubale (La)***
Simyra albovenosa (Goeze, 1781) ***Noctuelle veineuse (La)***
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) ***Sphinx demi-paon***
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 ***Sphinx du Troène (Le)***
Sphinx maurorum (Jordan, 1931) ***Sphinx mauresque***
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766) ***Ecaille Lièvre (L')***
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) ***Ecaille tigrée (L')***
Spilosoma urticae (Esper, 1789) ***Ecaille de l'Ortie (L')***
Spiris striata (Linnaeus, 1758) ***Ecaille striée (L')***

Spodoptera cilium Guenée, 1852 ***Spodoptère canarienne (La)***
Spodoptera exigua (Hübner, 1808) ***Noctuelle exiguë (La)***
Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833) ***Spodoptère littorale (La)***
Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
Stegania trimaculata (Villers, 1789) ***Stéganie du peuplier (La)***
Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829)
Stemmatophora combustalis (Fischer von Röslerstamm, 1842)
Stilbia anomala (Haworth, 1812) ***Stilbie des Etangs (La)***
Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)
Stygia australis Latreille, 1803 ***Stygie australe (La)***
Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783) ***Sésie fourmi (La)***
Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) ***Sésie du Pommier (La)***
Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790) ***Sésie du Néflier***
Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) ***Sésie du Groseillier (La)***
Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1760) ***Sésie vespiforme***
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
Syncopacma captivella (Herrich-Schäffer, 1854)
Synopsia sociaria (Hübner, 1799) ***Boarmie compagne (La)***
Synthymia fixa (Fabricius, 1787) ***Noctuelle du Dartrier (La)***
Tephronia oranaria Staudinger, 1892 ***Gymnospile du Thym (La)***
Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767) ***Gymnospile commune (La), Gymnospile crème (La)***
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) ***Octogésime (L')***
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) ***Phalène du Buplèvre (La), la Phalène du Thym (La)***
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) ***Noctuelle cythérée (La)***
Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Processionnaire du Pin (La)***
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) ***Processionnaire du Chêne (La)***
Thera britannica (Turner, 1925) ***Corythée anglaise***
Thera cupressata (Geyer, 1831) ***Corythée du Cyprès (La)***
Thera juniperata (Linnaeus, 1758) ***Corythée du Genévrier (La)***
Theria rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Phalène chamoisée (La)***
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) ***Emeraude (L')***
Thiodia lerneana (Treitschke, 1835)
Tholera decimalis (Poda, 1761) ***Nasse (La)***
Thyris fenestrella (Scopoli, 1763) ***Pygmée (Le), Sphinx-Pygmée (Le)***
Thysanoplusia daubei (Boisduval, 1840) ***Plusie de la Carotte (La)***
Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775) ***Plusie aurifère (La)***
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758) ***Xanthie citronnée (La)***
Timandra comae Schmidt, 1931 ***Timandre aimée (La)***
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) ***Noctuelle de l'Arroche (La)***
Trichiura castiliana Spuler, 1908 ***Castillane (La)***
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) ***Bombyx de l'Aubépine (Le)***
Trichoplusia ni (Hübner, 1803) ***Ni (Le), Plusie ni (La)***
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ***Noctuelle embrasée (La)***
Triodia sylvina (Linnaeus, 1760) ***Sylvine (La)***
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) ***Incertaine (L'), Dent-de-Scie (La), Douteuse (La)***
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) ***Goutte-de-sang , Carmin (Le)***
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Noctuelle en deuil (La)***
Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
Udea fulvalis (Hübner, 1809)
Udea numeralis (Hübner, 1796)
Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
Ulochlaena hirta (Hübner, 1813) ***Noctuelle pluviophile (La)***
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) ***Gentille (La), Ecaille du Myosotis (L')***
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) ***Hameçon (Le), Binaire (Le)***
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) ***Hameçon méridional (Le)***

Watsonarctia deserta (Bartel, 1902) ***Ecaille chaste (L'), Ecaille saumon (L')***
Xanthia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Xanthie cendrée (La)***
Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766) ***Xanthie cirée (La)***
Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792) ***Xanthie paillée (La)***
Xanthia ruticilla (Esper, 1791)
Xanthocrambus delicatellus (Zeller, 1863)
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) ***Incertaine (L'), Phalène ondée (La)***
Xanthorhoe oxybiata (Millière, 1872) ***Corémie de Millière (La)***
Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759) ***Phalène quadrifasciée (La)***
Xenochlorodes olympiaria (Herrich-Schäffer, 1852) ***Smaragdine des Philaires (La)***
Xestia agathina (Duponchel, 1827) ***Noctuelle agathine (La)***
Xestia castanea (Esper, 1798) ***Noctuelle négligée (La)***
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) ***C-noir (Le)***
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Trimaculée (La)***
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) ***Bois-sec (Le)***
Xylena vetusta (Hübner, 1813) ***Antique (L')***
Xylocampa areola (Esper, 1789) ***Noctuelle areolée (La)***
Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850) ***Herminie brune (L')***
Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer, 1839) ***Noctuelle de l'Asperge (La)***
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1760) ***Zeuzère du Marronnier (La), Coquette (La), Zeuzère du Poirier (La)***
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) ***Zygène du Sainfoin (La),Zygène de la Carniole (La)***
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) ***Zygène de la Coronille variée (La), Zygène de la Coronille (La)***
Zygaena erythrus (Hübner, 1806) ***Zygène des garrigues (La), Zygène rubiconde (La), Zygène écarlate (La)***
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ***Zygène de la Petite coronille (La)***
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) ***Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)***
Zygaena hilaris Ochsenheimer, 1808
Zygaena lavandulae (Esper, 1783) ***Zygène de la Badasse (La), Zygène de la Lavande (La)***
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) ***Zygène des bois (La), Zygène du Trèfle-de-montagne (La)***
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-Cheval (La), Zygène de la Faucille (La), Zygène de l'Hippocrepis (La)***
Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Zygène diaphane (La), Zygène des Boucages (La)***
Zygaena nevadensis Rambur, 1858 ***Zygène ibère (La), Zygène des Gesses (La), Zygène andalouse (La)***
Zygaena occitanica (Villers, 1789) ***Zygène d'Occitanie (La), Zygène occitane (La), Zygène de la Badasse (La)***
Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) ***Zygène pourpre (La), Zygène du Serpolet (La)***
Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ***Zygène de l'Esparcette (La), Zygène de la Dorycnie (La), Zygène cendrée (La)***
Zygaena romeo Duponchel, 1835 ***Zygène de la Gesse (La), Zygène des Vesces (La)***
Zygaena sarpedon (Hübner, 1790) ***Zygène du Panicaut (La)***
Zygaena transalpina (Esper, 1780) ***Zygène transalpine (La)***
Zygaena trifolii (Esper, 1783) ***Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)***

MAMMIFÈRES

Ammotragus lervia (Pallas, 1777) ***Mouflon à manchettes***
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) ***Mulot à collier***
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) ***Mulot sylvestre***
Arvicola sapidus Miller, 1908 ***Campagnol amphibie***
Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) ***Ecureuil à ventre rouge***
Canis lupus Linnaeus, 1758 ***Loup gris***
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) ***Chevreuil européen***
Castor fiber Linnaeus, 1758 ***Castor d'Europe***

Cervus elaphus Linnaeus, 1758 ***Cerf élaphe***
Cervus nippon Temminck, 1838 ***Cerf sika***
Chionomys nivalis (Martins, 1842) ***Campagnole des neiges***
Crocidura russula (Hermann, 1780) ***Musaraigne musette***
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) ***Musaraigne des jardins***
Dama dama Linnaeus, 1758 ***Daim européen***
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) ***Lérot commun***
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 ***Hérisson commun***
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) ***Genette commune***
Glis glis (Linnaeus, 1766) ***Loir gris***
Lepus europaeus Pallas, 1778 ***Lièvre d'Europe***
Lepus granatensis Rosenhauer, 1856 ***Lièvre ibérique***
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) ***Loutre d'Europe***
Martes foina (Erxleben, 1777) ***Fouine d'Europe***
Martes martes (Linnaeus, 1758) ***Martre d'Europe***
Meles meles (Linnaeus, 1758) ***Blaireau européen***
Micromys minutus (Pallas, 1771) ***Rat des moissons***
Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) ***Campagnol agreste***
Microtus duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps, 1839) ***Campagnol provençal***
Mus musculus Linnaeus, 1758 ***Souris grise***
Mus spretus Lataste, 1883 ***Souris d'Afrique Nord***
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) ***Muscardin***
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 ***Belette d'Europe***
Mustela putorius Linnaeus, 1758 ***Putois d'Europe***
Myocastor coypus (Molina, 1782) ***Ragondin***
Neomys anomalus Cabrera, 1907 ***Crossope de Miller***
Neomys fodiens (Pennant, 1771) ***Crossope aquatique***
Neovison vison (Schreber, 1777) ***Vison d'Amérique***
Procyon lotor (Linneaus, 1758) ***Raton laveur***
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) ***Rat musqué***
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) ***Lapin de Garenne***
Ovis gmelinii Blyth, 1841 ***Mouflon méditerranéen***
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) ***Surmulot***
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) ***Rat noir***
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) ***Chamoix des Alpes***
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 ***Ecureuil roux***
Suncus etruscus (Savi, 1822) ***Pachyure étrusque***
Sus scrofa Linnaeus, 1758 ***Sanglier d'Europe***
Talpa europaea Linnaeus, 1758 ***Taupe d'Europe***
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) ***Renard roux***

MOLLUSQUES

Abida polyodon (Draparnaud, 1801) ***Maillot requin***
Abida secale (Draparnaud, 1801) ***Maillot seigle***
Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774) ***Escargotin hérisson***
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) ***Patelline d'Europe***
Aegopinella pura (Alder, 1830) ***Petite luisantine***
Ambigolimax valentianus (A. Férussac, 1822) ***Limace d'Espagne***
Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 ***Patelline des fleuves***
Anisus leucostoma (Millet, 1813) ***Planorbe des fossés***
Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) ***Planorbe de Linné***
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) ***Anodonte des étangs***
Arion hortensis Férussac, 1819 ***Loche noire***
Arion intermedius Normand, 1852 ***Loche hérisson***
Arion rufus (Linnaeus, 1758) ***Grande loche***
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) ***Loche roussâtre***
Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855
Auriculinella bidentata (Montagu, 1808) ***Ellobie blanche***
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) ***Planorbe ombiliquée***
Belgrandia gibba (Draparnaud, 1805) ***Petite belgrandie***
Belgrandia marginata (Michaud, 1831) ***Belgrandie à varices***
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) ***Bithynie commune***
Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) ***Bythiospée rhénane***
Candidula gigaxii (L. Pfeiffer, 1847) ***Hélicette chagrinée***
Candidula rugosiuscula (Michaud, 1831) ***Hélicette grise***
Candidula unifasciata (Poiret, 1801) ***Hélicette du thym***
Cantareus apertus (Born, 1778) ***Hélice édule***
Caracollina lenticula (Férussac, 1821) ***Hélice caracol***
Carychium minimum O.F. Müller, 1774 ***Auriculette naine***
Carychium tridentatum (Risso, 1826) ***Auriculette commune***
Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774) ***Aiguillette commune***
Cecilioides janii (De Betta & Martinati, 1855) ***Aiguillette ventrue***
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) ***Escargot des haies***
Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) ***Caragouille élargie***
Cernuella virgata (da Costa, 1778) ***Caragouille globuleuse***
Charpentieria itala (G. von Martens, 1824)
Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) ***Maillot avoine***
Chondrula tridens (O.F. Müller, 1774) ***Bulime trois-dents***
Ciliella ciliata (W. Hartmann, 1821) ***Veloutée ciliée***
Clausilia bidentata (Strøm, 1765) ***Clausilie commune***
Clausilia rugosa (Draparnaud, 1801) ***Clausilie ridée***
Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774) ***Cornet étroit***
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758) ***Cornet méditerranéen***
Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801) ***Cornet des dunes***
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) ***Brillante commune***
Cochlodina laminata (Montagu, 1803) ***Fuseau commun***
Cochlostoma patulum (Draparnaud, 1801) ***Cochlostome méridional***
Cochlostoma septemspirale (Razoumowsky, 1789) ***Cochlostome commun***
Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) ***Corbicule asiatique***
Corneola squammatina (Moquin-Tandon, 1855) ***Hélicon méridional***
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) ***Escargot petit-gris***
Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) ***Loche blanche***
Deroceras chevallieri van Regteren Altena, 1973 ***Loche provençale***
Deroceras invadens Reise, Hutchinson, Schunack & Schlitt, 2011
Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) ***Loche des marais***
Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) ***Loche laiteuse***
Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774) ***Bouton commun***
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) ***Moule zébrée***
Drusia valenciennii (Webb & Van Beneden, 1836)
Ecrobia ventrosa (Montagu, 1803) ***Hydrobie atlantique***
Ecrobia vitrea (Risso, 1826) ***Hydrobie méditerranéenne***
Emmericia patula (Brumati, 1838) ***Mercurie trompette***
Eobania vermiculata (O.F. Müller, 1774) ***Escargot mourguéta***
Euconulus fulvus (O.F. Müller, 1774) ***Conule des bois***
Euconulus trochiformis (Montagu, 1803) ***Conule mat***
Euglesa casertana (Poli, 1791) ***Pisidie robuste***
Ferussacia folliculum (Schröter, 1784) ***Brillante méditerranéenne***
Fissuria boui Boeters, 1981 ***Planhydrobie de la Durance***
Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) ***Limnée épaulée***
Granaria stabilei (E. von Martens, 1865) ***Maillot montagnard***
Granaria variabilis (Draparnaud, 1801) ***Maillot variable***
Granopupa granum (Draparnaud, 1801) ***Maillot grain***
Gyraulus acronicus (Férussac, 1807) ***Planorbine corne-de-bélier***
Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) ***Planorbine à crêtes***
Gyraulus laevis (Alder, 1838) ***Planorbine lisse***
Helicella bolenensis (Locard, 1882) ***Hélicelle de Bollène***
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) ***Soucoupe commune***
Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774) ***Veloutée plane***
Helix melanostoma Draparnaud, 1801 ***Hélice tapada***
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) ***Planorbine des fontaines***
Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) ***Hydrobie méridionale***
Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) ***Hélice carénée***
Hypnophila boissii (Dupuy, 1851) ***Brillante fragile***
Jaminia quadridens (O.F. Müller, 1774) ***Bulime inverse***
Lauria cylindracea (da Costa, 1778) ***Maillot commun***
Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774) ***Limace des bois***
Limacus flavus (Linnaeus, 1758) ***Limace des caves***
Limax cinereoniger Wolf, 1803 ***Grande limace***
Limax maximus Linnaeus, 1758 ***Limace léopard***
Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889)
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) ***Grande limnée***
Macrogastra attenuata lineolata (Held, 1836) ***Massue orientale***
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) ***Massue costulée***
Marmorana serpentina (A. Férussac, 1821) ***Marbrée serpentine***
Mediterranea hydatina (Rossmässler, 1838) ***Luisant méridional***
Melanoides tuberculata (O.F. Müller, 1774) ***Mélanie tropicale***
Menetus dilatatus (A.A. Gould, 1841) ***Planorbine américaine***
Mercuria similis (Draparnaud, 1805) ***Mercurie de Draparnaud***
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774) ***Bulime boueux***
Meyrargueria rasini (Girardi, 2004) ***Bythiospée bulle***
Meyrargueria rasini (Girardi, 2004) ***Bythiospée bulle***
Microxeromagna lowei (Potiez & Michaud, 1835) ***Hélicette à poils courts***
Milax gagates (Draparnaud, 1801) ***Pseudolimace jayet***
Milax nigricans (Philippi, 1836) ***Pseudolimace de Méditerranée***
Moitessieria locardi Coutagne, 1883 ***Petite moitessierie***
Monacha cantiana (Montagu, 1803) ***Moine globuleux***
Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) ***Petit moine***
Monacha cemenelea (Risso, 1826) ***Grand moine, Thèbe de Cimiez***
Morlina glabra (Rossmässler, 1835) ***Luisant étroit***
Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) ***Grande ellobie***
Oligolimax annularis (S. Studer, 1820) ***Semilimace globuleuse***
Oxychilus alliarius (J.S. Miller, 1822) ***Luisant aillé***
Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774) ***Luisant des caves***
Oxychilus draparnaudi (H. Beck, 1837) ***Grand luisant***
Oxyloma elegans (Risso, 1826) ***Ambrette élégante***
Pagodulina austeniana (G. Nevill, 1880) ***Maillot sud-alpin***
Palacanthilhiopsis vervierii Bernasconi, 1988 ***Hydrobie de l'Ardèche***
Paludinella sicana (Brugnone, 1876) ***Sentinelle méridionale***
Papillifera solida (Draparnaud, 1805) ***Perlée des murailles***
Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852) ***Escargotin cosmopolite***
Peregriana labiata (Rossmässler, 1835)
Phenacolimax major (A. Férussac, 1807) ***Semilimace des plaines***
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) ***Physe bulle, Physe des fontaines***
Physella acuta (Draparnaud, 1805) ***Physe voyageuse***
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) ***Planorbe des étangs***
Planorbis carinatus O.F. Müller, 1774 ***Planorbe carénée***
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) ***Planorbe commune***
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774) ***Élégante striée***
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) ***Hydrobie des antipodes***
Pseudamnicola moussonii (Calcara, 1841) ***Mercurie méditerranéenne***
Pseudotachea splendida (Draparnaud, 1801) ***Hélice splendide***
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) ***Escargotin minuscule***
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) ***Maillot des mousses***
Pupilla triplicata (S. Studer, 1820) ***Maillot pygmée***
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) ***Pyramidule commun***
Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1801) ***Pyramidule des rochers***
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) ***Limnée conque***
Radix balthica (Linnaeus, 1758) ***Limnée commune***
Retinella olivetorum (Gmelin, 1791)
Rumina decollata (Linnaeus, 1758) ***Bulime tronqué***
Solatopupa similis (Bruguière, 1792) ***Maillot cendré***
Sphincterochila candidissima (Draparnaud, 1801) ***Caragouille solide***
Spiralix puteana (Coutagne, 1883) ***Moitessierie d'Avignon***
Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774) ***Limnée des étangs***
Succinea putris (Linnaeus, 1758) ***Ambrette amphibie***
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) ***Ambrette terrestre***
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 ***Testacelle commune***
Theba pisana pisana (O.F. Müller, 1774) ***Caragouille rosée***
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) ***Nérite des rivières***
Trochoidea elegans (Gmelin, 1791) ***Troque élégante***
Trochoidea pyramidata (Draparnaud, 1805) ***Troque pyramidale***
Trochoidea trochoides (Poiret, 1789) ***Troque des dunes***
Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) ***Veloutée commune***
Trochulus sericeus (Draparnaud, 1801) ***Veloutée déprimée***
Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) ***Truncatelle de l'estran***
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) ***Maillotin denté***
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) ***Maillotin mousseron***
Tudorella sulcata (Draparnaud, 1801) ***Élégante des calanques***
Unio crassus Philipsson, 1788 ***Mulette épaisse***
Urticicola glabellus (Draparnaud, 1801) ***Fausse-veloutée des vallées***
Urticicola moutonii (Dupuy, 1848) ***Fausse-veloutée de la Riviera***
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) ***Vallonie costulée***
Vallonia enniensis (Gredler, 1856) ***Vallonie des marais***
Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774) ***Vallonie trompette***
Vertigo angustior Jeffreys, 1830 ***Vertigo étroit***
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) ***Vertigo des marais***
Vertigo pusilla O.F. Müller, 1774 ***Vertigo inverse***
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) ***Vertigo commun***
Vitrea contracta (Westerlund, 1871) ***Cristalline ombiliquée***
Vitrea crystallina (O.F. Müller, 1774) ***Cristalline commune***
Vitrea narbonensis (Clessin, 1877) ***Cristalline de Narbonne***
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) ***Cristalline méridionale***
Viviparus contectus (Millet, 1813) ***Paludine commune***
Xerocrassa geyeri (Soós, 1926) ***Hélicette des steppes***
Xeropicta derbentina (Krynicki, 1836) ***Hélicelle des Balkans***
Xerosecta cespitum (Draparnaud, 1801) ***Grande caragouille***
Xerosecta introducta (A. Villa & G.B. Villa, 1841) ***Caragouille ligure***
Xerotricha apicina (Lamarck, 1822) ***Hélicette ponctuée***
Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801) ***Hélicette veloutée***
Zebrina detrita (O.F. Müller, 1774) ***Bulime zébré***
Zonites algirus (Linnaeus, 1758) ***Escargot peson***
Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774) ***Luisantine des marais***

NÉVROPTÈRES

Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)
Creoleon lugdunensis (Villers, 1789)
Deleproctophylla dusmeti Navás, 1914
Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) ***Fourmillion longicorne***
Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Gymnocnemia variegata (Schneider, 1845)
Italochrysa italica (Rossi, 1790)
Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Ascalaphe soufré***
Libelloides ictericus (Charpentier, 1825)
Libelloides lacteus (Brullé, 1832)
Libelloides longicornis (Linnaeus, 1764) ***Ascalaphe ambré***
Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807)
Mantispa aphavexelte U. Aspöck & H. Aspöck, 1994
Mantispa styriaca (Poda, 1761)
Megalomus tortricoides Rambur, 1842

Megistopus flavicornis (Rossi, 1790)
Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767
Neuroleon arenarius (Navás, 1904)
Neuroleon distichus (Navás, 1903)
Neuroleon egenus (Navás, 1915)
Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 1791)
Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836)
Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764)

ODONATES

Aesh affinis Vander Linden, 1820 *Aeschne affine*
Aesh cyanea (O.F. Müller, 1764) *Aeschne bleue*
Aesh isoceles (O.F. Müller, 1767) *Aeschne isocèle*
Aesh mixta Latreille, 1805 *Aeschne mixte*
Hemiax ephippiger (Burmeister, 1839) *Ax porte-selle*
Ax imperator Leach, 1815 *Ax empereur*
Ax parthenope (Selys, 1839) *Ax politain*
Boyeria irene (Boyer de Fonscolombe, 1838) *Aeschne paisible*
Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) *Aeschne printanière*
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) *Caloptéryx hémorroïdal*
Calopteryx splendens (Harris, 1780) *Caloptéryx éclatant*
Calopteryx virgo (Lineus, 1758) *Caloptéryx vierge*
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) *Caloptéryx occitan*
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) *Agrion délicat*
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) *Leste vert*
EN Coegrion caerulescens (Boyer de Fonscolombe, 1838) *Agrion bleuissant*
Coegrion mercuriale (Charpentier, 1840) *Agrion de Mercure*
Coegrion puella (Lineus, 1758) *Agrion jouvencelle*
Coegrion pulchellum (Vander Linden, 1825) *Agrion joli*
Coegrion scitulum (Rambur, 1842) *Agrion mignon*
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) *Cordulégastre annelé*
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) *Crocothémis écarlate*
Ellagma cyathigerum (Charpentier, 1840) *Agrion porte-coupe*
Erythromma lindenii (Selys, 1840) *Agrion de Van der Linden*
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) *iade au corps vert*
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) *Gomphe à pattes jaunes*
Gomphus graslinii Rambur, 1842 *Gomphe de Graslin*
Gomphus pulchellus Selys, 1840 *Gomphe joli*
Gomphus simillimus Selys, 1840 *Gomphe semblable*
Gomphus vulgatissimus (Lineus, 1758) *Gomphe vulgaire*
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) *Agrion élégant*
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) *Agrion in*
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) *Leste sauvage*
EN Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) *Leste à grands ptérostigmas*
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) *Leste fiancé*
Lestes virens (Charpentier, 1825) *Leste verdoyant*
Libellula depressa Lineus, 1758 *Libellule déprimée*
Libellula fulva O.F. Müller, 1764 *Libellule fauve*
Libellula quadrimaculata Lineus, 1758 *Libellule quadrimaculée*
Onychogomphus forcipatus (Lineus, 1758) *Gomphe à pinces*
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) *Gomphe à crochets*
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) *Orthétrum à stylets blancs*
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837) *Orthétrum brun*
Orthetrum cancellatum (Lineus, 1758) *Orthétrum réticulé*
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) *Orthétrum bleuissa*
Oxygastra curtisii (Dale, 1834) *Cordulie à corps fin*
Platycnemis acutipennis Selys, 1841 *Agrion orangé*
Platycnemis latipes Rambur, 1842 *Agrion blanchâtre*
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) *Agrion à larges pattes*
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) *Petite nymphe au corps de feu*

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) *Leste brun*
EN Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) *Sympétrum déprimé*
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) *Sympétrum de Fonscolombe*
Sympetrum meridiole (Selys, 1841) *Sympétrum méridiol*
Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766) *Sympétrum du Piémont*
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) *Sympétrum rouge sang*
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) *Sympétrum strié*
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) *Trithémis annelé*

OISEAUX

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) *Cassenoix moucheté, Casse-noix*
Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) *Sizerin flammé*
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) *Autour des palombes*
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) *Épervier d'Europe*
Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) *Rousserolle isabelle*
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) *Rousserolle turdoïde*
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) *Lusciniole à moustaches*
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) *Phragmite aquatique*
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) *Rousserolle verderolle*
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) *Phragmite des joncs*
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) *Rousserolle effarvatte*
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) *Chevalier guignette*
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) *Mésange à longue queue, Orite à longue queue*
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) *Vautour moine*
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 *Alouette des champs*
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) *Martin-pêcheur d'Europe*
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) *Perdrix rouge*
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766) *Ouette d'Égypte, Oie d'Égypte*
Anas acuta Linnaeus, 1758 *Canard pilet*
Anas crecca Linnaeus, 1758 *Sarcelle d'hiver*
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 *Canard colvert*
Anser albifrons (Scopoli, 1769) *Oie rieuse*
Anser anser (Linnaeus, 1758) *Oie cendrée*
Anser fabalis (Latham, 1787) *Oie des moissons*
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) *Pipit rousseline*
Anthus cervinus (Pallas, 1811) *Pipit à gorge rousse*
Anthus godlewskii (Taczanowski, 1876) *Pipit de Godlewski*
Anthus hodgsoni Richmond, 1907 *Pipit à dos olive*
Anthus petrosus (Montagu, 1798) *Pipit maritime*
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) *Pipit farlouse*
Anthus richardi Vieillot, 1818 *Pipit de Richard*
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) *Pipit spioncelle*
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) *Pipit des arbs*
Apus apus (Linnaeus, 1758) *Martinet noir*
Apus pallidus (Shelley, 1870) *Martinet pâle*
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) *Aigle royal*
EN Aquila fasciata Vieillot, 1822 *Aigle de Bonelli*
Aquila heliaca Savigny, 1809 *Aigle impérial*
Ardea alba Linnaeus, 1758 *Grande Aigtte*
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 *Héron cendré*
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 *Héron pourpré*
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) *Héron crabier, Crabier chevelu*
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) *Tournepier à collier*
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) *Hibou des marais*
Asio otus (Linnaeus, 1758) *Hibou moyen-duc*
Athene noctua (Scopoli, 1769) *Chouette chevêche, Chevêche d'Athé*
Agapornis fischeri Reichenow, 1887 *Inséparable de Fischer*
Agapornis personatus Reichenow, 1887 *Inséparable masqué*
Agapornis roseicollis Vieillot, 1818 *Inséparable rougegorge*

Aix galericulata (Linnaeus, 1758) *Canard mandarin*
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) *Astrild ondulé*
Aix sponsa (Linnaeus, 1758) *Canard carolin*
Aythya collaris (Donovan, 1809) *Fuligule à bec cerclé, Fuligule à collier*
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) *Fuligule milouin*
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) *Fuligule morillon*
Aythya marila (Linnaeus, 1760) *Fuligule milouin*
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) *Fuligule nyroca*
Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) *Bartramie des champs, Bartramie à longue queue, Maubèche des champs*
Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) *Jaseur boréal, Jaseur de Bohème*
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) *Butor étoilé*
Branta bernicla (Linnaeus, 1758) *Berche crava*
Branta canadensis (Linnaeus, 1758) *Berche du Cada*
Branta leucopsis (Bechstein, 1803) *Berche nonnette*
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) *Grand-duc d'Europe*
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) *Héron garde-boeufs*
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) *Garrot à oeil d'or*
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) *Oedicnème criard*
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) *Buse variable*
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) *Buse pattue*
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) *Buse féroce*
Butorides virescens (Linnaeus, 1758) *Héron vert*
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) *Alouette calandlle*
Calidris alba (Pallas, 1764) *Bécasseau sanderling*
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) *Bécasseau variable*
Calidris canutus (Linnaeus, 1758) *Bécasseau maubèche*
Calidris falcinellus (Pontoppidan, 1763) *Bécasseau fainelle*
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) *Bécasseau cocorli*
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) *Bécasseau de Boparte, Bécasseau à croupion blanc*
Calidris maritima (Brünnich, 1764) *Bécasseau violet*
Calidris melanotos (Vieillot, 1819) *Bécasseau tacheté, Bécasseau à poitrine cendrée*
Calidris minuta (Leisler, 1812) *Bécasseau minute*
Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) *Chevalier combatta, Combatta varié*
Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) *Bécasseau rousset, Bécasseau roussat*
Calidris temminckii (Leisler, 1812) *Bécasseau de Temminck*
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) *Puffin de Scopoli*
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 *Engoulevent d'Europe*
Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820 *Engoulevent à collier roux*
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) *Linotte mélodieuse*
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) *Chardonnet éléga*
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) *Verdier d'Europe*
Carduelis citrinella (Pallas, 1764) *Veuron moagrd*
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) *Tarin des aulnes*
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) *Roselin cramoisi*
Cecropis daurica (Laxmann, 1769) *Hirondelle rousseline*
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 *Grimpeau des jardins*
Cettia cetti (Temminck, 1820) *Bouscarle de Cetti*
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 *Gravelot à collier ierrompu, Gravelot de Ke*
Charadrius dubius Scopoli, 1786 *Petit Gravelot*
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 *Grand Gravelot*
Chersophilus duponti (Vieillot, 1820) *Sirli de Dupo*
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) *Guifette moustac*
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) *Guifette leucoptè*
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) *Guifette noi*
EN Chroicocephalus genei (Brême, 1839) *Goéland railleur*
Chroicocephalus philadelphia (Ord, 1815) *Mouette de Boparte*
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) *Mouette rieuse*
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) *Cigogne blanche*

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) *Cigogne noi*
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) *Cincle plongeur*
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) *Circaète Jean-le-Blanc*
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) *Busard des roseaux*
Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) *Busard Sai-Martin*
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771) *Busard pâle*
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) *Busard cendré*
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) *Cisticole des joncs*
Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) *Coucou geai*
Clanga clanga (Pallas, 1811) *Aigle criard*
Clanga pomarina (C. L. Brehm, 1831) *Aigle pomarin*
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) *Halde de Miquelon, Halde boréale*
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) *Grosbec casse-noyaux*
EN Columba livia Gmelin, 1789 *Pigeon biset*
Columba oenas Linnaeus, 1758 *Pigeon colombin*
Columba palumbus Linnaeus, 1758 *Pigeon ramier*
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 *Rollier d'Europe*
Corvus corax Linnaeus, 1758 *Grand corbeau*
Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 *Corneille maelée*
Corvus corone Linnaeus, 1758 *Corneille noi*
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 *Corbeau fux*
Corvus monedula Linnaeus, 1758 *Choucas des tours*
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) *Caille des blés*
EN Crex crex (Linnaeus, 1758) *Râle des genêts*
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 *Coucou gris*
Cursorius cursor (Latham, 1787) *Courvite isabelle*
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) *Mésange bleue*
Cygnus atratus (Latham, 1790) *Cygne noir*
Cygnus columbianus (Ord, 1815) *Cygne de Bewick*
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) *Cygne chaeur*
Cygnus olor (Gmelin, 1803) *Cygne tuberculé*
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) *Hirondelle de fenêt*
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) *Pic épeiche*
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) *Pic épeichette*
Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) *Dendrocygne veuf*
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) *Pic noir*
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) *Aigtte garzette*
Egretta gularis (Bosc, 1792) *Aigtte des récifs*
Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) *Élanion blanc*
Emberiza bruniceps Brandt, 1841 *Bruaant à tête rousse*
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 *Bruant proyer*
Emberiza cia Linnaeus, 1766 *Bruaant fou*
Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 *Bruant zizi*
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 *Bruant jaune*
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 *Bruant ortolan*
Emberiza leucocephalos S. G. Gmelin, 1771 *Bruant à calotte blanche*
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 *Bruant mélanocéphale*
Emberiza pusilla Pallas, 1776 *Bruant nain*
Emberiza rustica Pallas, 1776 *Bruant rustique*
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) *Bruant des roseaux*
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) *Rougegorge familier*
Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) *Pluvier guigrd*
Euodice malabarica (Linnaeus, 1758) *Capucin bec-de-plomb*
Falco biarmicus Temminck, 1825 *Faucon lanier*
Falco cherrug Gray, 1834 *Faucon sacre*
Falco columbarius Linnaeus, 1758 *Faucon émerillon*
Falco eleonorae Géné, 1839 *Faucon d'Éléono*
Falco naumanni Fleischer, 1818 *Faucon crécellette*
Falco peregrinus Tunstall, 1771 *Faucon pèlerin*
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 *Faucon hobeau*

- Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 ***Faucon crécelle***
- Falco vespertinus Linnaeus, 1766 ***Faucon kobez***
- Ficedula albicollis (Temminck, 1815) ***Gobemouche à collier***
- Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) ***Gobemouche noir***
- Ficedula parva (Bechstein, 1794) ***Gobemouche in, Gobemouche rougeât***
- Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 ***Pinson des arbs***
- Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 ***Pinson du nord, Pinson des Ardennes***
- Fulica atra Linnaeus, 1758 ***Foulque macroule***
- Fulica cristata Gmelin, 1789 ***Foulque à crête, Foulque caronculée***
- Galerida cristata (Linnaeus, 1758) ***Cochevis huppé***
- Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) ***Bécassine des marais***
- Gallinago media (Latham, 1787) ***Bécassine double***
- Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) ***Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau***
- Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) ***Geai des chênes***
- Gavia arctica (Linnaeus, 1758) ***Plongeon arctique***
- Gavia immer (Brünnich, 1764) ***Plongeon imbrin***
- Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) ***Plongeon catmarin***
- Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) ***Sterne hansel***
- Glareola nordmanni Fischer, 1842 ***Glaréole à ailes nois***
- EN Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) ***Glaréole à collier***
- Grus grus (Linnaeus, 1758) ***Grue cendrée***
- Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) ***Gypaète barbu***
- Gyps fulvus (Hablizl, 1783) ***Vautour fauve***
- Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 ***Huîtrier pie***
- Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) ***Pygargue à queue blanche***
- Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) ***Aigle botté***
- Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) ***Echasse blanche***
- Hippolais icterina (Vieillot, 1817) ***Hypolaïs ictérine, Grand cofaisa***
- Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) ***Hypolaïs polyglotte, Petit cofaisa***
- Hirundo rustica Linnaeus, 1758 ***Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée***
- Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) ***Mouette pygmée***
- Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) ***Sterne caspienne***
- Ichthyaetus audouinii (Payraudeau, 1826) ***Goéland d'Audouin***
- Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) ***Mouette mélanocéphale***
- Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) ***Butor blongios, Blongios in***
- Jynx torquilla Linnaeus, 1758 ***Torcol fourmilier***
- Lanius collurio Linnaeus, 1758 ***Pie-grièche écorcheur***
- Lanius excubitor Linnaeus, 1758 ***Pie-grièche grise***
- Lanius meridionalis Temminck, 1820 ***Pie-grièche méridiole***
- Lanius minor Gmelin, 1788 ***Pie-grièche à poitrine rose***
- Lanius senator Linnaeus, 1758 ***Pie-grièche à tête rousse***
- Larus argentatus Pontoppidan, 1763 ***Goéland argeé***
- Larus cachinnans Pallas, 1811 ***Goéland poique***
- Larus canus Linnaeus, 1758 ***Goéland cendré***
- Larus delawarensis Ord, 1815 ***Goéland à bec cerclé***
- Larus fuscus Linnaeus, 1758 ***Goéland brun***
- Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 ***Goéland bourgmest***
- Larus marinus Linnaeus, 1758 ***Goéland marin***
- Larus michahellis Naumann, 1840 ***Goéland leucophée***
- Leucophaeus pipixcan (Wagler, 1831) ***Mouette de Franklin***
- Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) ***Barge rousse***
- Limosa limosa (Linnaeus, 1758) ***Barge à queue noi***
- Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) ***Locustelle fluviatile***
- EN Locustella luscinioides (Savi, 1824) ***Locustelle luscinioïde***
- Locustella naevia (Boddaert, 1783) ***Locustelle tachetée***
- Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) ***Mésange huppée***
- Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 ***Bec-croisé des sapins***
- Lullula arborea (Linnaeus, 1758) ***Alouette lulu***
- Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 ***Rossignol philomèle***
- Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) ***Gorgebleue à miroir***
- Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) ***Bécassine sourde***
- Mareca penelope (Linnaeus, 1758) ***Canard siffleur***
- Mareca strepera (Linnaeus, 1758) ***Canard chipeau***
- Marmaronetta angustirostris (Ménétries, 1832) ***Sarcelle marbrée***
- Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) ***Macuse brune***
- Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) ***Macuse noi***
- EN Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) ***Alouette calend***
- Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) ***Harle piette***
- Mergus merganser Linnaeus, 1758 ***Harle bièv***
- Mergus serrator Linnaeus, 1758 ***Harle huppé***
- Merops apiaster Linnaeus, 1758 ***Guêpier d'Europe***
- Milvus migrans (Boddaert, 1783) ***Milan noir***
- Milvus milvus (Linnaeus, 1758) ***Milan royal***
- Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) ***Moicole de roche, Merle de roche***
- Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) ***Moicole bleu, Merle bleu***
- Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) ***Niverolle alpine, Niverolle des Alpes***
- Motacilla alba Linnaeus, 1758 ***Bergeronnette grise***
- Motacilla cinerea Tunstall, 1771 ***Bergeronnette des ruisseaux***
- Motacilla citreola Pallas, 1776 ***Bergeronnette citrine***
- Motacilla flava Linnaeus, 1758 ***Bergeronnette prianiè***
- Muscicapa striata (Pallas, 1764) ***Gobemouche gris***
- Myiopsitta monacha (Boddaert, 1783) ***Conu veuve***
- EN Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) ***Vautour percnoptè***
- Netta rufina (Pallas, 1773) ***Nette rousse***
- Numenius arquata (Linnaeus, 1758) ***Courlis cendré***
- Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) ***Courlis corlieu***
- Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) ***Héron bihoau, Bihoau gris***
- Oenanthe deserti (Temminck, 1825) ***Traquet du désert***
- EN Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) ***Traquet oillard***
- Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) ***Traquet motteux***
- Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) ***Loriot d'Europe, Loriot jaune***
- Otis tarda Linnaeus, 1758 ***Grande Outarde, Outarde barbue***
- Otus scops (Linnaeus, 1758) ***Hibou petit-duc, Petit-duc scops***
- Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) ***Érismatu rousse***
- Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) ***Balbuzard pêcheur***
- Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) ***Panu à moustaches, Mésange à moustaches***
- Parus major Linnaeus, 1758 ***Mésange charbonniè***
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758) ***Moineau domestique***
- Passer italiae (Vieillot, 1817) ***Moineau cisalpin***
- Passer montanus (Linnaeus, 1758) ***Moineau friquet***
- Pastor roseus (Linnaeus, 1758) ***Martin roselin, Étourneau roselin***
- Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 ***Pélican blanc***
- Periparus ater (Linnaeus, 1758) ***Mésange noi***
- Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) ***Bondrée apivo***
- Petronia petronia (Linnaeus, 1766) ***Moineau souie***
- Phalacrocorax aristotelis ***Cormoran huppé de Méditerranée, Cormoran de Desmast***
- Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) ***Grand Cormoran***
- Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) ***Phalarope à bec large***
- Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) ***Phalarope à bec étroit***
- Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 ***Faisan de Cohide***
- Phoeniconaias minor (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1798) ***Flama in, Petit flama***
- Phoenicopterus chilensis Molina, 1782 ***Flama du Chili***
- EN Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 ***Flama rose***
- Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758 ***Flama des Caraïbes***
- Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) ***Rougequeue noir***
- Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) ***Rougequeue à fro blanc***
- Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) ***Pouillot de Bonelli***
- Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) ***Pouillot véloce***
- Phylloscopus humei (Brooks, 1878) ***Pouillot de Hume***
- Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) ***Pouillot à grands sourcils***
- Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811) ***Pouillot de Pallas, Pouillot roitelet***
- Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) ***Pouillot siffleur***
- Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) ***Pouillot verdât***
- Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) ***Pouillot fitis***
- Pica pica (Linnaeus, 1758) ***Pie bavarde***
- Picus viridis Linnaeus, 1758 ***Pic vert, Pivert***
- Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 ***Spatule blanche***
- Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) ***Brua des neiges***
- Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) ***Ibis fainelle***
- Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) ***Pluvier doré***
- Pluvialis fulva (Gmelin, 1789) ***Pluvier fauve***
- Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) ***Pluvier argeé***
- Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) ***Grèbe esclavon***
- Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) ***Grèbe huppé***
- Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) ***Grèbe jougris***
- Podiceps nigricollis Brehm, 1831 ***Grèbe à cou noir***
- Poecile palustris (Linnaeus, 1758) ***Mésange nonnette***
- EN Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) ***Poule sultane, Talève sultane, Porphyrion bleu***
- Porzana porzana (Linnaeus, 1766) ***Marouette ponctuée***
- Prunella collaris (Scopoli, 1769) ***Acceeur alpin***
- Prunella modularis (Linnaeus, 1758) ***Acceeur mouchet***
- Psittacula krameri (Scopoli, 1769) ***Perruche à collier***
- Pterocles alchata (Linnaeus, 1758) ***Ganga cata***
- Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) ***Hirondelle de rochers***
- Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) ***Chocard à bec jaune***
- Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) ***Crave à bec rouge***
- Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) ***Bouvuil pivoine***
- Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 ***Râle d'eau***
- Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 ***Avocette élégae***
- Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) ***Roitelet à triple bandeau***
- Regulus regulus (Linnaeus, 1758) ***Roitelet huppé***
- EN Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) ***Rémiz penduline, Mésange rémiz***
- Riparia riparia (Linnaeus, 1758) ***Hirondelle de rivage***
- Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) ***Mouette tridactyle***
- Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) ***Traquet tarier, Tarier des prés***
- Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) ***Tarier pât***
- Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 ***Bécasse des bois***
- Serinus serinus (Linnaeus, 1766) ***Serin cini***
- Sitta europaea Linnaeus, 1758 ***Sittelle torchepot***
- Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) ***Eider à duvet***
- Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) ***Canard souchet***
- Spatula discors (Linnaeus, 1766) ***Sarcelle à ailes bleues***
- Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) ***Sarcelle d'été***
- Steganopus tricolor Vieillot, 1819 ***Phalarope de Wilson***
- Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 ***Labbe à longue queue***
- Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) ***Labbe parasite***
- Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) ***Labbe pomarin***
- Stercorarius skua (Brünnich, 1764) ***Grand Labbe***
- Sterna hirundo Linnaeus, 1758 ***Sterne piergarin***
- Sternula albifrons (Pallas, 1764) ***Sterne ine***
- Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) ***Tourtelle turque***
- Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) ***Tourtelle des bois***
- Strix aluco Linnaeus, 1758 ***Chouette hulotte***
- Sturnus unicolor Temminck, 1820 ***Étourneau unicolo***
- Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 ***Étourneau sansonnet***
- Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) ***Fauvette à tête noire***
- Sylvia borin (Boddaert, 1783) ***Fauvette des jardins***
- Sylvia cantillans (Pallas, 1764) ***Fauvette passerinette***
- Sylvia communis Latham, 1787 ***Fauvette grisette***
- Sylvia conspicillata Temminck, 1820 ***Fauvette à lunettes***
- Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) ***Fauvette babillarde***
- Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) ***Fauvette orphée***
- Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) ***Fauvette mélanocéphale***
- Sylvia sarda Temminck, 1820 ***Fauvette sarde***
- Sylvia subalpina Temminck, 1820 ***Fauvette de Moltoni***
- Sylvia undata (Boddaert, 1783) ***Fauvette pitchou***
- Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) ***Grèbe castagneux***
- Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) ***Martinet à ve blanc, Martinet alpin***
- Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) ***Tadorne casarca, Casarca roux***
- Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) ***Tadorne de Belon***
- Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) ***Outarde canepetiè***
- Thalasseus bengalensis (Lesson, 1831) ***Sterne voyageuse***
- Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) ***Sterne caugek***
- Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) ***Ibis sacré***
- Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) ***Tichodrome échelette***
- Tringa erythropus (Pallas, 1764) ***Chevalier arlequin***
- Tringa flavipes (Gmelin, 1789) ***Petit Chevalier à pattes jaunes, Chevalier à pattes jaunes***
- Tringa glareola Linnaeus, 1758 ***Chevalier sylvain***
- Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) ***Chevalier aboyeur***
- Tringa ochropus Linnaeus, 1758 ***Chevalier culblanc***
- Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) ***Chevalier stagtile***
- Tringa totanus (Linnaeus, 1758) ***Chevalier gambette***
- Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) ***Troglodyte mignon***
- Turdus iliacus Linnaeus, 1766 ***Grive mauvis***
- Turdus merula Linnaeus, 1758 ***Merle noir***
- Turdus naumanni Temminck, 1820 ***Grive à ailes rousses***
- Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 ***Grive musicienne***
- Turdus pilaris Linnaeus, 1758 ***Grive litorne***
- Turdus torquatus Linnaeus, 1758 ***Merle à plastron***
- Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 ***Grive draine***
- Tyto alba (Scopoli, 1769) ***Chouette effraie, Effraie des clochers***
- Upupa epops Linnaeus, 1758 ***Huppe fasciée***
- Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) ***Vanneau huppé***
- Xema sabini (Sabine, 1819) ***Mouette de Sabine***
- Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) ***Bargette du Ték, Chevalier bargette***
- Zapornia parva (Scopoli, 1769) ***Marouette poussin***
- Zapornia pusilla (Pallas, 1776) ***Marouette de Baillon***
- Zoothera aurea (Holandre, 1825) ***Grive dorée***

ORTHOPTÈRES

Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) ***Grillon domestique***
Acrida ungarica (Herbst, 1786) ***Truxale méditerranéenne***
Acrotylus fischeri Azam, 1901 ***OEdipode framboisine***
Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) ***OEdipode grenadine***
Aiolopus puissanti Defaut, 2005 ***Aïolope de Kenitra***
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) ***OEdipode automnale***
Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) ***Criquet égyptien***
Antaxius pedestris (Fabricius, 1787) ***Antaxie marbrée***
Arachnocephalus vestitus Costa, 1855 ***Grillon des Cistes***
Arcyptera kheili Azam, 1900 ***Arcyptère provençale***
Barbitistes fischeri (Yersin, 1854) ***Barbitiste languedocien***
Calephorus compressicornis (Latreille, 1804) ***Criquet des dunes***
Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836) ***Caloptène ochracé***
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) ***Caloptène italien***
Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896) ***Caloptène occitan***

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) ***Criquet marginé***
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) ***Criquet mélodieux***
Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) ***Criquet des ajoncs***
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) ***Criquet duettiste***
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) ***Criquet verte-échine***
Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) ***Criquet des jachères***
Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) ***Criquet des Pins***
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) ***Conocéphale des Roseaux***
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) ***Conocéphale bigarré***
Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) ***Méconème scutigère***
Decticus albifrons (Fabricius, 1775) ***Dectique à front blanc***
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) ***Dectique verrucivore***
Dociostaurus genei (Ocskay, 1832) ***Criquet des chaumes***
Dociostaurus jagoi Soltani, 1978 ***Criquet des chaumes***
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) ***Criquet marocain***
Ephippiger diurnus Dufour, 1841 ***Ephippigère des vignes***
Ephippiger provincialis (Yersin, 1854) ***Ephippigère provençale***
Euchorthippus chopardi Descamps, 1968 ***Criquet du Bragalou***
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) ***Criquet des Bromes***
Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 ***Criquet glauque***
Eugryllodes pipiens (Dufour, 1820) ***Grillon testacé***
Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) ***Grillon bordelais***
Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) ***Decticelle splendide***
Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832) ***Grillon des bastides***
Gryllomorpha uclensis Pantel, 1890 ***Grillon des jas***
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) ***Courtilière commune***
Gryllotalpa septemdecimchromosomica Ortiz, 1958 ***Courtilière provençale***
Gryllotalpa vineae Bennet-Clark, 1970 ***Courtilière des vignes***
Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 ***Grillon provençal***
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 ***Grillon champêtre***
Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838) ***Barbitiste des Pyrénées***
Isophya rectipennis Brunner von Wattenwyl, 1878
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) ***Leptophye ponctuée***
Locusta cinerascens (Fabricius, 1781) ***Criquet cendré***
Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) ***Criquet des Roseaux***
Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) ***Grillon noirâtre***
Mogoplistes brunneus Audinet-Serville, 1838 ***Grillon écailleux***
Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) ***Fourmigril commun***
Myrmecophilus aequispina Chopard, 1923 ***Fourmigril cévenol***
Myrmecophilus gallicus (Stalling, 2017)
Myrmecophilus fuscus Stalling, 2013 ***Fourmigril brun***
Myrmecophilus myrmecophilus (Savi, 1819) ***Fourmigril provençal,***
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) ***Grillon des bois***
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) ***Grillon d'Italie***
Oedaleus decorus (Germar, 1825) ***Oedipode soufrée***
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) ***OEdipode turquoise***
Oedipoda charpentieri Fieber, 1853 ***OEdipode occitane***
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) ***OEdipode rouge***
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) ***Criquet des friches***
Omocestus raymondi (Yersin, 1863) ***Criquet des garrigues***
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) ***Criquet noir-ébène***
Paracinema tricolor (Thunberg, 1815) ***Criquet tricolore***
Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) ***Tétrix méridional***
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) ***Criquet pansu***
Phaneroptera nana Fieber, 1853 ***Phanéroptère méridional***
Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) ***Decticelle des friches***
Platycleis affinis Fieber, 1853 ***Decticelle côtière***
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) ***Decticelle grisâtre***
Platycleis falx (Fabricius, 1775) ***Decticelle à serpe***
Platycleis intermedia (Audinet-Serville, 1838) ***Decticelle iermédiaire***
Platycleis sabulosa Azam, 1901 ***Decticelle des sables***
Prionotropis azami Uvarov, 1923 ***Criquet hérisson***
Prionotropis rhodanica Uvarov, 1923 ***Criquet rhodanien***
Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) ***Criquet des pâtures***
Pseudomogoplistes squamiger (Fischer, 1853) ***Grillon maritime***
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) ***Grillon des marais***
Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) ***Criquet printanier***
Ramburiella hispanica (Rambur, 1838) ***Criquet des Ibères***
Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987 ***Decticelle varoise***
Roeseliana azami (Finot, 1892) ***Decticelle des ruisseaux***
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) ***Conocéphale gracieux***
Saga pedo (Pallas, 1771) ***Magicienne dentelée***
Sepiana sepium (Yersin, 1854) ***Decticelle échassière***
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) ***Oedipode aigue-marine***
Stenobothrus festivus Bolívar, 1887 ***Sténobothre occitan***
Stenobothrus grammicus Cazurro y Ruiz, 1888 ***Gomphocère fauve-queue***
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) ***Decticelle carroyée***
Tetrix bolivari Saulcy in Azam, 1901 ***Tétrix caucasien***
Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887) ***Tétrix des vasières***
Tetrix depressa Brisout de Barneville, 1848 ***Tétrix déprimé***
Tetrix gavoyi (Saulcy, 1901) ***Tétrix de Gavoy***
Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) ***Tétrix des sablières***
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) ***Grande Sauterelle verte***
Trigonidium cicindeloides Rambur, 1838 ***Grillon des jonchères***
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) ***Phanéroptère liliacé***
Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838) ***Ephippigère carénée***
Xya variegata Latreille, 1809 ***Tridactyle panaché***
Yersinella raymondii (Yersin, 1860) ***Decticelle frêle***

POISSONS (EAU DOUCE)

Abramis brama (Linnaeus, 1758) ***Brème commune***
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) ***Spirlin***
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) ***Ablette***
Alosa fallax rhodanensis Roule, 1924
Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) ***Poisson-chat***
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) ***Anguille d?Europe, Anguille européenne***
Atherina boyeri Risso, 1810 ***Joël, Athérine***
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) ***Loche franche***
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) ***Barbeau fluviatile***
Barbus meridionalis Risso, 1827 ***Barbeau truité, Barbeau méridional***
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) ***Brème bordelière***
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) ***Carassin doré, Poisson rouge***
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) ***Carassin commun***
Carassius gibelio (Bloch, 1782) ***Carassin argenté***
Chelon labrosus (Risso, 1827) ***Mulet lippu***
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) ***Nase commun, Hotu, Alonge, Aucon, Chiffe, Fera, Muge, Mulet, Nase, Nez, Seuffre, Tunar, Ame noire, Ecrivain***
Cobitis bilineata Canestrini, 1865 ***Loche italienne***
Cottus gobio Linnaeus, 1758 ***Chabot, Chabot commun***
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) ***Amour blanc (L'), Carpe amour, Carpe herbivore, Chinoise***
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ***Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille***
Esox lucius Linnaeus, 1758 ***Brochet***
Gambusia holbrooki Girard, 1859 ***Gambusie***
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 ***Épinoche à trois épines, Arselet, Cardonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées***
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) ***Goujon***
Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) ***Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil***
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) ***Gardon rouge, Ide mélanote***
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) ***Vandoise***
Liza aurata (Risso, 1810) ***Mulet doré***
Liza ramada (Risso, 1827) ***Mulet porc***
Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) ***Achigan à grande bouche, Black-bass à grande bouche, Perche d'Amérique, Perche noire, Perche truite, Perche truitée***
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 ***Mulet à grosse tête, Muge, Mulet cabot***
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) ***Truite arc-en-ciel***
Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) ***Toxostome, Sofie, Soiffe***
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 ***Perche***
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 ***Lamproie marine***
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) ***Vairon***
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) ***Flet d'Europe***
Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838) ***Gobie tacheté***
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) ***Pseudorasbora***
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) ***Bouvière***
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) ***Gardon***
Salaria fluviatilis (Asso, 1801) ***Blennie fluviatile***
Salmo trutta Linnaeus, 1758 ***Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe***
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) ***Sandre, Perche-brochet***
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) ***Rotengle***
Silurus glanis Linnaeus, 1758 ***Silure glane***
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) ***Chevaine***
Telestes souffia (Risso, 1827) ***Blageon***
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) ***Tanche***
Zingel asper (Linnaeus, 1758) ***Apron du Rhône***

REPTILES

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) ***Cistude d'Europe***
Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) ***Emyde lépreuse***
Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) ***Trachémide écrite***
Testudo hermanni Gmelin, 1789 ***Tortue d'Herman***
Chalcides striatus (Cuvier, 1829) ***Seps strié***
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 ***Orvet fragile***
Anguis veronensis Pollini, 1818 ***Orvet de Vérone***
Psammodromus edwarsianus (An. Dugès, 1829) ***Psammodrome d'Edwards***
Lacerta bilineata Daudin, 1802 ***Lézard à deux raies***
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) ***Lézard des murailles***
Podarcis siculus (Rafinesque Schmaltz, 1810) ***Lézard sicilien***
Timon lepidus (Daudin, 1802) ***Lézard ocellé***
Euleptes europaea (Gené, 1839) ***Eulepte d'Europe***
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) ***Hémidactyle verruqueux***
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) ***Tarente de maurétanie***
Coronella girondica (Daudin, 1803) ***Coronelle girondine***
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) ***Couleuvre de Montpellier***
Natrix helvetica (Lacepède, 1789) ***Couleuvre helvétique***
Natrix maura (Linnaeus, 1758) ***Couleuvre vipérine***
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) ***Vipère aspic***
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) ***Couleuvre d'esculape***
Zamenis scalaris (Schinz, 1822) ***Couleuvre à échelons***

RHOPALOCÈRES

Aglais io (Linnaeus, 1758) ***Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')***
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) ***Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Rerd (Le)***
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) ***Aurore (L')***
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 ***Aurore de Provence (L')***
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Petit Mars changea (Le), Petit Mars (Le), Miroita (Le)***
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) ***Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)***
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Mercure (Le), Petit Agreste (Le)***
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Cardil (Le), Pandora (Le), cré turquoise (Le)***
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) ***Tabac d'Espagne (Le), cré vert (Le), Barre argéée (La), Empereur (L')***
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')***
Boloria dia (Linnaeus, 1767) ***Petite Violette (La), cré violet (Le)***
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) ***Grand collier argeé (Le), cré sagitté (Le)***
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) ***cré de la Ronce (Le), cré lilacé (Le), cré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)***
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) ***cré de la Filipendule (Le), Agavé (L')***
Brintesia circe (Fabricius, 1775) ***Silène (Le), Circé (Le)***
Cacyreus marshalli Butler, 1898 ***Brun du pélargonium (Le), Argus des Pélargoniums (L')***
Callophrys avis Chapman, 1909 ***Thécla de l'Arbousier (La)***
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) ***Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')***
Carcharodus alceae (Esper, 1780) ***Hespérie de l'Aée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')***
Carcharodus baeticus (Rambur, 1839) ***Hespérie de la Ballote (L')***
Carcharodus floccifer (Zeller, 1847) ***Hespérie du Marrube (L'), Hespérie de la Bétoine (L'), Hespérie du Marrube (L'), Hesperie de la Guimauve (L'), Lisette (La), Hesperie de la Mauve (L'), Spilothyre (Le)***
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) ***Hespérie de l'Épiaire (L'), Hespérie de la Lavatère (L'), Marbré (Le)***
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) ***Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')***
Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) ***Nymphale de l'Arbousier (La), Jason (Le), Pacha à deux queues (Le), Jasius (Le)***
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) ***Hermite (L'), Ermite (L')***
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760) ***Céphale (Le), Arcanie (L')***
Coenonympha dorus (Esper, 1782) ***Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le)***
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) ***Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)***
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 ***Fluoré (Le)***
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) ***Souci (Le)***
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) ***Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L')***
Cupido argiades (Pallas, 1771) ***Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le)***
Cupido minimus (Fuessly, 1775) ***Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène ine (La), Pygmée (Le), Azuré mûrcian (L')***
Cupido osiris (Meigen, 1829) ***Azuré de la Chevrette (L'), Azuré osiris (L'), Petit Argus (Le)***
Cyanjris semiargus (Rottemburg, 1775) ***Azuré des Ahyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')***
Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) ***Petit Morque (Le)***
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) ***Monarque (Le)***
Erebia epistygne (Hübner, 1819) ***Moiré provençal (Le), Moiré de Provence (Le)***
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) ***Poi de Hongrie (Le), Grisette (La)***
Euchloe crameri Butler, 1869 ***Piéride des Biscutelles (La)***
Eumedonia eumedon (Esper, 1780) ***Argus de le Sanguiire (L'), Eumédon (L'), Argus noir (L'), Argus capucin (L')***
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) ***Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier prianier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)***
Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) ***Moyen cré (Le), Grand cré (Le)***
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) ***Chiffre (Le)***
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) ***Azuré des Cytises (L')***
Glaucopsyche iolas (Ochsenheimer, 1816) ***Azuré du Bagueudier (L'), Argus du Bagueudier (L'), Argus géa (L')***
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) ***Azuré de la Badasse (L')***
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) ***Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride Cléopâtre (La)***
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) ***Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)***

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) *Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)*

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) *Virgule (La), Comma (Le)*

Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775) *Petit Sylvandre (Le)*

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) *Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène (Le), Grand Sylvandre (Le)*

Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) *Chevron blanc (Le), Faune (Le), Ocellé pindique (L')*

Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908) *Sylvandre helvète (Le)*

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) *Agreste (L')*

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) *Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le)*

Hyponephele lupina (O. Costa, 1836) *Louvet (Le)*

Iberochloe tagis (Hübner, 1804) *Marbré de Lusitanie (Le)*

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) *Flambé (Le)*

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) *Petit cré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)*

Laeosopis roboris (Esper, 1793) *Thécla du Frêne*

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) *Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Porte-Queue bleu strié (Le), Lycène du Baguenaudier (Le), Strié (Le)*

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) *Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le)*

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) *Mégère (La), Satyre (Le)*

Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871) *Piéride du Sainfoin (La), Piéride de Duponchel (La)*

Leptidea reali Reissinger, 1990 *Piéride de Réal (La)*

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) *Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)*

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) *Azuré de la Luzerne (L'), Azuré de Lang (L'), Argus courte-queue (L'), Petit Argus porte-queue (Le)*

Libythea celtis (Laicharting, 1782) *Échancré (L'), Libythée du Micocoulier (La), Échancrée (L'), Libithée (La)*

Limenitis reducta Staudinger, 1901 *Sylvain azuré (Le), Camille (Le)*

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) *Cuivré mauvin (Le), Cuivré flamboya (Le), Argus pourpre (L')*

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) *Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)*

Lycaena tityrus (Poda, 1761) *Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xahé (Le)*

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) *Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')*

Lysandra coridon (Poda, 1761) *Argus bleu-cré (L')*

Lysandra hispana (Herrich-Schäffer, 1852) *Bleu-cré d'Espagne (Le)*

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)*

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')*

Melanargia occitanica (Esper, 1793) *Échiquier d'Occitanie (L'), Demi-Deuil occitan (Le)*

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) *Mélitée du Plaain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plaain (Le), Damier poillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)*

Melitaea deione (Geyer, 1832) *Mélitée des Liires (La)*

Melitaea didyma (Esper, 1778) *Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La)*

Melitaea nevadensis Oberthür, 1904 *Mélitée de Fruhstorfer (La)*

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 *Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)*

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) *Mélitée des Ceaurées (La), Grand Damier (Le)*

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) *Morio (Le), Maeau royal (Le), Velours (Le), Maeau-de-deuil (Le)*

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) *Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Rerd (Le), Doré (Le)*

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)*

Papilio machaon Linnaeus, 1758 *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)*

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')*

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) *Semi-Apollon (Le)*

Phengaris arion (Linnaeus, 1758) *Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')*

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) *Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)*

Pieris mannii (Mayer, 1851) *Piéride de l'Ibéride (La), Piéride jumelle (La)*

Pieris napi (Linnaeus, 1758) *Piéride du vet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)*

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)*

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) *Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')*

Plebejus idas (Linnaeus, 1760) *Azuré du Genêt (L'), Argus sagitté (L'), Bleu-violet (Le), Idas (L')*

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) *Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Deelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)*

Polygonia egea (Cramer, 1775) *Vanesse des Pariétaires (La), Vanesse à L blanc (La), Gamma égéen (Le), L-blanche (Le), Vanesse à L blanche (La)*

Polyommatus amandus (Schneider, 1792) *Azuré de la Jarosse (L'), Argus ligné (L')*

Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) *Azuré de l'Orobe (L'), Azuré festonné (L'), Argus bleu pâle (L'), Argus bleu découpé (L'), Daphnis (Le), Argus céleste (L'), Méléagre (Le)*

Polyommatus dolus (Hübner, 1823) *Sablé de la Luzerne (Le), Argus bleu clair (L')*

Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) *Azuré du Mélilot (L'), Argus turquoise (L'), Azuré (L')*

Polyommatus escheri (Hübner, 1823) *Azuré de l'Adraga (L'), Azuré du Plaain (L'), Azuré d'Escher (L'), Argus bleu ciel (L')*

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')*

Polyommatus thersites (Cantener, 1835) *Azuré de L'Esparcette (L'), Azuré de Chapman (L'), Argus bleu roi (L')*

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) *Marbré-de-vert (Le), Piéride du Réséda (La), Marbré (Le), Piéride marbrée (La), Piéride du Radis (La)*

Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) *Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), Argus poillé (L')*

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) *Hespérie des Poteilles (L'), Armoricain (L')*

Pyrgus carthami (Hübner, 1813) *Hespérie du Carthame (L'), Bigarré (Le), Grande Hespéride (La), Plain-Cha (Le)*

Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) *Hespérie des Cirses (L'), Hespérie de Rambur (L')*

Pyrgus foulquieri (Oberthür, 1910) *Hespérie des Héliahèmes (L'), Hespérie de Foulquier (L')*

Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) *Tacheté austral (Le), Hespérie de l'Aigremoine (L'), Hespérie de la Mauve du Sud (L')*

Pyrgus onopordi (Rambur, 1839) *Hespérie de la Malope (L'), Vergeté (Le)*

Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) *Hespérie de l'Ahémille (L'), Hespérie de l'Armoise (L'), Olivâtre (L')*

Pyrgus sidae (Esper, 1784) *Hespérie du Sida (L'), Hespérie de l'Abutilon (L'), Chamarre (Le), Hespérie à bandes jaunes (L')*

Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) *Ocellé rubané (Le), Tityre (Le), Titire (Le)*

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) *Ocellé de le Canche (Le), Ida (L')*

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)*

Quercusia quercus (Linnaeus, 1758) *Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le)*

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) *Thécla de l'Amarel (La), Thécla de l'Acacia (La)*

Satyrium esculi (Hübner, 1804) *Thécla du Kermès (La), Thécla du Marronnier (La)*

Satyrium ilicis (Esper, 1779) *Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le)*

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) *Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prunellier (La), Thécla de l'Aubépine (La), Porte-Queue brun à tâches bleues (Le), Porte-Queue gris-brun (Le)*

Satyrium w-album (Knoch, 1782) *Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La), W blanc (Le), Thécle W-album (La), Thécla W-Blanc (La), Porte-Queue brun à une ligne blanche (Le)*

Satyrus actaea (Esper, 1781) *Petite Coronide (La), Actéon (L'), Coronis (Le), Actée (L')*

Scolitantides orion (Pallas, 1771) *Azuré des Orpins (L'), Polyommate de l'Orpin (Le), Argus tigré (L'), Argus brun (L')*

Sloperia proto (Ochsenheimer, 1808) *Hespérie de l'Herbe-au-ve (L')*

Spevería aglaja (Linnaeus, 1758) *Grand cré (Le), Aglaé (L'), Moyen-cré (Le)*

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) *Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tachetée (Le)*

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) *Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)*

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) *Hespérie du Chiende (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')*

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Cada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')*

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) *Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)*

Tomares ballus (Fabricius, 1787) *Faux-Cuivré smaragdin (Le), Ballous (Le)*

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) *Vuain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vuain (La), Chiffre (Le), Atalae (L')*

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) *Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)*

Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) *Diane (La), Thaïs (La)*

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) *Proserpine (La), Thaïs écarlate (La), Proserpine d'Honorat (La)*

PLANTES VASCULAIRES

Abies alba Mill., 1768 *Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If*

Abies cephalonica Loudon, 1838 *Sapin de Céphalonie*

Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841 *Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Crimée*

Abies pinsapo Boiss., 1838 *Sapin d'Espagne*

Abutilon theophrasti Medik., 1787 *Abutilon d'Avicenne, Abutilon à pétales jaunes, Abutilon de Théophraste*

Acacia dealbata Link, 1822 *Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes*

Acacia longifolia (Andrews) Willd., 1806 *Acacia doré de Sydney, Mimosa chenille*

Acacia retinodes Schltdl., 1847 *Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons*

Acanthospermum humile (Sw.) DC., 1836

Acanthus mollis L., 1753 *Acanthe à feuilles molles, Acanthe molle*

Acer campestre L., 1753 *Érable champêtre, Acéraille*

Acer monspessulanum L., 1753 *Érable de Montpellier, Agas, Azerou*

Acer negundo L., 1753 *Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo*

Acer opalus subsp. opalus Mill., 1768 *Érable d'Italie*

Acer platanoides L., 1753 *Érable plane, Plane*

Acer pseudoplatanus L., 1753 *Érable sycomore, Grand Érable*

Achillea ageratum L., 1753 *Achillée visqueuse, Herbe-au-charpentier*

Achillea collina (Becker ex Rchb.f.) Heimerl, 1883

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., 1802 *Achillée à feuilles de Crithme, Achillée à feuilles de Criste marine*

Achillea filipendulina Lam., 1783 *Achillée à feuilles de Fougère*

Achillea ligustica All., 1773 *Achillée de Ligurie*

Achillea millefolium L., 1753 *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus*

Achillea nobilis L., 1753 *Achillée noble*

Achillea odorata L., 1759 *Achillée odorante*

Achillea punctata Ten. ex Fenzl

Achillea tomentosa L., 1753 *Achillée tomenteuse*

Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv., 1812 *Plumet faux brome, Stipe faux Brome*

Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 *Calamagrostide argentée, Stipe Calamagrostide*

Acmispon americanus (Nutt.) Rydb., 1913

Adiantum capillus-veneris L., 1753 *Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus*

Adonis aestivalis L., 1762 *Goutte de sang d'été, Adonis d'été*

Adonis annua L., 1753 *Goutte de sang, Adonis annuelle, Adonis d'automne*

Adonis flammea Jacq., 1776 *Adonis couleur de feu, Adonis flamme, Goutte de sang rouge vif*

Aegilops biuncialis Vis., 1842 *Égilope à grosses arrêtes, Égilope long de deux pouces*

Aegilops cylindrica Host, 1802 *Égilope cylindrique*

Aegilops geniculata Roth, 1797 *Égilope ovale, Égilope ovoïde*

Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835 *Égilope négligée, Égilope à trois arêtes*

Aegilops speltoides Tausch, 1837 *Égilope faux Épeautre*

Aegilops triuncialis L., 1753 *Égilope à trois arêtes, Égilope de trois pouces*

Aegilops ventricosa Tausch, 1837 *Égilope ventru*

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl., 1850 *Élurope du littoral*

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel., 1840

Aesculus hippocastanum L., 1753 *Marronnier d'Inde, Marronnier commun*

Aethionema saxatile subsp. saxatile (L.) R.Br., 1812

Agave americana L., 1753 *Agave d'Amérique*

Agave salmiana Otto, 1842

Agrimonia eupatoria L., 1753 *Aigremoine, Francormier*

Agrimonia eupatoria subsp. grandis (Andrz. ex Asch. & Graebn.) Bornm., 1940 *Grande Aigremoine*

Agrimonia procera Wallr., 1840 *Aigremoine élevée, Aigremoine odorante*

Agrostemma githago L., 1753 *Lychnis Nielle, Nielle des blés*

Agrostis capillaris L., 1753 *Agrostide capillaire*

Agrostis gigantea Roth, 1788 *Agrostide géant, Fiorin*

Agrostis stolonifera L., 1753 *Agrostide stolonifère*

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 *Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailanthe*

Aira caryophyllea L., 1753 *Canche caryophillée*

Aira cupaniana Guss., 1843 *Canche de Cupani*

Aira multiculmis Dumort., 1824 *Canche*

Aira provincialis Jord., 1852 *Canche de Provence*

Aira tenorei Guss., 1827 *Canche de Tenore, Aira de Tenore*

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 *Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette*

Ajuga genevensis L., 1753 *Bugle de Genève*

Ajuga iva (L.) Schreb., 1773 *Bugle Ivette, Ivette-musquée*

Ajuga reptans L., 1753 *Bugle rampante, Consyre moyenne*

Albizia julibrissin Durazz., 1772 *Arbre à soie, Acacia de Constantinople, Albizia*

Alcea rosea L., 1753 *Rose trémière, Passerose*

Alisma lanceolatum With., 1796 *Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée*

Alisma plantago-aquatica L., 1753 *Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun*

Alkanna matthioli Tausch, 1824 *Orcanette tinctoriale*

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 *Alliaire, Herbe aux aulx*

Allium acutiflorum Loisel., 1809 *Ail à fleurs aiguës*

Allium atroviolaceum Boiss., 1846

Allium cepa L., 1753 *Oignon, Ail oignon*

Allium chamaemoly L., 1753 *Ail petit Moly*

Allium commutatum Guss., 1855 *Ail des îles*

Allium cyrilli Ten., 1829 *Ail de Cyrillo*

Allium flavum L., 1753 *Ail jaune*

Allium longispathum D.Delaroche, 1811 *Ail en panicule*

Allium moschatum L., 1753 *Ail musqué*

Allium multibulbosum Jacq., 1773

Allium neapolitanum Cirillo, 1788 *Ail de Naples, Ail blanc*

Allium nigrum L., 1762 *Ail noir, Ail de Chine*

Allium oleraceum L., 1753 *Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés*

Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri, 1977 *Ail de Girerd*

Allium pallens L., 1762 *Ail pâle*

Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830 *Ail à nombreuses fleurs, Poireau des vignes*

Allium porrum L., 1753

Allium roseum L., 1753 *Ail rose*

Allium rotundum L., 1762 *Ail arrondi*

Allium sativum L., 1753 *Ail, Ail commun, Ail cultivé*

Allium savii Parl., 1857 *Ail en panicule des salines, Ail des salines*

Allium scaberrimum J.Serres, 1857 *Ail très rude, Ail très scabre*

Allium sphaerocephalon L., 1753 *Ail à tête ronde*

Allium subhirsutum L., 1753 *Ail un peu hérissé*

Allium trifoliatum Cirillo, 1792 *Ail à trois feuilles, Ail trifolié*

Allium triquetrum L., 1753 *Ail à trois angles, Ail à tige triquètre*

Allium vineale L., 1753 *Ail des vignes, Oignon bâtard*

Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh., 1012 *Cheilanthès Acrostic*

Alnus alnobetula subsp. alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872 *Aulne vert*

Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 ***Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme***
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 ***Aulne glutineux, Verne***
Alnus incana (L.) Moench, 1794 ***Aulne blanchâtre, Aulne de montagne***
Aloe maculata All., 1773
Alopecurus arundinaceus Poir., 1808 ***Vulpin faux-roseau***
Alopecurus bulbosus Gouan, 1762 ***Vulpin bulbeux***
Alopecurus geniculatus L., 1753 ***Vulpin genouillé***
Alopecurus myosuroides Huds., 1762 ***Vulpin des champs, Queue-de-renard***
Alopecurus rendlei Eig, 1937 ***Vulpin en outre, Vulpin utriculé***
Aloysia citriodora Paláu, 1784 ***Verveine odorante, Verveine citronnelle, Verveine du Pérou***
Althaea cannabina L., 1753 ***Guimauve faux-chanvre***
Althaea officinalis L., 1753 ***Guimauve officinale, Guimauve sauvage***
Althenia filiformis Petit, 1829 ***Althénie filiforme, Althénia filiforme***
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 ***Alysson à calice persistant***
Alyssum simplex Rudolphi, 1799 ***Alysson des champs***
Amaranthus albus L., 1759 ***Amarante albus, Amarante blanche***
Amaranthus blitoides S.Watson, 1877 ***Amarante fausse-blette, Fausse Amarante***
Amaranthus blitum subsp. blitum L., 1753 ***Amarante Blite***
Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987 ***Amarante échancrée***
Amaranthus deflexus L., 1771 ***Amarante couchée, Amarante étalée***
Amaranthus hybridus L., 1753 ***Amarante hybride***
Amaranthus retroflexus L., 1753 ***Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge***
Amaranthus viridis L., 1763 ***Amarante verte, Fleur de jalousie, Passe-velours***
Ambrosia artemisiifolia L., 1753 ***Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle***
Ambrosia psilostachya DC., 1836 ***Ambroisie à épis lisses***
Ambrosia trifida L., 1753 ***Ambroisie trifide***
Amelanchier ovalis Medik., 1793 ***Amélanchier***
Amelanchier ovalis subsp. ovalis Medik., 1793
Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga & Barkworth, 2006
Ammi majus L., 1753 ***Ammi élevé, Grand ammi***
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr., 1947 ***Faux-ammi fluet, Faux-ammi grêle***
Ammophila arenaria subsp. arundinacea (Husn.) H.Lindb., 1932 ***Oyat du Midi***
Amorpha fruticosa L., 1753 ***Indigo du Bush, Amorphe buissonnante***
Amsinckia micrantha Suksd., 1900
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003 ***Orchis à odeur de vanille***
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 ***Orchis à fleurs lâches***
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 ***Orchis bouffon***
Anacamptis morio subsp. morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis morio subsp. picta (Loisel.) Jacquet & Scappat., 2003 ***Orchis peint***
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 ***Orchis des marais***
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 ***Orchis papillon***
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 ***Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide***
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 1807 ***Anacycle en massue, Anacycle tomenteux***
Anacyclus radiatus Loisel., 1828 ***Anacycle radié***
Anacyclus valentinus L., 1753 ***Anacycle de Valence***
Anagyris foetida L., 1753 ***Anagyre fétide, Bois puant***
Anarrhinum laxiflorum Boiss., 1838 ***Muflier à fleurs lâches***
Anchusa gmelinii Ledeb., 1820
Anchusa italica Retz., 1779 ***Buglosse d'Italie, Buglosse azurée***
Anchusa ochroleuca M.Bieb., 1808 ***Buglosse jaunâtre***
Anchusa officinalis L., 1753 ***Buglosse officinale***
Anchusa procera Besser ex Link, 1821
Anchusa undulata subsp. hybrida (Ten.) Pellanda, 1910
Andrachne telephioides L., 1753 ***Andrachne***
Andropogon provincialis Lam., 1783
Androsace maxima L., 1753 ***Grande androsace, Androsace des champs***
Andryala integrifolia L., 1753 ***Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse***
Anemone coronaria L., 1753 ***Anémone couronnée, Anémone Coronaire***
Anemone hepatica L., 1753 ***Hépatique à trois lobes***
Anemone hortensis subsp. hortensis L., 1753 ***Anémone des jardins***
Anemone palmata L., 1753 ***Anémone palmée***
Anethum graveolens L., 1753 ***Aneth odorant, Fenouil bâtard***
Angelica sylvestris subsp. sylvestris L., 1753
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 ***Brome à deux étamines***
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 ***Brome de Madrid***
Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945 ***Brome raide***
Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934 ***Brome rouge***
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 ***Brome stérile***
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 ***Brome des toits***
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957 ***Boussingaultie***
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 ***Patte de chat, Pied de chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule***
Anthemis arvensis L., 1753 ***Anthémis des champs, Camomille sauvage***
Anthemis arvensis subsp. arvensis L., 1753 ***Camomille sauvage***
Anthemis arvensis subsp. incrassata (Loisel.) Nyman, 1879 ***Anthémis à pédoncules renflés***
Anthemis cotula L., 1753 ***Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puante***
Anthemis cretica subsp. gerardiana (Jord.) Greuter, 2005 ***Anthémis de Gérard***
Anthemis maritima L., 1753 ***Anthémis maritime, Camomille maritime***
Anthemis secundiramea Biv., 1806 ***Anthémis à rameaux tournés d'un même côté, Anthémis à rameaux tournés du même côté***
Anthemis tomentosa L., 1753
Anthericum liliago L., 1753 ***Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis***
Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842 ***Flouve aristée, Flouve de Puel***
Anthoxanthum odoratum L., 1753 ***Flouve odorante***
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 ***Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage***
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814 ***Cerfeuil cultivé, Cerfeuil commun***
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 ***Cerfeuil des bois, Persil des bois***
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris (L.) Hoffm., 1814 ***Persil des bois***
Anthyllis barba-jovis L., 1753 ***Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter, Anthyllis Barbe-de-Jupiter, Anthyllide barbe de Jupiter***
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff, 2003 ***Hyménocarpe couché en cercle***
Anthyllis cytisoides L., 1753 ***Anthyllis faux cytise, Anthyllide faux-cytise***
Anthyllis montana L., 1753 ***Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes***
Anthyllis vulneraria L., 1753 ***Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables***
Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang., 1882 ***Anthyllide à fleurs rouges***
Antirrhinum majus subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & Layens, 1894 ***Muflier***
Antirrhinum majus subsp. majus L., 1753 ***Gueule-de-lion***
Antirrhinum majus subsp. tortuosum (Bosc) Ball, 1878 ***Grande gueule-de-loup sinueuse, Muflier tortueux, Grand muflier tortueux***
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812 ***Agrostis interrompu, Agrostis à panicule interrompue***
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 ***Jouet-du-Vent***
Aphanes arvensis L., 1753 ***Alchémille des champs, Aphane des champs***
Aphanes australis Rydb., 1908 ***Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits***
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 ***Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleu-de-Montpellier, Bragalou***
Apium graveolens L., 1753 ***Céleri, Cèleri***
Aponogeton distachyos L.f., 1782 ***Plante-épée, Aponogéton odorant***
Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes, 1928 ***Ficoide glaciale, Baby sun rose, Ficoide à feuilles en coeur***
Aquilegia vulgaris L., 1753 ***Ancolie vulgaire, Clochette***
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 ***Arabette de thalius, Arabette des dames***
Arabis alpina L., 1753 ***Arabette des Alpes, Corbeille-d'argent***
Arabis auriculata Lam., 1783 ***Arabette dressée, Arabette auriculée***
Arabis collina subsp. collina Ten., 1815
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838 ***Arabette à fruits aplatis, Arabette des bois***
Arabis sagittata (Bertol.) DC., 1815 ***Arabette hérissée, Arabette sagittée***
Arabis verna (L.) R.Br., 1812 ***Arabette du printemps***
Araujia sericifera Brot., 1818 ***Araujia***
Arbutus andrachne L., 1759
Arbutus unedo L., 1753 ***Arbousier commun, Arbre aux fraises***
Arceuthobium gambyi Fridl.
Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb., 1819 ***Gui du genévrier, Arceutobe***
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 ***Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules***
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825 ***Raisin d'ours, Arbousier traînant***
Arenaria aggregata (L.) Loisel., 1827 ***Sabline à fleurs en têtes***
Arenaria grandiflora L., 1759 ***Sabline à grandes fleurs***
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844 ***Sabline à parois fines, Sabline grêle***
Arenaria modesta Dufour, 1821 ***Sabline modeste***
Arenaria provincialis Chater & G.Halliday, 1964 ***Sabline de Provence***
Arenaria serpyllifolia L., 1753 ***Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs***
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 ***Potentille des oies***
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip., 1844
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 ***Argyrolobe de Linné***
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz., 1810 ***Gouet à capuchon, Capuchon-de-moine***
Aristolochia altissima Desf., 1799
Aristolochia clematitis L., 1753 ***Aristoloche clématite, Poison de terre***
Aristolochia paucinervis Pomel, 1874 ***Aristoloche à nervures peu nombreuses, Aristoloche peu nervée***
Aristolochia pistolochia L., 1763 ***Pistoloche***
Aristolochia rotunda subsp. rotunda L., 1753 ***Aristoloche arrondie***
Armeria arenaria subsp. bupleuroides (Godr. & Gren.) Greuter & Burdet, 1989 ***Arméria faux Buplèvre***
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 ***Grand Raifort***
Arnica montana L., 1753 ***Arnica des montagnes, Herbe aux prêcheurs***
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 ***Fromental élevé, Ray-grass français***
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 ***Avoine à chapelets***
Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 ***Ray-grass français***
Arrhenatherum elatius subsp. sardoum (Em.Schmid) Gamisans, 1974 ***Avoine de Sardaigne***
Artemisia abrotanum L., 1753
Artemisia absinthium L., 1753 ***Armoise absinthe, Herbe aux vers***
Artemisia alba Turra, 1764 ***Armoise blanche, Armoise camphrée***
Artemisia annua L., 1753 ***Armoise annuelle***
Artemisia arborescens (Vaill.) L., 1763 ***Armoise arborescente***
Artemisia caerulescens subsp. gallica (Willd.) K.Perss., 1974 ***Armoise bleuâtre de France, Armoise de France***
Artemisia campestris L., 1753 ***Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge***
Artemisia campestris subsp. glutinosa (J.Gay ex Besser) Batt., 1889 ***Armoise poisseuse***
Artemisia dracunculus L., 1753
Artemisia scoparia Waldst. & Kit., 1802 ***Armoise à balais***
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 ***Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine***
Artemisia vulgaris L., 1753 ***Armoise commune, Herbe de feu***
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch, 1853 ***Salicorne à gros épis***
Arum cylindraceum Gasp., 1844 ***Gouet des Alpes, Arum des Alpes, Gouet cylindrique***
Arum italicum Mill., 1768 ***Gouet d'Italie, Pied-de-veau***
Arundo donax L., 1753 ***Canne de Provence, Grand roseau***
Asparagus acutifolius L., 1753 ***Asperge sauvage***
Asparagus maritimus (L.) Mill., 1768 ***Asperge maritime***
Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753 ***Asperge officinale***
Asperugo procumbens L., 1753 ***Râpette, Portefeuille***
Asperula aristata subsp. oreophila (Briq.) Hayek, 1924 ***Aspérule des montagnes***
EN Asperula arvensis L., 1753 ***Aspérule des champs, Petite Râpette***
Asperula cynanchica L., 1753 ***Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables***
Asperula cynanchica subsp. cynanchica L., 1753
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire, 1925 ***Asphodèle d'Ayard***
Asphodelus cerasiferus J.Gay, 1857 ***Asphodèle de Chambeiron, Asphodèle-cerise***
Asphodelus fistulosus L., 1753 ***Asphodèle fistuleuse, Asphodèle fistuleux***
Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus Parl., 1857 ***Asphodèle de Villars***
Asphodelus ramosus L., 1753 ***Bâton-blanc ramifié***
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 ***Capillaire noir, Doradille noir***
Asplenium ceterach L., 1753 ***Cétérach***
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 ***Doradille de Haller, Doradille des sources, Asplénium de Haller***
Asplenium marinum L., 1753 ***Doradille marine***
Asplenium onopteris L., 1753 ***Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris***
Asplenium petrarchae (Guérin) DC., 1815 ***Doradille de Pétrarque***
Asplenium ruta-muraria L., 1753 ***Doradille rue des murailles, Rue des murailles***
Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria L., 1753 ***Rue des murailles***
Asplenium sagittatum (DC.) Bange, 1952 ***Herbe à la mule, Doradille sagittée***
Asplenium scolopendrium L., 1753 ***Scolopendre, Scolopendre officinale***
Asplenium trichomanes L., 1753 ***Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie***
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst., 1980 ***Capillaire des murailles à rachis épais, Doradille à rachis épais***
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey., 1964 ***Capillaire, Doradille fausse-capillaire***
Asteriscus aquaticus (L.) Less., 1832 ***Astérolide aquatique***
Astragalus boeticus L., 1753 ***Astragale de Bétique, Astragale bétique***
Astragalus cicer L., 1753 ***Astragale pois-chiche, Chiche sauvage***
Astragalus echinatus Murray, 1770 ***Astragale hérissé d'aiguillons***
Astragalus glycyphyllos L., 1753 ***Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse***
Astragalus hamosus L., 1753 ***Astragale à gousses en hameçon***
Astragalus hypoglottis L., 1771 ***Astragale pourpre***
Astragalus incanus L., 1759 ***Astragale blanchâtre***
Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus L., 1753
Astragalus odoratus Lam., 1783
Astragalus sesameus L., 1753 ***Astragale faux-sésame***
Astragalus stella Gouan, 1773 ***Astragale étoilé, Astragale en étoile***
EN Astragalus tragacantha L., 1753 ***Astragale de Marseille, Coussin-de-belle-mère***
Astragalus vesicarius subsp. vesicarius L., 1753 ***Astragale vésiculeux***
Atocion rupestre (L.) Oxelman, 2001 ***Silène des rochers***
Atractylis cancellata L., 1753 ***Atractyle grillagé***
Atriplex halimus L., 1753 ***Halime, Arroche halime***
Atriplex hortensis L., 1753 ***Arroche des jardins, Bonne-Dame***
Atriplex patula L., 1753 ***Arroche étalée***
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 ***Arroche hastée***
Atriplex rosea L., 1763 ***Arroche rosée***
Atriplex tatarica L., 1753 ***Arroche de Tartarie***
Atriplex tornabenei Tineo
Atropa belladonna L., 1753 ***Belladone, Bouton-noir***
Avellinia festucoides (Link) Valdés & H.Scholz, 2006 ***Fétuque d'Avellino***

Avena barbata Pott ex Link, 1799 ***Avoine barbue***
Avena barbata subsp. lusitanica (Tab.Morais) Romero Zarco, 1986 ***Avoine du Portugal***
Avena fatua L., 1753 ***Avoine folle, Havenon***
Avena sativa L., 1753 ***Avoine cultivée***
Avena sterilis L., 1762 ***Avoine à grosses graines***
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 ***Avoine pubescente***
Avenula pubescens subsp. pubescens (Huds.) Dumort., 1868 ***Avoine pubescente***
Azolla filiculoides Lam., 1783 ***Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau***
Baccharis halimifolia L., 1753 ***Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione***
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 ***Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule***
Ballota acetabulosa (L.) Benth., 1834 ***Herbe à veilleuse, Ballote à grand calice***
Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929 ***Ballote du Midi***
Ballota nigra subsp. nigra
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 ***Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe***
Bartsia trixago L., 1753 ***Bellardie, Bartsie trixago, Bellardie Germandrée***
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze, 1891 ***Bassia***
Bassia scoparia (L.) Voss, 1903 ***Bassie à balais***
Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830 ***Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine, Jacinthe de Rome***
EN Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth, 1843 ***Jacinthe à trois feuilles, Bellevalia à trois feuilles***
Bellis annua L., 1753 ***Pâquerette annuelle***
Bellis perennis L., 1753 ***Pâquerette***
Bellis sylvestris Cirillo, 1792 ***Pâquerette des bois, Pâquerette d'Automne***
Berberis aquifolium Pursh, 1814 ***Faux Houx***
Berberis vulgaris L., 1753 ***Épine-vinette, Berbéris commun***
Berteroa incana (L.) DC., 1821 ***Alysson blanc, Alysse blanche***
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 ***Berle dressée, Petite berle***
Beta trigyna Waldst. & Kit., 1802 ***Betterave à trois stigmates***
Beta vulgaris L., 1753 ***Betterave commune, Bette-épinard***
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 ***Bette maritime, Betterave maritime***
Beta vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 ***Betterave***
Betonica officinalis L., 1753 ***Épiaire officinale***
Bidens bipinnata L., 1753 ***Bident bipenné***
Bidens frondosa L., 1753 ***Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu***
Bidens subalternans DC., 1836 ***Bident à folioles subalternes***
Bidens tripartita subsp. tripartita L., 1753 ***Eupatoire aquatique***
Bifora radians M.Bieb., 1819 ***Bifora rayonnante, Sudeur***
EN Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 ***Bifora testiculé, Bifora à deux coques, Bifora à testicules***
Biscutella cichoriifolia Loisel., 1810 ***Lunetière à feuilles de chicorée***
Biscutella didyma L., 1753 ***Biscutelle***
Biscutella lima Rchb., 1832
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 ***Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux***
Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 ***Centaurée jaune tardive, Blackstonie acuminée***
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp., 1913 ***Centaurée jaune, Chlore non perfoliée***
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata (L.) Huds., 1762 ***Chlorette***
Blitum virgatum L., 1753 ***Épinard-fraise en baguette***
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827 ***Scirpe comprimé, Souchet comprimé***
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G.Sm., 1995
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 ***Scirpe maritime, Rouche***
Bolboschoenus planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova, 1967
Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz, 1973 ***Bombycilaène à deux couleurs, Cotonnière discolore***
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 ***Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, , Cotonnière dressée***
Borago officinalis L., 1753 ***Bourrache officinale***

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 ***Barbon Andropogon***
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 ***Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème***
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812 ***Brachypode à deux épis, Brachypode des bois***
Brachypodium hybridum Catalán, Joch.Müll., L.A.J.Mur & T.Langdon, 2012
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817 ***Brachypode de Phénicie***
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 ***Brachypode rameux***
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 ***Brachypode des rochers***
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 ***Brachypode des bois, Brome des bois***
Brassica elongata subsp. elongata Ehrh., 1792
Brassica fruticulosa Cirillo, 1792 ***Chou ligneux, Chou fruticuleux***
Brassica napus L., 1753 ***Colza***
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 ***Moutarde noire, Chou noir***
Brassica oleracea L., 1753 ***Chou sauvage, Chou commun***
Brassica rapa L., 1753 ***Navette des champs***
Brassica repanda subsp. saxatilis (DC.) Heywood, 1964 ***Chou étalé des rochers, Chou des rochers***
Brassica tournefortii Gouan, 1773 ***Chou de Tournefort***
Briza maxima L., 1753 ***Brize élevée, Grande Brize***
Briza media L., 1753 ***Brize intermédiaire, Amourette commune***
Briza minor L., 1753 ***Petite amourette, Brize mineure***
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 ***Brome érigé***
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973 ***Brome sans arêtes***
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973 ***Brome âpre***
Bromus arvensis L., 1753 ***Brome des champs***
Bromus catharticus Vahl, 1791 ***Brome faux Uniola, Brome purgatif***
Bromus commutatus subsp. commutatus Schrad., 1806 ***Brome confondu***
Bromus hordeaceus L., 1753 ***Brome mou***
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753 ***Brome mou***
Bromus hordeaceus subsp. molliformis (J.Lloyd ex Godr.) Maire & Weiller, 1955 ***Brome divariqué***
Bromus hordeaceus subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blanq., 1929 ***Brome de Thomine-Desmazures***
Bromus intermedius Guss., 1827 ***Brome intermédiaire***
Bromus japonicus subsp. japonicus Thunb., 1784 ***Brome du Japon***
Bromus japonicus Thunb., 1784 ***Brome du Japon***
Bromus lanceolatus Roth, 1797 ***Brome lancéolé***
Bromus racemosus L., 1762 ***Brome en grappe***
Bromus secalinus L., 1753 ***Brome faux-seigle, Brome Seigle***
Bromus squarrosus L., 1753 ***Brome raboteux***
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799 ***Mûrier à papier, Broussonétia à papier***
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968
Buddleja davidii Franch., 1887 ***Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons***
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre, 1800 ***Bufonie paniculée***
Bufonia perennis Pourr., 1788 ***Buffonie vivace, Bufonie pérennante***
Bufonia tenuifolia L., 1753 ***Buffonie à petites feuilles, Bufonie à petites feuilles, Bufonie à feuilles étroites***
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 ***Charée***
Buglossoides arvensis subsp. arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954
Buglossoides arvensis subsp. permixta (Jord.) R.Fern., 1971
Buglossoides arvensis subsp. sibthorpiana (Griseb.) R.Fern., 1971
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst., 1954 ***Thé d'Europe***
Bunias erucago L., 1753 ***Bunias fausse-roquette, Roquette des champs***
Bunias orientalis L., 1753 ***Bunias d'Orient, Roquette d'Orient***
Bunium bulbocastanum L., 1753 ***Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre***
Bunium pachypodum P.W.Ball, 1968 ***Bunium à pied épais***
Bupleurum affine Sadler, 1825 ***Buplèvre de Hongrie***
Bupleurum baldense Turra, 1764 ***Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opâque***

Bupleurum fruticosum L., 1753 ***Buplèvre ligneux, Buplèvre en buisson***
Bupleurum gerardi All., 1773 ***Buplèvre de Gérard***
Bupleurum odontites L., 1753 ***Buplèvre de Desfontaines***
Bupleurum praealtum L., 1756 ***Buplèvre élevé***
Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (Gren. ex Timb.-Lagr.) H.J.Coste ***Buplèvre de Toulon***
Bupleurum rigidum L., 1753 ***Buplèvre rigide, Buplèvre raide***
Bupleurum rotundifolium L., 1753 ***Buplèvre à feuilles rondes, Oreille-de-lièvre***
Bupleurum semicompositum L., 1756 ***Buplèvre glauque***
EN Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 ***Buplèvre ovale, Buplèvre à ombelles réduites***
Bupleurum tenuissimum L., 1753 ***Buplèvre très grêle, Buplèvre grêle, Buplèvre menu***
Butomus umbellatus L., 1753 ***Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé***
Buxus balearica Lam.
Buxus sempervirens L., 1753 ***Buis commun, Buis sempervirent***
Cakile maritima subsp. maritima Scop., 1772 ***Roquette de mer***
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 ***Calamagrostide épigéios, Roseau des bois***
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler, 1802 ***Calamagrostide faux-phragmite, Calamagrostide faux Roseau***
Calendula arvensis L., 1763 ***Souci des champs, Gauchefer***
Calendula officinalis L., 1753 ***Souci officinal, Souci des jardins***
Calendula stellata Cav., 1791
Calendula tripterocarpa Rupr., 1856
Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905 ***Calépine de Corvians***
Callitriche lenisulca Clavaud, 1890 ***Callitriche***
Callitriche obtusangula Le Gall, 1852 ***Callitriche à angles obtus***
Callitriche stagnalis Scop., 1772 ***Callitriche des marais***
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 ***Callune, Bruyère***
Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906 ***Caméline alysson***
Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762 ***Caméline cultivée, Sésame d'Allemagne***
Campanula erinus L., 1753 ***Campanule érinus, Campanule à petites fleurs***
Campanula glomerata L., 1753 ***Campanule agglomérée***
Campanula medium L., 1753 ***Campanule carillon, Fausse Raiponce***
Campanula persicifolia L., 1753 ***Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob***
Campanula poscharskyana Degen, 1908
Campanula rapunculoides L., 1753 ***Campanule fausse-raiponce***
Campanula rapunculus L., 1753 ***Campanule raiponce***
Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, 1894 ***Campanule à racine épaisse***
Campanula trachelium L., 1753 ***Campanule gantelée, Ortie bleue***
Camphorosma monspeliaca L., 1753 ***Camphrée***
Campsis radicans (L.) Bureau, 1864 ***Bignone, Jasmin de Virginie, Jasmin trompette***
Cannabis sativa L., 1753 ***Chanvre cultivé, Cannabis***
Capparis spinosa L., 1753 ***Câprier épineux***
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 ***Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin***
Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk., 1869
Caragana arborescens Lam., 1785 ***Acacia jaune***
Cardamine hirsuta L., 1753 ***Cardamine hérissée, Cresson de muraille***
Cardamine pratensis L., 1753 ***Cardamine des prés, Cresson des prés***
Cardiospermum halicacabum L., 1753
Carduus acicularis Bertol., 1829 ***Chardon à épingles, Chardon à aiguilles***
Carduus crispus L., 1753 ***Chardon crépu***
EN Carduus fasciculiflorus Viv., 1825 ***Chardon à fleurs fasciculées, Chardon de Sardaigne***
Carduus litigiosus subsp. litigiosus Nocca & Balb., 1821
Carduus nigrescens subsp. nigrescens Vill., 1779 ***Chardon noircissant***
Carduus nigrescens subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens, 1894 ***Chardon du Vivarais***

Carduus nigrescens Vill., 1779 ***Chardon noirâtre, Chardon noircissant***
Carduus nutans subsp. platylepis (Rchb. & Saut.) Nyman, 1879 ***Chardon à bractées larges***
Carduus pycnocephalus L., 1763 ***Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses***
Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 ***Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules***
Carex acutiformis Ehrh., 1789 ***Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë***
Carex caryophyllea Latourr., 1785 ***Laîche printanière, Laîche du printemps***
Carex davalliana Sm., 1800 ***Laîche de Davall, Carex de Davall***
Carex distachya Desf., 1799 ***Laîche à longues bractées***
Carex distans L., 1759 ***Laîche à épis distants, Laîche distante***
Carex divisa Huds., 1762 ***Laîche divisée***
Carex divulsa Stokes, 1787 ***Laîche écartée***
Carex elata All., 1785 ***Laîche raide, Laîche élevée***
Carex extensa Gooden., 1794 ***Laîche étirée***
Carex flacca Schreb., 1771 ***Laîche glauque, Langue-de-pic***
Carex flacca subsp. serrulata (Biv.) Greuter, 1967 ***Laîche***
Carex halleriana Asso, 1779 ***Laîche de Haller***
Carex hirta L., 1753 ***Laîche hérissée***
Carex hispida Willd., 1801 ***Laîche hérissée***
Carex humilis Leyss., 1758 ***Laîche humble***
Carex lepidocarpa Tausch, 1834 ***Laîche écailleuse***
Carex liparocarpos Gaudin, 1804 ***Carex à fruits lustrés, Laîche luisante, Laîche rongée, Laîche à utricules lustrés***
Carex muricata L., 1753
Carex oedipostyla Duval-Jouve, 1870 ***Laîche à style bulbiforme***
Carex otrubae Podp., 1922 ***Laîche cuivrée***
Carex pairae F.W.Schultz, 1868 ***Laîche de Paira***
Carex panicea L., 1753 ***Laîche millet, Faux Fenouil***
Carex pendula Huds., 1762 ***Laîche à épis pendants, Laîche pendante***
Carex pseudocyperus L., 1753 ***Laîche faux-souchet***
Carex remota L., 1755 ***Laîche espacée***
Carex riparia Curtis, 1783 ***Laîche des rives***
Carex spicata Huds., 1762 ***Laîche en épis***
Carex tomentosa L., 1767 ***Laîche tomenteuse***
Carex viridula Michx., 1803 ***Laîche tardive, Carex tardif***
Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773 ***Chardousse, Cardabelle***
Carlina hispanica Lam., 1785
Carlina lanata L., 1753 ***Carline laineuse***
Carlina vulgaris L., 1753 ***Carline commune, Chardon doré***
Carpinus betulus L., 1753 ***Charme, Charmille***
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927 ***Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière***
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 ***Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots***
Carthamus caeruleus L., 1753 ***Cardoncelle bleue***
Carthamus carduncellus L., 1753 ***Cardoncelle des Montpellierains***
Carthamus lanatus L., 1753 ***Centaurée laineuse, Faux Safran***
Carum carvi L., 1753 ***Cumin des prés, Anis des Vosges***
Castanea sativa Mill., 1768 ***Chataignier, Châtaignier commun***
Catananche caerulea L., 1753 ***Cupidone, Catananche bleue, Cigaline***
Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz, 1966 ***Catapode intermédiaire***
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb., 1955 ***Scléropoa marin***
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 ***Pâturin rigide, Desmazérie rigide***
Caucalis platycarpos L., 1753 ***Caucalide, Caucalis à fruits aplatis, Caucalis à feuilles de Carotte***
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855 ***Cèdre de l'Atlas***
Cedrus libani A.Rich., 1823 ***Cèdre du Liban, Cèdre du mont Liban***
Celtis australis L., 1753 ***Micocoulier de provence, Falabreguier***
Celtis occidentalis L., 1753
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone, 2010

Cenchrus echinatus L., 1753
Cenchrus longisetus M.C.Johnst., 1963 *Pennisetum hérissé*
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010
Centaurea aspera L., 1753 *Centaurée rude*
Centaurea aspera subsp. aspera L., 1753 *Centaurée rude*
Centaurea aspera subsp. pseudosphaerocephala (Shuttlew. ex Rouy) Gugler, 1907 *Centaurée rude à capitule presque sphérique*
Centaurea benedicta (L.) L., 1763 *Cnicaut béni*
Centaurea calcitrapa L., 1753 *Centaurée chausse-trape, Centaurée Chausse-trappe*
Centaurea collina L., 1753 *Centaurée des collines*
Centaurea decipiens Thuill., 1799 *Centaurée de Debeaux*
Centaurea diffusa Lam., 1785 *Centaurée diffuse*
Centaurea diluta Aiton, 1789 *Centaurée pâle, Centaurée décolorée*
Centaurea glastifolia L., 1753
Centaurea iberica Trevir. ex Spreng., 1826
Centaurea jacea L., 1753 *Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette*
Centaurea jacea subsp. jacea L., 1753
Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952 *Centaurée de Timbal-Lagrave*
Centaurea melitensis L., 1753 *Centaurée de Malte*
Centaurea napifolia L., 1753 *Centaurée à feuilles de Navet*
Centaurea nigra L., 1753 *Centaurée noire*
Centaurea nigrescens subsp. transalpina (Schleich. ex DC.) Nyman, 1879 *Centaurée transalpine*
Centaurea paniculata L., 1753 *Centaurée à panicule, Centaurée paniculée*
Centaurea paniculata subsp. paniculata L., 1753 *Centaurée paniculée*
Centaurea paniculata subsp. polycephala (Jord.) Nyman, 1879 *Centaurée en paniculé à nombreux capitules, Centaurée polycéphale*
Centaurea pectinata L., 1763 *Centaurée pectinée*
Centaurea pullata L., 1753 *Centaurée brune, Centaurée bordée de noir*
Centaurea ragusina L., 1753
Centaurea scabiosa subsp. scabiosa L., 1753 *Centaurée Scabieuse*
Centaurea seridis subsp. sonchifolia (L.) Greuter, 2003
Centaurea sicula L., 1753 *Centaurée de Nice*
Centaurea solstitialis L., 1753 *Centaurée du solstice*
Centaurium erythraea Rafn, 1800 *Petite centaurée commune, Erythrée*
Centaurium erythraea subsp. erythraea Rafn, 1800
Centaurium erythraea subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Laínz, 1971 *Grande Petite-centaurée*
Centaurium maritimum (L.) Fritsch, 1907 *Petite centaurée maritime*
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 *Petite centaurée délicate*
Centaurium tenuiflorum subsp. acutiflorum (Schott) Zeltner, 1970
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 *Centranthe chausse-trappe, Centranthe Chausse-trape*
Centranthus lecoqii Jord., 1852 *Centranthe de Lecoq*
Centranthus ruber (L.) DC., 1805 *Centranthe rouge, Valériane rouge*
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 *Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche*
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 *Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée*
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 *Céphalanthère rouge, Elléborine rouge*
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 *Céphalaire blanche, Céphalaire à fleurs blanches*
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 *Céphalaire de Syrie*
Cerastium arvense subsp. suffruticosum (L.) Ces., 1844 *Céraiste suffrutescent*
Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum Desp. ex Pers., 1805 *Céraiste à pétales courts*
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 *Céraiste commun , Mouron d'alouette*
Cerastium glomeratum Thuill., 1799 *Céraiste aggloméré*
Cerastium ligusticum subsp. ligusticum Viv., 1802
Cerastium pumilum Curtis, 1777 *Céraiste nain*
Cerastium semidecandrum L., 1753 *Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable*
Cerastium siculum Guss., 1832 *Céraiste de Sicile*
Cerastium tomentosum L., 1753 *Céraiste tomenteux, Barbette*
Ceratocephala falcata (L.) Pers., 1805 *Renoncule en faux, Cératocéphale en faux*
Ceratonia siliqua L., 1753 *Caroubier*
Ceratophyllum demersum L., 1753 *Cornifle nageant, Cornifle immergé*
Ceratophyllum submersum L., 1763 *Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerme*
Cercis siliquastrum L., 1753 *Arbre de Judée, Gainier commun*
Cerinthe minor subsp. auriculata (Ten.) Rouy, 1927 *Mélinet mineur*
Cervaria rivini Gaertn., 1788 *Peucédan Herbe aux cerfs*
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chaenorrhinum minus subsp. minus (L.) Lange, 1870 *Petite linaire, Petit Chaenorrhinum*
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Kostel., 1844 *Linaire à feuilles d'Origan, Petite linaire à feuilles d'origan*
Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr., 1869 *Petite linaire à feuilles rougeatres, Linaire à feuilles rougeâtres*
Chaerophyllum temulum L., 1753 *Chérophylle penché, Couquet*
Chamaemelum nobile (L.) All., 1785 *Camomille romaine*
Chamaerops humilis L., 1753 *Chamaerops nain, Doum, Palmier nain*
Charybdis maritima (L.) Speta, 1998 *Scille maritime, Urginée maritime, Squille*
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál, 1976 *Cheirolophus fausse-chicorée*
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel, 1874 *Centaurée*
Chelidonium majus L., 1753 *Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire*
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 *Chénopode à feuilles de Stramoine*
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 *Chénopode des murs*
Chenopodium album L., 1753 *Chénopode blanc, Senousse*
Chenopodium album subsp. album L., 1753 *Senousse*
Chenopodium album subsp. amaranthicolor H.J.Coste & Reyn., 1905 *Chénopode couleur d'amarante*
Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890 *Chénopode à feuilles d'Obier*
Chenopodium ficifolium Sm., 1800 *Chénopode à feuilles de figuier, Chénopode tardif*
Chenopodium vulvaria L., 1753 *Chénopode fétide, Chénopode puant*
Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr., 1869 *Jasonia glutineux*
Chondrilla juncea L., 1753 *Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée*
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss., 1824 *Tournesol des teinturiers*
Chrysopogon gryllus (L.) Trin., 1820 *Chrysopogon grillon*
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 *Cicendie filiforme*
Cicer arietinum L., 1753 *Pois chiche, Tête-de-bélier*
Cichorium intybus L., 1753 *Chicorée amère, Barbe-de-capucin*
Cichorium pumilum Jacq., 1771 *Endive sauvage*
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 *Cirse sans tige*
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 *Cirse des champs, Chardon des champs*
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772 *Cirse laineux, Cirse aranéeux*
Cirsium ferox (L.) DC., 1805 *Cirse féroce*
Cirsium monspessulanum (L.) Hill, 1768 *Cirse de Montpellier*
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 *Cirse bulbeux*
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé*
Cirsium vulgare subsp. crinitum (Boiss. ex DC.) Arènes, 1948 *Cirse*
Cirsium vulgare subsp. vulgare (Savi) Ten., 1838 *Cirse lancéolé*
Cistus albidus L., 1753 *Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux*
Cistus monspeliensis L., 1753 *Ciste de Montpellier*
Cistus salviifolius L., 1753 *Ciste à feuilles de sauge, Mondré*
Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827 *Anthémis panaché*
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 *Marisque, Cladium des marais*
Clematis cirrhosa L., 1753 *Clematite cirrheuse, Clématite à vrilles*
Clematis flammula L., 1753 *Clématite flamme, Clématite odorante*
Clematis recta L., 1753 *Clématite droite, Clématite dressée*
Clematis vitalba L., 1753 *Clématite des haies, Herbe aux gueux*
Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 *Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic*
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 *Calament glanduleux*
Clinopodium nepeta subsp. nepeta (L.) Kuntze, 1891
Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum (Bromf.) Peruzzi & F.Conti, 2008 *Sariette à feuilles de Menthe*
Clinopodium vulgare L., 1753 *Sariette commune, Grand Basilic*
Clypeola jonthlaspi L., 1753 *Clypéole jonthlaspi*
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993 *Fausse Giroflée*
Colchicum autumnale L., 1753 *Colchique d'automne, Safran des prés*
Colchicum cupanii Guss., 1827 *Colchique de Bertoloni, Colchique de Cupani*
EN Colchicum filifolium (Cambess.) Stef., 1926 *Mérendère à feuilles filiformes*
Colchicum longifolium Castagne, 1845 *Colchique de Naples*
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854 *Chrysanthème de Mykonos*
Colutea arborescens L., 1753 *Baguenaudier, Arbre à vessies*
Colutea arborescens subsp. gallica Browicz, 1963
Commelina communis L., 1753 *Misère asiatique, Comméline commune*
Conium maculatum L., 1753 *Grande cigüe, Ciguë tachée*
Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 *Conopode dénudé, Grand Conopode*
EN Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 *Vélar d'Orient, Roquette d'orient, Conringie d'Orient*
Convolvulus althaeoides L., 1753 *Liseron fausse mauve, Liseron fausse Guimauve*
Convolvulus arvensis L., 1753 *Liseron des champs, Vrillée*
Convolvulus betonicifolius Mill., 1768 *Liseron à feuilles de bétoine, Liseron hirsute*
Convolvulus cantabrica L., 1753 *Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye*
Convolvulus elegantissimus Mill., 1768
Convolvulus lanuginosus Desr., 1792 *Liseron duveté, Liseron duveteux, Liseron laineux*
Convolvulus lineatus L., 1759 *Liseron à rayures parallèles, Liseron rayé*
Convolvulus sabatius Viv.
Convolvulus sepium L., 1753 *Liset, Liseron des haies*
Convolvulus silvaticus Kit., 1805 *Liseron des forêts*
Convolvulus soldanella L., 1753 *Liseron des dunes*
Convolvulus tricolor L., 1753 *Liseron tricolore*
Coreopsis lanceolata L., 1753 *Coréopsis lancéolé*
Coriandrum sativum L., 1753 *Coriandre cultivée*
Coriaria myrtifolia L., 1753 *Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs*
Coris monspeliensis L., 1753 *Coris de Montpellier*
Corispermum gallicum Iljin, 1929 *Corisperme de France*
Cornus mas L., 1753 *Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage*
Cornus sanguinea L., 1753 *Cornouiller sanguin, Sanguine*
Coronilla glauca L., 1755 *Coronille glauque*
Coronilla juncea L., 1753 *Coronille à tige de jonc, Coronille à allure de Jonc*
Coronilla minima L., 1756 *Coronille naine, Coronille mineure*
Coronilla minima subsp. lotoides (W.D.J.Koch) Nyman, 1878 *Coronille faux Lotier*
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 *Coronille scorpion*
Coronilla valentina L., 1753 *Coronille de Valence*
Coronilla varia L., 1753 *Coronille changeante*
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 *Herbe de la Pampa, Roseau à plumes*
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 *Corydale solide*
Corylus avellana L., 1753 *Noisetier, Avelinier*
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr., 1950 *Corynéphore fasciculé*
Cosmos bipinnatus Cav., 1791 *Cosmos*
Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844 *Anthémis géante*
Cota tinctoria subsp. australis (R.Fern.) Oberpr. & Greuter, 2003
Cota triumfetti (L.) J.Gay ex Guss., 1844 *Camomille de Trionfetti*
Cotinus coggygria Scop., 1771 *Arbre à perruque, Sumac Fustet*
Cotoneaster coriaceus Franch., 1890 *Cotonéaster*
Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923 *Cotonéaster du Dauphiné*
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879 *Cotonéaster horizontal*
Cotoneaster integerrimus Medik., 1793 *Cotonéaster vulgaire, Cotonéaster sauvage*
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K.Koch, 1853 *Cotonéaster de l'Atlantique*
Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 *Cotonéaster tomenteux, Cotonéaster des monts Nébrodes*
Cotoneaster x intermedius (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste, 1923
Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903 *Crassule mousse, Mousse fleurie*
Crataegus azarolus L., 1753 *Épine d'Espagne*
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891 *Néflier*
Crataegus monogyna Jacq., 1775 *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai*
Crepis albida Vill., 1779 *Crepide blanche, Crépide blanchâtre*
Crepis biennis L., 1753 *Crépide bisannuelle*
Crepis bursifolia L., 1753 *Crépide à feuilles de capselle*
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 *Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires*
Crepis dioscoridis L., 1763 *Crépide de Dioscoride*
Crepis foetida L., 1753 *Crépide fétide*
Crepis foetida subsp. foetida L., 1753 *Crépide fétide*
Crepis foetida subsp. glandulosa (Guss.) Arcang., 1882
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M.Bieb.) Celak., 1871 *Crépide à feuilles de Pavot*
Crepis leontodontoides All., 1789 *Crépide fausse dent de lion, Crépide faux Liondent*
Crepis micrantha Czerep., 1964 *Crépis à petites fleurs*
Crepis nicaeensis Balb., 1807 *Crépide de Nice*
Crepis pulchra L., 1753 *Crépide élégante, Crépide jolie*
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 *Crépide de Nîmes*
Crepis setosa Haller f., 1797 *Crépide hérissée*
Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd, 1844 *Crépide de Suffren*
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 *Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit*
Crepis vesicaria subsp. vesicaria L., 1753
Crepis zacintha (L.) Loisel., 1807 *Crépide de Zante, Crépis de Zante*
Cressa cretica L., 1753 *Cresse de Crète*
Crithmum maritimum L., 1753 *Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre*
Crocus versicolor Ker Gawl., 1808 *Crocus changeant*
Crucianella angustifolia L., 1753 *Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites*
Crucianella latifolia L., 1753 *Crucianelle à feuilles larges*
Crucianella maritima L., 1753 *Crucianelle maritime*
Cruciata laevipes Opiz, 1852 *Gaillet croisette, Croisette commune*
Crupina crupinastrum (Moris) Vis., 1847 *Crupine du Midi*
Crupina vulgaris Cass., 1817 *Crupine commune, Crupine vulgaire*
Crypsis aculeata (L.) Aiton, 1789 *Crypside piquant, Crypsis en forme d'aiguillon*
Cucurbita pepo L., 1753 *Courge pépon, Giraumon, Citrouille iroquoise, Courgette*
Cullen americanum (L.) Rydb., 1919
Cupressus arizonica Greene, 1882 *Cyprès de l'Arizona, cyprès*
Cupressus sempervirens L., 1753 *Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier*
Cuscuta campestris Yunck., 1932 *Cuscute des champs*
Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 *Cuscute à petites fleurs*
Cuscuta epithymum subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang., 1882 *Cuscute de Kotschy*
Cuscuta europaea L., 1753 *Grande cuscute, Cuscute d'Europe*
Cuscuta planiflora Ten., 1829 *Cuscute à fleurs planes*

Cutandia maritima (L.) Benth., 1881 ***Cutandie maritime***
Cyanus depressus (M.Bieb.) Soják, 1972
Cyanus graminifolius (Lam.) Ol avská ***Centaurée panachée***
Cyanus segetum Hill, 1762 ***Barbeau***
Cyanus semidecurrens (Jord.) Holub, 1973 ***Centaurée***
Cyclamen hederifolium Aiton, 1789 ***Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain***
Cyclamen repandum Sm., 1806 ***Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps***
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson, 1925 ***Marsh Parsley***
Cydonia oblonga Mill., 1768 ***Cognassier***
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 ***Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs***
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch., 1869 ***Cymodocée, Paille de mer***
Cynanchum acutum L., 1753 ***Scammonée aiguë, Scammonée de Montpellier***
Cynara cardunculus L., 1753 ***Cardon, Carde***
Cynara scolymus L., 1753 ***Artichaut***
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 ***Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent***
Cynoglossum creticum Mill., 1768 ***Cynoglosse de Crête, Cynoglosse peint***
Cynoglossum dioscoridis Vill., 1779 ***Cynoglosse de Dioscoride***
Cynoglossum officinale L., 1753 ***Cynoglosse officinale***
Cynosurus cristatus L., 1753 ***Crételle***
Cynosurus echinatus L., 1753 ***Crételle hérissée, Crételle épineuse***
Cynosurus effusus Link, 1799 ***Crételle diffuse***
Cyperus badius Desf., 1798 ***Souchet bai***
Cyperus capitatus Vand., 1771 ***Souchet en bouquet arrondi***
Cyperus difformis L., 1756 ***Souchet difforme***
Cyperus eragrostis Lam., 1791 ***Souchet vigoureux, Souchet robuste***
Cyperus flavescens L., 1753 ***Souchet jaunâtre***
Cyperus fuscus L., 1753 ***Souchet brun***
Cyperus glomeratus L., 1756 ***Souchet aggloméré***
Cyperus involucratus Rottb., 1772 ***Souchet***
Cyperus longus L., 1753 ***Souchet long, Souchet odorant***
Cyperus michelianus (L.) Link, 1827
Cyperus rotundus L., 1753 ***Souchet rond***
Cyperus serotinus Rottb., 1773 ***Souchet tardif, Petit-jonc tardif***
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl, 1836 ***Fougère-houx***
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805 ***Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc***
Cytinus hypocistis (L.) L., 1767 ***Cytinet***
Cytinus ruber Fritsch, 1922 ***Cytinet de L'Écluse***
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 ***Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles sessiles***
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 ***Genêt à balai, Juniesse***
Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899 ***Cytise épineux***
Dactylis glomerata L., 1753 ***Dactyle aggloméré, Pied-de-poule***
Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753 ***Pied-de-poule***
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, 1882 ***Dactyle d'Espagne***
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 ***Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois***
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962 ***Orchis couleur de chair***
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 ***Orchis tacheté, Orchis maculé***
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 ***Dactylorhize de mai***
Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & Soca, 1995
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Damasonium polyspermum Coss., 1849 ***Étoile d'eau à nombreuses graines***
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 ***Danthonie, Sieglingie retombante***
Daphne alpina L., 1753 ***Daphné des Alpes***
Daphne gnidium L., 1753 ***Garou, Sain-Bois, Daphné Garou***
Daphne laureola L., 1753 ***Daphné lauréole, Laurier des bois***

Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy, 1901 ***Mosquitograss***
Datura stramonium L., 1753 ***Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale***
Datura wrightii Regel, 1859
Daucus aureus Desf., 1798 ***Carotte dorée***
Daucus carota L., 1753 ***Carotte sauvage, Daucus carotte***
Daucus carota subsp. carota L., 1753 ***Daucus carotte***
Daucus carota subsp. drepanensis (Arcang.) Heywood, 1968 ***Carotte de Trapani***
Daucus carota subsp. hispanicus (Gouan) Thell., 1926 ***Carotte d'Espagne***
Daucus carota subsp. maritimus (Lam.) Batt., 1889 ***Carotte maritime***
Daucus carota subsp. maximus (Desf.) Ball, 1878 ***Grande carotte, Carotte de Mauritanie***
Daucus muricatus (L.) L., 1762 ***Carotte épineuse***
EN Delphinium ajacis L., 1753 ***Dauphinelle des jardins***
Delphinium consolida L., 1753 ***Dauphinelle Consoude***
Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802 ***Dauphinelle fendue, Pied d'alouette fendu***
Delphinium halteratum Sm., 1809
Delphinium orientale J.Gay, 1840 ***Pied-d'alouette d'Espagne***
Delphinium pubescens DC., 1815 ***Pied-d'alouette pubescent***
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult., 1817 ***Canche à feuilles de jonc, Canche moyenne***
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891 ***Sisymbre sagesse, Descurainie Sagesse***
Dianthus balbisii Ser., 1824 ***Œillet de Balbis***
Dianthus godronianus Jord., 1855
Dianthus scaber Chaix, 1785 ***Œillet à poils rudes, Oeillet rude***
Dianthus siculus C.Presl, 1822
Diatelia tuberaria (L.) Demoly, 2011 ***Hélianthème ligneux***
Dichondra micrantha Urb., 1924 ***Dichondra, Asian Ponysfoot***
Dictamnus albus L., 1753 ***Fraxinelle blanche, Dictame blanc***
Digitalis lutea L., 1753 ***Digitale jaune***
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817 ***Digitaire glabre, Digitaire filiforme***
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 ***Digitaire sanguine, Digitaire commune***
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 ***Sceau de Notre Dame***
Diospyros kaki L.f., 1782 ***Plaqueminier du Japon, Figuier Caque***
Diospyros lotus L., 1753 ***Plaqueminier d'Europe, Plaqueminier d'Italie***
Diospyros virginiana L., 1753
Dipcadi serotinum (L.) Medik., 1790 ***Dipcadi tardif***
Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 ***Diplotaxe fausse-roquette, Roquette blanche***
Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821 ***Diplotaxe des murs, Roquette des murailles***
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 ***Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune***
Diplotaxis tenuisiliqua Delile, 1847
Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821 ***Diplotaxe des vignes, Diplotaxis flexible***
Dipsacus fullonum L., 1753 ***Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage***
Dipsacus sativus (L.) Honck., 1782 ***Cardère cultivée, Cardère à foulon***
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973 ***Inule fétide, Inule à forte odeur***
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 ***Inule visqueuse***
Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825
Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772
Dorycnium pentaphyllum subsp. gracile (Jord.) Rouy, 1899
Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum Scop., 1772
Dorycnium rectum (L.) Ser., 1825
Draba muralis L., 1753 ***Drave des murailles***
Draba verna L., 1753 ***Drave de printemps***
Dracocephalum parviflorum Nutt., 1818
Dracunculus vulgaris Schott, 1832 ***Petit dragon commun, Dragonne Serpentaire***
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 ***Fougère mâle***

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 ***Chénopode fausse Ambroisie***
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 ***Chénopode à grappes***
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 ***Chénopode multifide***
Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824 ***Concombre d'âne, Momordique, Concombre sauvage***
Echinaria capitata (L.) Desf., 1799 ***Échinaire à têtes***
Echinochloa colona (L.) Link, 1833 ***Panic colonisateur, Blé du Dekkan***
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 ***Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq***
Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle, 1840 ***Échinochloé un peu hispide***
Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger, 1934 ***Échinochloé Phyllopogon***
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch, 1891 ***Panic faux-riz, Échinochloé faux Riz***
Echinophora spinosa L., 1753 ***Échinophore épineuse***
Echinophora tenuifolia L.
Echinops ritro L., 1753 ***Échinops, Chardon bleu***
Echinops sphaerocephalus L., 1753 ***Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête***
Echium asperrimum Lam., 1792 ***Vipérine des Pyrénées***
Echium calycinum Viv., 1804 ***Vipérine à calice persistant***
Echium creticum L., 1753 ***Vipérine de Crète***
Echium italicum L., 1753 ***Vipérine d'Italie, Vipérine des Albères***
Echium plantagineum L., 1771 ***Vipérine à feuilles de plantain, Vipérine faux Plantain***
Echium vulgare L., 1753 ***Vipérine commune, Vipérine vulgaire***
Eclipta prostrata (L.) L., 1771 ***Éclipte blanche***
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 ***Jacinthe d'eau***
Elaeagnus angustifolia L., 1753 ***Olivier de bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradis***
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 ***Scirpe des marais***
Eleocharis palustris subsp. waltersii Bure? & Danihelka, 2008 ***Souchet commun***
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949 ***Scirpe pauciflore***
Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824 ***Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille***
Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788 ***Éleusine des Indes***
Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 ***Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall***
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973 ***Chiendent du littoral***
Elytrigia campestris subsp. campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986
Elytrigia elongata (Host) Nevski, 1936 ***Chiendent allongé***
Elytrigia intermedia (Host) Nevski, 1933 ***Chiendent intermédiaire***
Elytrigia juncea subsp. juncea (L.) Nevski, 1936 ***Chiendent à feuilles de Jonc***
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 ***Chiendent commun, Chiendent rampant***
Enarthrocarpus clavatus Delile ex Godron
Enarthrocarpus lyratus DC.
Ephedra altissima Desf., 1799 ***Éphèdre élevé, Éphédra élevé***
Ephedra distachya L., 1753 ***Éphèdre à chatons opposés, Éphèdre de Suisse, Raisin-de-mer***
Ephedra major Host, 1831 ***Éphèdre des monts Nébrodes, Grand Éphédra***
Epilobium angustifolium L., 1753 ***Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine***
Epilobium dodonaei subsp. dodonaei Vill., 1779 ***Épilobe Romarin***
Epilobium hirsutum L., 1753 ***Épilobe hérissé, Épilobe hirsute***
Epilobium montanum L., 1753 ***Épilobe des montagnes***
Epilobium parviflorum Schreb., 1771 ***Épilobe à petites fleurs***
Epilobium tetragonum L., 1753 ***Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles***
Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman, 1879 ***Épilobe de Lamy***
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum L., 1753 ***Épilobe à quatre angles***
Epilobium tetragonum subsp. tournefortii (Michalet) H.Lév., 1896 ***Épilobe de Tournefort***

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 ***Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helleborine rouge***
Epipactis distans Arv.-Touv., 1872 ***Épipactis à feuilles distantes, Épipactis à feuilles écartées***
Epipactis fageticola (C.E.Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers, 1999 ***Épipactis des hêtraies***
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 ***Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles***
Epipactis helleborine subsp. helleborine (L.) Crantz, 1769 ***Elléborine à larges feuilles***
Epipactis helleborine subsp. tremolsii (Pau) E.Klein, 1979 ***Épipactis de Tremols***
Epipactis leptochila subsp. provincialis (Aubenas & Robatsch) J.-M.Tison, 2010 ***Épipactis de Provence***
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 ***Épipactis à petites feuilles***
Epipactis muelleri Godfery, 1921 ***Épipactis de Müller***
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 ***Épipactis des marais***
Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch, 1994 ***Épipactis du Rhône***
Equisetum arvense L., 1753 ***Prêle des champs, Queue-de-renard***
Equisetum fluviatile L., 1753 ***Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières***
Equisetum palustre L., 1753 ***Prêle des marais***
Equisetum ramosissimum Desf., 1799 ***Prêle très rameuse, Prêle rameuse***
Equisetum telmateia Ehrh., 1783 ***Grande prêle***
Eragrostis barrelieri Daveau, 1894 ***Éragrostis de Barrelier, Éragrostide de Barrelier***
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907 ***Grand erogrostis, Éragrostide Amourette***
Eragrostis minor Host, 1809 ***Éragrostis faux-pâturin, Petit Éragrostis***
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841 ***Éragrostis en peigne, Éragrostide en peigne***
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812 ***Éragrostis poilu***
Eragrostis virescens J.Presl, 1830 ***Éragrostide verdissante***
Erica arborea L., 1753 ***Bruyère arborescente, Bruyère en arbre***
Erica multiflora L., 1753 ***Bruyère à fleurs nombreuses***
Erica scoparia L., 1753 ***Bruyère à balais***
Erigeron acris subsp. acris L., 1753 ***Érigeron âcre***
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 ***Vergerette annuelle, Érigéron annuel***
Erigeron blakei Cabrera, 1941 ***Vergerette de Blake***
Erigeron bonariensis L., 1753 ***Érigéron crépu***
Erigeron canadensis L., 1753 ***Conyze du Canada***
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865 ***Vergerette à fleurs nombreuses***
Erigeron karvinskianus DC., 1836 ***Vergerette de Karvinski***
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 ***Vergerette de Barcelone***
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., 1821 ***Ériobotrie du Japon, Bibassier, Néflier du Japon***
Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 ***Linaigrette à feuilles larges***
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell., 1928 ***Érodium acaule***
Erodium chium (L.) Willd., 1794 ***Bec-de-grue de Chios***
Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 ***Érodium Bec-de-cigogne***
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 ***Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire***
Erodium cicutarium subsp. bipinnatum (Cav.) Tourlet, 1907 ***Bec-de-grue poilu***
Erodium cicutarium subsp. cicutarium (L.) L'Hér., 1789 ***Cicutaire***
Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789 ***Érodium Fausse-Mauve, Érodium à feuilles de Mauve***
Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789 ***Bec de Cigogne musqué, Bec-de-grue musqué***
Eruca sativa Mill., 1768
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916 ***Érucastre de France***
Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916 ***Fausse Roquette à feuilles de Cresson***
Ervilia sativa Link, 1822 ***Ervilier***
Ervum gracile (Loisel.) DC., 1813 ***Vesce à fleurs lâches***
Ervum pubescens DC., 1813 ***Vesce pubescente***
Ervum tetraspermum L., 1753 ***Lentillon***
Eryngium campestre L., 1753 ***Chardon Roland, Panicaut champêtre***

Eryngium maritimum L., 1753 *Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,*
Erysimum cheiranthoides L., 1753 *Vélar fausse-giroflée, Fausse Giroflée*
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769 *Giroflée des murailles, Violier jaune*
Erysimum montosicola Jord., 1858 *Vélar du mont Saint-Nicolas*
Erysimum nevadense subsp. collisparsum (Jord.) P.W.Ball, 1990 *Vélar de Provence*
Erysimum repandum L., 1753 *Érysimum étalé*
Eschscholzia californica Cham., 1820 *Pavot de Californie, Eschscholzie de Californie*
Eucalyptus gunnii Hook.f., 1844
Euclidium syriacum (L.) R.Br., 1812
Euonymus europaeus L., 1753 *Bonnet-d'évêque*
Euonymus japonicus L.f., 1780 *Fusain du Japon*
Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768 *Fusain à feuilles larges*
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753
Euphorbia akenocarpa Guss., 1821
Euphorbia aleppica L., 1753 *Euphorbe d'Alep*
Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides L., 1753 *Herbe à la faux*
Euphorbia chamaesyce L., 1753 *Euphorbe petit-figuier, Monnoyère*
Euphorbia chamaesyce subsp. chamaesyce L., 1753
Euphorbia characias subsp. characias L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753 *Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès*
Euphorbia davidii Subils, 1984
Euphorbia dendroides L., 1753 *Euphorbe arborescente*
Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890
Euphorbia esula L., 1753 *Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre*
Euphorbia exigua L., 1753 *Euphorbe fluette*
Euphorbia exigua subsp. exigua L., 1753
Euphorbia falcata L., 1753 *Euphorbe en faux, Euphorbe à cornes en faucille*
Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma DC., 1813 *Euphorbe*
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 *Euphorbe verruqueuse*
● Euphorbia graminifolia Vill., 1786 *Euphorbe à feuilles de graminée*
Euphorbia helioscopia L., 1753 *Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues*
Euphorbia hirsuta L., 1759 *Euphorbe hirsute*
■ Euphorbia illirica Lam., 1788 *Euphorbe poilue*
Euphorbia lathyris L., 1753 *Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins*
Euphorbia linifolia L., 1759
Euphorbia maculata L., 1753 *Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée*
Euphorbia nicaeensis All., 1785 *Euphorbe de Nice*
Euphorbia palustris L., 1753 *Euphorbe des marais*
Euphorbia paralias L., 1753 *Euphorbe maritime, Euphorbe des sables*
■ ● Euphorbia peplis L., 1753 *Euphorbe péplis*
Euphorbia peplus L., 1753 *Euphorbe omblette, Essule ronde*
Euphorbia pithyusa L., 1753 *Euphorbe des Baléares*
Euphorbia platyphyllos L., 1753 *Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates*
Euphorbia prostrata Aiton, 1789 *Euphorbe prostrée*
Euphorbia segetalis subsp. segetalis L., 1753
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana Neck., 1770 *Euphorbe de Séguier*
Euphorbia serpens Kunth, 1817 *Euphorbe rampante*
Euphorbia serrata L., 1753 *Euphorbe dentée*
Euphorbia spinosa L., 1753 *Euphorbe épineuse*
Euphorbia stricta L., 1759 *Euphorbe raide*
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel., 1828 *Euphorbe sillonée*
Euphorbia taurinensis All., 1785 *Euphorbe de Turin*
Euphorbia terracina L., 1762 *Euphorbe de Terracine*
Euphrasia pectinata Ten., 1815 *Euphrasia pectinée, Euphraise à feuilles en peigne*
Euphrasia salisburgensis Funck, 1794 *Euphraise de Salzbourg*

Fagopyrum esculentum Moench, 1794 *Sarrasin commun*
Fagus sylvatica L., 1753 *Hêtre, Hêtre commun, Fouteau*
Falcaria vulgaris Bernh., 1800 *Falcaire de Rivin*
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971 *Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée*
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 *Renouée liseron, Faux-liseron*
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971 *Renouée des haies, Vrillée des buissons*
Ferula communis subsp. communis L., 1753 *Pamelier*
Ferula glauca L., 1753 *Férule glauque*
Festuca cinerea Vill., 1786 *Fétuque cendrée*
Festuca heterophylla Lam., 1779 *Fétuque hétérophylle*
Festuca inops De Not., 1844 *Fétuque grêle*
Festuca marginata subsp. marginata (Hack.) K.Richt., 1890 *Fétuque de Timbal-Lagrâve*
Festuca rubra L., 1753 *Fétuque rouge*
Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 *Fétuque rouge*
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890 *Fétuque à feuilles capillaires*
Ficaria verna Huds., 1762 *Ficaire à bulbilles*
Ficaria verna subsp. grandiflora (Robert) Hayek, 1924
Ficus carica L., 1753 *Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier*
Filago germanica L., 1763 *Immortelle d'Allemagne*
Filago lutescens Jord., 1846 *Cotonnière jaunâtre, Cotonnière jaunissante*
Filago pygmaea L., 1753 *Évax pygmée*
Filago pyramidata L., 1753 *Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées*
Filipendula vulgaris Moench, 1794 *Filipendule vulgaire, Spirée filipendule*
Foeniculum vulgare Mill., 1768 *Fenouil commun*
Foeniculum vulgare subsp. piperitum (Ucria) Bég., 1907 *Fenouil poivré*
Foeniculum vulgare subsp. vulgare Mill., 1768 *Fenouil*
Fragaria vesca L., 1753 *Fraisier sauvage, Fraisier des bois*
Fragaria viridis Weston, 1771 *Fraisier vert*
Frangula alnus Mill., 1768 *Bourgène*
Frankenia hirsuta L., 1753 *Frankénie hirsute*
Frankenia laevis L., 1753 *Frankénie lisse*
Frankenia pulverulenta L., 1753 *Frankénie annuelle*
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 *Frêne à feuilles étroites*
Fraxinus excelsior L., 1753 *Frêne élevé, Frêne commun*
Fraxinus ornus L., 1753 *Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe*
Freesia alba (G.L.Mey.) GumbL., 1896
Fritillaria involucrata All., 1789 *Fritillaire à involucre*
Fumana ericifolia Wallr., 1840 *Hélianthème de Spach*
Fumana laevipes (L.) Spach, 1836 *Hélianthème à feuilles étroites*
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 *Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain*
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, 1838 *Fumana à feuilles de thym, Hélianthème à feuilles de thym*
Fumana viridis (Ten.) Font Quer *Hélianthème lisse*
Fumaria bastardii Boreau, 1847 *Fumeterre de Bastard*
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra, 1897 *Fumeterre bicolore*
Fumaria capreolata L., 1753 *Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée*
■ Fumaria densiflora DC., 1813 *Fumeterre à fleurs serrées*
Fumaria flabellata Gasp., 1842 *Fumeterre en éventail*
Fumaria gaillardotii Boiss., 1867
Fumaria kralikii Jord., 1848 *Fumeterre de Kralik*
Fumaria munbyi Boiss. & Reut.
Fumaria officinalis L., 1753 *Fumeterre officinale, Herbe à la veuve*
Fumaria parviflora Lam., 1788 *Fumeterre à petites fleurs*
Fumaria petteri subsp. calcarata (Cadevall) Lidén & A.Soler, 1984 *Fumeterre éperonné, Fumeterre à éperon*
Fumaria petteri subsp. petteri Rchb., 1839

Fumaria vaillantii Loisel., 1809 *Fumeterre de Vaillant*
Gagea apulica Peruzzi & J.-M.Tison *Gagée des Pouilles*
● Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829 *Gagée de Bohème, Gagée fistuleuse*
Gagea lacaitae A.Terracc., 1904
■ ■ Gagea luberonensis J.-M.Tison, 1998 *Gagée du Lubéron*
Gagea lusitanica A.Terracc., 1904
● Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827 *Gagée des prés, Gagée à pétales étroits*
● Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 *Gagée des champs*
Galactites tomentosus Moench, 1794 *Chardon laiteux*
■ Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 *Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin*
Galatella sedifolia subsp. sedifolia (L.) Greuter, 2003 *Aster âcre*
Galega officinalis L., 1753 *Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre*
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804 *Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde*
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798 *Galinsoga cilié*
Galium album Mill., 1768 *Gaillet dressé*
Galium aparine L., 1753 *Gaillet gratteron, Herbe collante*
Galium aparine subsp. aparine L., 1753
Galium aparine subsp. aparinella (Lange) Jauzein, 1995
Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm., 1846
Galium aparine subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Cout., 1939
Galium cinereum All., 1773 *Gaillet cendré*
Galium corrudifolium Vill., 1779 *Gaillet à feuilles d'Asperge*
Galium debile Desv., 1818 *Gaillet faible, Gaillet chétif*
Galium divaricatum Pourr. ex Lam., 1788 *Gaillet divariqué*
Galium elongatum C.Presl, 1822 *Gaillet allongé*
Galium glaucum L., 1753 *Gaillet glauque*
Galium lucidum All., 1773 *Gaillet à feuilles luisantes, Gaillet luisant*
Galium mollugo L., 1753 *Gaillet commun, Gaillet Mollugine*
Galium murale (L.) All., 1785 *Gaillet des murs*
Galium obliquum Vill., 1785 *Gaillet oblique*
Galium palustre L., 1753 *Gaillet des marais*
Galium parisiense L., 1753 *Gaillet de Paris*
Galium pumilum Murray, 1770 *Gaillet rude*
Galium pusillum L., 1753 *Gaillet à aspect de mousse*
■ Galium rubioides L., 1753 *Gaillet fausse garance*
Galium setaceum Lam., 1788 *Gaillet sétacé*
Galium timeroyi Jord., 1846 *Gaillet de Timéroy, Gaillet de Jordan*
Galium tricornutum Dandy, 1957 *Gaillet à trois cornes*
Galium verrucosum Huds., 1767 *Gaillet à verrues, Gaillet anisé*
Galium verticillatum Danthoine ex Lam., 1788 *Gaillet verticillé*
Galium verum L., 1753 *Gaillet jaune, Caille-lait jaune*
Galium verum subsp. verum L., 1753 *Caille-lait jaune*
Galium verum subsp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny, 1885 *Gaillet de Wirtgen*
Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C.E.Hubb., 1955
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 1913 *Gastridie*
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 *Gaudinie fragile*
Gazania rigens (L.) Gaertn., 1791 *Gazania, Gazanie*
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805 *Genêt cendré*
Genista hispanica subsp. hispanica L., 1753 *Petit Genêt d'Espagne*
Genista lobelii DC., 1805 *Genêt de Lobel*
Genista pilosa subsp. pilosa L., 1753 *Genette*
Genista provincialis Coulot, Rabaute & Rebuffel
Genista scorpius (L.) DC., 1805 *Épine-fleurie, Genêt scorpion, Genêt épineux*
Genista tinctoria L., 1753 *Genêt des teinturiers, Petit Genêt*
Gentiana pneumonanthe L., 1753 *Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe*
Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 *Gentiane ciliée*

Geranium columbinum L., 1753 *Géranium des colombes, Pied de pigeon*
Geranium dissectum L., 1755 *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées*
Geranium lucidum L., 1753 *Géranium luisant*
Geranium molle L., 1753 *Géranium à feuilles molles*
Geranium purpureum Vill., 1786 *Géranium pourpre*
Geranium pusillum L., 1759 *Géranium fluet, Géranium à tiges grêles*
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 *Géranium des Pyrénées*
Geranium robertianum L., 1753 *Herbe à Robert*
Geranium rotundifolium L., 1753 *Géranium à feuilles rondes, Mauvette*
Geranium sanguineum L., 1753 *Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,*
Geranium tuberosum L., 1753 *Géranium tubéreux*
■ ■ Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., 1844 *Salsifis hybride, Salsifis intermédiaire*
Geum sylvaticum Pourr., 1788 *Benoîte des bois*
Geum urbanum L., 1753 *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît*
Ginkgo biloba L., 1771 *Ginkgo, Arbre aux quarante écus*
● Gladiolus dubius Guss., 1832 *Glaïeul douteux*
Gladiolus italicus Mill., 1768 *Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie*
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 *Glaucienne à fruit en forme de corne, Pavot cornu, Glaucienne en cornet, Glaucienne corniculée*
Glaucium flavum Crantz, 1763 *Glaucière jaune, Pavot jaune des sables*
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach, 1841 *Chrysanthème des jardins*
Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 *Chrysanthème des moissons, Chrysanthème des blés*
Glechoma hederacea L., 1753 *Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre*
Gleditsia triacanthos L., 1753 *Févier d'Amérique*
Globularia alypum L., 1753 *Turbith*
Globularia bisnagarica L., 1753 *Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée*
Globularia cordifolia L., 1753 *Globulaire à feuilles cordées, Veuve-céleste*
Globularia repens Lam., 1779 *Globulaire rampante*
Globularia vulgaris L., 1753 *Globulaire commune*
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 *Glycérie flottante, Manne de Pologne*
Glyceria notata Chevall., 1827 *Glycérie pliée*
Glycyrrhiza glabra L., 1753 *Réglisse sauvage, Réglisse glabre*
Gomphocarpus fruticosus (L.) R.Br., 1809 *Gonphocarpe*
● Gratiola officinalis L., 1753 *Gratiole officinale, Herbe au pauvre homme*
Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869 *Potamot dense, Groenlandia serré*
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 *Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique*
Gypsophila elegans M.Bieb., 1808 *Gypsophile élégante*
Gypsophila paniculata L., 1753 *Gypsophile en panicule, Gypsophile paniculée*
Gypsophila pilosa Huds., 1767
Gypsophila repens L., 1753 *Gypsophile rampante*
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967 *Lepture cylindrique*
Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938 *Obione faux pourpier, Obione Pourpier*
Haplophyllum buxbaumii (Poir.) G.Don, 1831
Haplophyllum linifolium (L.) G.Don, 1831
Haplophyllum villosum (M.Bieb.) G.Don
Hedera algeriensis Hibberd, 1864
Hedera helix L., 1753 *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean*
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795 *Hedypnois faux rhagadiole, Bonne-nuit-les-petits, Hédipnois de Crète*
■ Hedysarum spinosissimum L., 1753 *Sainfoin épineux, Sainfoin très épineux*
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 *Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium*
Helianthemum hirtum (L.) Mill., 1768 *Hélianthème hérissé*
Helianthemum italicum (L.) Pers., 1806 *Hélianthème d'Italie*
■ Helianthemum ledifolium (L.) Mill., 1768 *Hélianthème à feuilles de lédum*
● Helianthemum marifolium Mill., 1768 *Hélianthème à feuilles de Marum*
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 *Hélianthème jaune, Hélianthème commun*

Helianthemum salicifolium (L.) Mill., 1768 *Hélianthème à feuilles de saule*
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.Cours., 1802 *Hélianthème à feuilles de lavande*
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., 1806 *Hélianthème poilu*
Helianthus annuus L., 1753 *Tournesol, Grand-soleil, Graines-à-perroquets*
Helianthus tuberosus L., 1753 *Topinambour, Patate de Virginie*
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 *Immortelle des dunes, Immortelle jaune*
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco, 2011 *Avoine Brome*
Helictochloa pratensis subsp. pratensis (L.) Romero Zarco, 2011 *Avoine des prés*
Heliotropium curassavicum L., 1753 *Héliotrope de Curaçao*
Heliotropium europaeum L., 1753 *Héliotrope d'Europe*
Heliotropium villosum Willd.
Helleborus foetidus L., 1753 *Hellébore fétide, Pied-de-griffon*
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 *Picride fausse Vipérine*
Heloscíadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 *Ache nodiflore*
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., 1753 *Grande Berce*
Herniaria cinerea DC., 1815 *Herniaire cendrée*
Herniaria glabra L., 1753 *Herniaire glabre, Herniole*
Herniaria hirsuta L., 1753 *Herniaire velue*
Herniaria incana Lam., 1789 *Herniaire blanchâtre*
Hesperis laciniata All., 1785 *Julienne à feuilles laciniées*
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav., 1798 *Hétéranthère réniforme*
Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb., 1866
Hibiscus syriacus L., 1753 *Hibiscus*
Hibiscus trionum L., 1753 *Hibiscus, Fleur-d'une-heure*
Hieracium amplexicaule L., 1753 *Épervière amplexicaule*
Hieracium cinerascens Jord., 1849 *Épervière précoce, Épervière cendrée*
Hieracium humile Jacq., 1777 *Épervière peu élevée*
Hieracium jaubertianum Timb.-Lagr. & Loret, 1858 *Épervière*
Hieracium liotardii Vill., 1779 *Épervière de Liottard*
Hieracium murorum L., 1753 *Épervière des murs*
Hieracium taurinense Jord., 1849 *Épervière*
Hieracium umbellatum L., 1753 *Épervière en ombelle, Accipitrine*
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 *Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc*
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999 *Orchis géant, Orchis à longues bractées, Barlie*
Hippocrepis biflora Spreng., 1815 *Hippocrépide à deux fleurs*
Hippocrepis ciliata Willd., 1808 *Fer à cheval cilié, Hippocrépis ciliée*
Hippocrepis comosa L., 1753 *Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval*
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 *Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau*
Hippocrepis scorpioides Benth., 1826 *Hippocrépide Queue-de-scorpion*
Hippophae rhamnoides L., 1753 *Argousier, Saule épineux*
Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis Soest, 1952 *Argousier des fleuves*
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 *Hirschfeldie grisâtre, Roquette bâtarde*
Holcus lanatus L., 1753 *Houlque laineuse, Blanchard*
Holosteum umbellatum L., 1753 *Holostée en ombelle*
Honorius nutans (Sm.) Gray, 1821 *Ornithogale penché*
Hordeum bulbosum subsp. bulbosum L., 1756
Hordeum geniculatum All., 1785 *Orge genouillée*
Hordeum jubatum L., 1753 *Orge à crinière, Orge barbue*
Hordeum marinum Huds., 1778 *Orge maritime, Orge marine*
Hordeum murinum L., 1753 *Orge sauvage, Orge Queue-de-rat*
Hordeum murinum subsp. glaucum (Steud.) Tzvelev, 1972 *Orge glauque*
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang., 1882 *Orge des lièvres*
Hordeum secalinum Schreb., 1771 *Orge faux seigle*
Hordeum vulgare L., 1753 *Orge carrée, Orge à quatre rangs*
Hordeum vulgare subsp. distichon (L.) Körn., 1882 *Orge à deux rangs*
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 *Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres*
Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846
Humulus lupulus L., 1753 *Houblon grimpant*
Hyacinthus orientalis L., 1753 *Jacinthe, Muguet bleu*
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753 *Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide*
Hydrocotyle vulgaris L., 1753 *Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons*
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977 *Herbe de saint Jean*
Hyoscyamus albus L., 1753 *Jusquiame blanche*
Hyoscyamus niger L., 1753 *Jusquiame noire*
Hyoseris radiata L., 1753 *Chicorée*
Hyoseris scabra L., 1753 *Chicorée scabre, Hyoséris scabre*
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, 1919 *Thatching Grass*
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex G.López, 1994
Hypecoum imberbe Sm., 1806 *Cumin à grandes fleurs*
EN Hypecoum pendulum L., 1753 *Cumin pendant*
Hypecoum procumbens L., 1753 *Cumin couché*
Hypericum androsaemum L., 1753 *Millepertuis Androsème*
Hypericum calycinum L., 1767 *Millepertuis calycinal*
Hypericum hyssopifolium Chaix, 1785 *Millepertuis à feuilles d'Hysope*
Hypericum montanum L., 1755 *Millepertuis des montagnes*
Hypericum perforatum L., 1753 *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean*
Hypericum tetrapterum Fr., 1823 *Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles*
Hypericum tomentosum L., 1753 *Millepertuis tomenteux*
Hypericum triquetrifolium Turra, 1765 *Millepertuis*
Hypochaeris achyrophorus L., 1753 *Porcelle à soies courtes*
Hypochaeris glabra L., 1753 *Porcelle glabre, Porcelle des sables*
Hypochaeris maculata L., 1753 *Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée*
Hypochaeris radicata L., 1753 *Porcelle enracinée*
Hyssopus officinalis subsp. canescens (DC.) Nyman, 1881
Iberis amara L., 1753 *Ibéris amer*
Iberis ciliata All., 1789 *Iberis cilié, Ibéris à feuilles ciliées*
Iberis linifolia subsp. linifolia L., 1759 *Ibéris de Prost*
Iberis pinnata L., 1755 *Ibéris à feuilles pennatifides*
Iberis saxatilis L., 1756 *Ibéris des rochers, Ibéris saxatile*
Ilex aquifolium L., 1753 *Houx*
Impatiens balfouri Hook.f., 1903 *Impatience de Balfour, Impatiente des jardins*
Impatiens parviflora DC., 1824 *Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs*
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv., 1812
Inula bifrons (L.) L., 1763 *Inule variable*
Inula britannica L., 1753 *Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande-Bretagne*
Inula conyza DC., 1836 *Inule conyze, Inule squarreuse*
EN Inula helenioides DC., 1815 *Inule faux-hélénium, Inule fausse-aunée*
Inula helvetica Weber, 1784 *Inule de Vaillant, Inule de Suisse*
Inula montana L., 1753 *Inule des montagnes*
Inula salicina L., 1753 *Inule à feuilles de saule*
Inula spiraeifolia L., 1759 *Inule à feuilles de spirée*
Ionopsidium glastifolium (L.) M.Koch, 2012 *Cranson à feuilles de Pastel*
Ipomoea indica (Burm.) Merr., 1917 *Ipomée des Indes, Ipomée d'Inde*
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787 *Ipomée pourpre, Liseron pourpre*
Iris albicans Lange, 1860 *Iris blanc, Iris blanchissant*
Iris foetidissima L., 1753 *Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant*
Iris germanica L., 1753 *Iris d'Allemagne*
Iris lutescens Lam., 1789 *Iris jaunâtre*
Iris orientalis Mill., 1768
Iris pallida Lam., 1789 *Iris pâle*
Iris pseudacorus L., 1753 *Iris faux acore, Iris des marais*
Iris reichenbachiana Klatt, 1866 *Iris maritime*
Iris tuberosa L., 1753 *Iris tubéreux*
Iris unguicularis Poir., 1789 *Iris d'Algérie*
Isatis tinctoria L., 1753 *Pastel des teinturiers, Herbe de saint Philippe*
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., 1817 *Souchet penché*
Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810 *Scirpe sétacé, Isolépis sétacé*
Iva xanthiifolia Nutt., 1818 *Ive à feuilles de Lampourde*
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 *Séneçon aquatique*
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868 *Séneçon à feuilles de Barbarée*
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 *Séneçon à feuilles de Roquette*
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005 *Séneçon Cinéraire*
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 *Herbe de saint Jacques*
Jasione montana L., 1753 *Jasione des montagnes, Herbe à midi*
Jasminum fruticans L., 1753 *Jasmin jaune, Jasmin d'été*
Juglans nigra L., 1753 *Noyer noir*
Juglans regia L., 1753 *Noyer commun, Calottier*
Juncus acutus L., 1753 *Jonc aigu, Jonc à tépales pointus*
Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater (Schreb.) O.Schwarz, 1949
Juncus anceps Laharpe, 1827 *Jonc à deux faces, Jonc aplati, Jonc à deux tranchants*
Juncus articulatus L., 1753 *Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants*
Juncus bufonius L., 1753 *Jonc des crapauds*
Juncus compressus Jacq., 1762 *Jonc à tiges comprimées*
Juncus conglomeratus L., 1753 *Jonc aggloméré*
Juncus effusus L., 1753 *Jonc épars, Jonc diffus*
EN Juncus fontanesii J.Gay, 1827 *Jonc de Desfontaines*
Juncus gerardi Loisel., 1809 *Jonc de Gérard*
Juncus hybridus Brot., 1804 *Jonc hybride*
Juncus inflexus L., 1753 *Jonc glauque*
Juncus littoralis C.A.Mey., 1831 *Jonc du littoral, Jonc des grèves, Jonc littoral*
Juncus maritimus Lam., 1794 *Jonc maritime*
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799 *Jonc nain*
Juncus ranarius Songeon & Perrier, 1860 *Jonc ambigu*
Juncus sphaerocarpus Nees, 1818 *Jonc à fruits globuleux*
Juncus striatus Schousb. ex E.Mey., 1822 *Jonc strié*
Juncus subnodulosus Schrank, 1789 *Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses*
Juncus subulatus Forssk., 1775 *Jonc*
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 *Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais*
Juniperus communis L., 1753 *Genévrier commun, Peteron*
Juniperus communis subsp. communis L., 1753 *Genévrier commun, Peteron*
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L., 1753 *Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant*
Juniperus phoenicea L., 1753 *Genevrier de phoenicie, Lycien*
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea L., 1753 *Genevrier de phoenicie, Lycien*
Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Arcang., 1882 *Genévrier*
Jurinea humilis (Desf.) DC., 1838 *Jurinée naine, Serratule naine*
Kali tragus (L.) Scop., 1771 *Soude-bouc*
Katapsuxis silaifolia (Jacq.) Raf., 1840 *Sélin à feuilles de silaus, Cnide fausse Ache*
Kengia serotina (L.) Packer, 1960 *Cleistogène tardif*
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897 *Linaire grecque, Linaire changée*
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 *Linaire élatine*
Kickxia elatine subsp. crinita (Mabille) Greuter, 1967 *Linaire de Sieber*
Kickxia elatine subsp. elatine (L.) Dumort., 1827 *Kickxia Élatine*
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz., 1913
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827 *Linaire bâtarde, Velvote, Kickxia bâtarde*
Kickxia spuria subsp. integrifolia (Brot.) R.Fern., 1971
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. *Serratule à tige nue*
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 *Knautie des champs, Oreille-d'âne*
Knautia collina Jord., 1848 *Knautie pourpre*
Knautia integrifolia (L.) Bertol., 1836 *Knautie à feuilles entières*
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 *Koelérie pyramidale*
Koeleria vallesiana subsp. vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 *Koelérie du Valais*
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Krubera peregrina (L.) Hoffm., 1814 *Ombrellini*
Kundmannia sicula (L.) DC., 1830 *Kundmannie de Sicile*
Laburnum anagyroides Medik., 1787 *Faux-ébénier, Cytise, Aubour*
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 *Pendrille*
Lactuca perennis L., 1753 *Laitue vivace, Lâche*
Lactuca ramosissima (All.) Gren. & Godr., 1850 *Laitue très ramifiée*
Lactuca saligna L., 1753 *Laitue à feuilles de saule*
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756 *Laitue scariole, Escarole*
Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier, 1923
Lactuca virosa L., 1753 *Laitue vireuse, Laitue sauvage*
Lagoecia cuminoides L., 1753 *Lagoecia*
Lagurus ovatus L., 1753 *Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet*
Lallemantia iberica (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey., 1840
Lamarckia aurea (L.) Moench, 1794 *Lamarckie*
Lamium album L., 1753 *Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte*
Lamium amplexicaule L., 1753 *Lamier amplexicaule*
Lamium garganicum subsp. garganicum L., 1763 *Lamier à grandes fleurs*
Lamium hybridum Vill., 1786 *Lamier hybride*
Lamium maculatum (L.) L., 1763 *Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées*
Lamium purpureum L., 1753 *Lamier pourpre, Ortie rouge*
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994 *Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre*
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827 *Bardanette faux Myosotis*
Lapsana communis subsp. communis L., 1753 *Lampsane commune*
Laserpitium gallicum L., 1753 *Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant*
Laserpitium siler L., 1753 *Laser siler, Sermontain*
Lathyrus angulatus L., 1753 *Gesse anguleuse*
Lathyrus annuus L., 1753 *Gesse annuelle*
Lathyrus aphaca L., 1753 *Gesse aphylle, Gesse sans feuilles*
Lathyrus cicera L., 1753 *Gessette, Jarosse*
Lathyrus clymenum L., 1753 *Gesse climène*
Lathyrus filiformis (Lam.) J.Gay, 1857 *Gesse de Bauhin, Gesse filiforme*
Lathyrus hirsutus L., 1753 *Gesse hérissée, Gesse hirsute*
Lathyrus inconspicuus L., 1753 *Gesse à petites fleurs*
Lathyrus incurvus (Roth) Willd., 1802
Lathyrus latifolius L., 1753 *Gesse à larges feuilles, Pois vivace*
Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800 *Gesse noire, Orobe noir*
Lathyrus nissolia L., 1753 *Gesse sans vrille, Gesse de Nissole*
Lathyrus ochrus (L.) DC., 1805 *Gesse ochre, Moret d'Espagne*
Lathyrus odoratus L., 1753 *Pois de senteur, Gesse odorante*
Lathyrus pratensis L., 1753 *Gesse des prés*
Lathyrus sativus L., 1753 *Gesse cultivée, Pois carré, Lentille d'Espagne*
Lathyrus setifolius L., 1753 *Gesse à feuilles fines, Gesse à feuilles petites*
Lathyrus sphaericus Retz., 1783 *Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes*
Lathyrus tuberosus L., 1753 *Macusson, Gland-de-terre*
Laurus nobilis L., 1753 *Laurier-sauce*
Lavandula angustifolia subsp. angustifolia Mill., 1768 *Lavande officinale*
Lavandula dentata L., 1753
Lavandula latifolia Medik., 1784 *Lavande à larges feuilles, Spic*

Lavandula stoechas L., 1753 ***Lavande papillon, Lavande Stéchade***
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 ***Léersie faux Riz***
Legousia falcata subsp. falcata (Ten.) Fritsch, 1907
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800 ***Spéculaire miroir de Vénus, Miroir de Vénus hybride, Spéculaire hybride, Petite Spéculaire***
Legousia pentagonia (L.) Druce, 1908 ***Spéculaire pentagonale, Légousie pentagonale***
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 ***Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette***
Lemna gibba L., 1753 ***Lentille d'eau bossue, Canillée***
Lemna minor L., 1753 ***Petite lentille d'eau***
Lemna minuta Kunth, 1816 ***Lentille d'eau minuscule***
Lemna trisulca L., 1753 ***Lentille d'eau à trois sillons***
Lens culinaris Medik., 1797
Lens lamottei Czefr., 1971
Lens nigricans (M.Bieb.) Godr., 1843
Leontice leontopetalum L., 1753
Leontodon crispus Vill., 1779 ***Liondent crépu, Liondent à feuilles crépues***
Leontodon hirtus L., 1759 ***Liondent de Villars***
Leontodon hispidus subsp. hispidus L., 1753 ***Liondent hispide***
Leontodon saxatilis Lam., 1779 ***Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers***
Leontodon saxatilis subsp. rothii Maire
Leontodon saxatilis subsp. saxatilis Lam., 1779
Leontodon tuberosus L., 1753 ***Liondent tubéreux, Léontodon tubéreux***
Leonurus cardiaca L., 1753 ***Agripaume cardiaque, Queue-de-lion***
Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 ***Passerage champêtre, Passerage des champs***
Lepidium didymum L., 1767 ***Corne-de-cerf didyme***
Lepidium draba L., 1753 ***Passerage drave , Pain-blanc***
Lepidium graminifolium L., 1759 ***Passerage à feuilles de graminée***
Lepidium hirtum subsp. hirtum (L.) Sm., 1818
Lepidium hirtum subsp. nebrodense (Raf.) Thell., 1906
Lepidium latifolium L., 1753 ***Passerage à feuilles larges, Grande Passerage***
Lepidium perfoliatum L., 1753 ***Passerage perfoliée***
Lepidium ruderale L., 1753 ***Passerage des décombres, Passerage rudérale***
Lepidium sativum L., 1753 ***Passerage cultivée, Cresson alénois***
Lepidium squamatum Forssk., 1775 ***Corne-de-cerf écailleuse , Sénebière Corne-de-cerf***
Lepidium virginicum L., 1753 ***Passerage de Virginie***
Leucanthemum burnatii Briq. & Cavill., 1916 ***Marguerite de Burnat, Chrysanthème de Burnat***
Leucanthemum ircutianum subsp. ircutianum DC., 1838
Leucanthemum pallens (J.Gay ex Perreym.) DC., 1838 ***Marguerite pâle***
Leucojum aestivum L., 1759 ***Nivéole d'été***
Leucojum pulchellum Salisb., 1807 ***Nivéole jolie***
Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810 ***Troène luisant***
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844 ***Troène du Japon, Troène à feuilles ovales***
Ligustrum vulgare L., 1753 ***Troëne, Raisin de chien***
Lilium candidum L., 1753 ***Lis blanc***
Lilium martagon L., 1753 ***Lis martagon, Lis de Catherine***
Limbarda crithmoides subsp. longifolia (Arcang.) Greuter, 2003 ***Inule de la Méditerranée***
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 ***Limodore avorté, Limodore sans feuille***
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss., 1848 ***Grand statice, Limoniastrum monopétale, Limoniastre***
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort., 1827 ***Statice à feuilles de pâquerette***
Limonium cordatum (L.) Mill., 1768 ***Statice à feuilles cordées, Statice cordée***
Limonium cuspidatum (Delort) Erben, 1978 ***Statice de Provence, Limonium de Provence, Statice en pointe***
Limonium duriusculum (Girard) Fourr., 1869 ***Statice dure, Limonium dur***
Limonium echioides (L.) Mill., 1768 ***Statice fausse vipérine***
Limonium girardianum (Guss.) Fourr., 1869 ***Statice de Girard, Saladelle de Girard***
Limonium narbonense Mill., 1768 ***Statice de Narbonne, Saladelle de Narbonne***
Limonium pseudominutum Erben, 1988 ***Statice nain, Saladelle naine***
Limonium sinuatum (L.) Mill., 1768
Limonium virgatum (Willd.) Fourr., 1869 ***Statice raide, Limonium en baguette***
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás, 1900 ***Linaire à feuilles étroites, Linaire d'Italie***
Linaria arvensis (L.) Desf., 1799 ***Linaire des champs***
Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768 ***Linaire de Pélissier***
Linaria repens (L.) Mill., 1768 ***Linaire rampante***
Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 ***Linaire simple***
Linaria supina (L.) Chaz., 1790 ***Linaire couchée***
Linaria triphylla (L.) Mill., 1768 ***Linaire à feuilles par trois***
Linaria vulgaris Mill., 1768 ***Linaire commune***
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935 ***Lindernie fausse-gratiole, Fausse Gratiole***
Linum austriacum L., 1753 ***Lin d'Autriche***
Linum campanulatum L., 1753 ***Lin campanulé***
Linum catharticum L., 1753 ***Lin purgatif***
Linum maritimum L., 1753 ***Lin maritime***
Linum narbonense L., 1753 ***Lin de Narbonne***
Linum nodiflorum L., 1753 ***Lin à fleurs nodales***
Linum strictum L., 1753 ***Lin raide, Lin droit***
Linum strictum subsp. strictum L., 1753
Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart., 1978 ***Lin à feuilles de Salsola***
Linum tenuifolium L., 1753 ***Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles***
Linum trigynum L., 1753 ***Lin de France***
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912 ***Lin bisannuel***
Linum usitatissimum subsp. usitatissimum L., 1753
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 ***Limoine***
Lithodora fruticosa (L.) Griseb., 1844 ***Grémil ligneux***
Lithospermum officinale L., 1753 ***Grémil officinal, Herbe aux perles***
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 ***Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs***
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815 ***Lobulaire maritime, Alysse maritime***
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 1843 ***Cotonnière de France***
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 ***Cotonnière naine, Gnaphale nain***
Lolium multiflorum Lam., 1779 ***Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie***
Lolium perenne L., 1753 ***Ivraie vivace***
Lolium rigidum Gaudin, 1811 ***Ivraie à épis serrés, Ivraie à épi serré***
Lolium rigidum subsp. rigidum Gaudin, 1811 ***Ivraie à épi serré***
Lolium temulentum L., 1753 ***Ivraie enivrante, Ray-grass commun, Ray-grass anglais***
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet, 1985 ***Lomelosie à feuilles de graminée, Scabieuse à feuilles de Graminée***
Lomelosia simplex (Desf.) Raf., 1838 ***Scabieuse simple***
Lomelosia stellata (L.) Raf., 1838 ***Scabieuse étoilée***
Loncomelos narbonense (L.) Raf., 1840 ***Ornithogale de Narbonne***
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 ***Ornithogale des Pyrénées***
Lonicera caprifolium L., 1753 ***Chèvrefeuille des jardins***
Lonicera etrusca Santi, 1795 ***Chèvrefeuille de Toscane***
Lonicera implexa Aiton, 1789 ***Chèvrefeuille des Baléares***
Lonicera japonica Thunb., 1784 ***Chèvrefeuille du Japon***
Lonicera xylosteum L., 1753 ***Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies***
Lotus corniculatus L., 1753 ***Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée***
Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753 ***Sabot-de-la-mariée***
Lotus corniculatus subsp. delortii (F.W.Schultz) Nyman, 1878 ***Lotier de Delort***
Lotus corniculatus subsp. preslii (Ten.) P.Fourn., 1936 ***Lotier de Presl***
Lotus cytisoides L., 1753 ***Lotier faux cytise***
Lotus edulis L., 1753 ***Lotus doux, Lotier comestible***
Lotus glaber Mill., 1768 ***Lotier à feuilles ténues***
Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805 ***Lotier hispide***
Lotus maritimus L., 1753 ***Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime***
Lotus ornithopodioides L., 1753 ***Lotier faux pied d'oiseau, Lotier Pied-d'oiseau***
Lotus pedunculatus Cav., 1793 ***Lotus des marais, Lotier des marais***
Lotus tetragonolobus L., 1753 ***Lotier pourpre, Lotier rouge***
Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000
Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, 1964
Lunaria annua L., 1753 ***Monnaie-du-Pape, Lunaire annuelle***
Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 ***Luzule de Forster***
Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) K.Richt., 1890 ***Luzule de Sieber***
Lychnis flos-cuculi L., 1753 ***Oeil-de-perdrix***
Lycium barbarum L., 1753 ***Lyciet commun***
Lycium chinense Mill., 1768 ***Lyciet de Chine***
Lycium europaeum L., 1753 ***Lyciet d'Europe***
Lycopsis arvensis L., 1753 ***Lycopside des champs***
Lycopus europaeus L., 1753 ***Lycope d'Europe, Chanvre d'eau***
Lygeum spartum L., 1754
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 ***Mouron rouge, Fausse Morgeline***
Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 ***Fausse Morgeline***
Lysimachia arvensis subsp. latifolia (L.) Peruzzi, 2010 ***Mouron à feuilles larges***
Lysimachia arvensis subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Peruzzi, 2010 ***Mouron à petites fleurs***
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 ***Mouron bleu***
Lysimachia linum-stellatum L., 1753 ***Astérolinon***
Lysimachia nummularia L., 1753 ***Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus***
Lysimachia tenella L., 1753 ***Mouron délicat***
Lysimachia vulgaris L., 1753 ***Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire***
Lythrum hyssopifolia L., 1753 ***Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope***
Lythrum junceum Banks & Sol., 1794 ***Salicaire-jonc***
Lythrum salicaria L., 1753 ***Salicaire commune, Salicaire pourpre***
Lythrum thymifolia L., 1753 ***Salicaire à feuilles de thym***
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng., 1827 ***Salicaire à trois bractées, Lythrum à trois bractées, Lythrum de Salzmann***
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., 1906 ***Oranger des Osages, Bois d'Arc***
Macrochloa tenacissima (L.) Kunth, 1829 ***Sparte***
Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Bég., 1900 ***Magidaris***
Malcolmia africana (L.) R.Br., 1812 ***Malcolmie d'Afrique***
Malcolmia littorea (L.) R.Br., 1812 ***Julienne des sables, Malcolmie des côtes***
Malcolmia maritima (L.) R.Br., 1812
Malephora crocea (Jacq.) Schwantes, 1928
Malope malacoides L., 1753 ***Malope fausse-mauve***
Malus pumila Mill., 1768 ***Pommier Paradis***
Malus sylvestris Mill., 1768 ***Pommier sauvage, Boquettier***
Malva arborea (L.) Webb & Berthel., 1837 ***Mauve en arbre***
Malva cretica Cav., 1786 ***Mauve de Crète***
Malva longiflora (Boiss. & Reut.) B.Bock, 2012 ***Guimauve à fleurs longues***
Malva multiflora (Cav.) Soldano ***Lavatère de Crète***
Malva neglecta Wallr., 1824 ***Petite mauve***
Malva nicaeensis All., 1785 ***Mauve de Nice***
Malva olbia (L.) Alef., 1862 ***Lavatère d'Hyères***
Malva parviflora L., 1753 ***Mauve à petites fleurs***
Malva punctata (L.) Alef., 1862 ***Lavatère ponctuée***
Malva setigera Spenn., 1829 ***Mauve hérissée***
Malva subovata (DC.) Molero & J.M.Monts., 2005 ***Lavetère maritime***
Malva sylvestris L., 1753 ***Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve***
Malva trimestris (L.) Salisb., 1796 ***Lavatère d'un trimestre***
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., 1930 ***Centaurée de Salamanque, Microlonque de Salamanque***
Marrubium peregrinum L., 1753
Marrubium vulgare L., 1753 ***Marrube commun, Marrube vulgaire***
Matricaria aurea (Loefl.) Sch.Bip., 1860
Matricaria chamomilla L., 1753 ***Matricaire Camomille***
Matricaria discoidea DC., 1838 ***Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde***
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire, 1932 ***Matthiole en buisson***
Matthiola incana (L.) R.Br., 1812 ***Giroflée violet, Violier***
Matthiola sinuata (L.) R.Br., 1812 ***Matthiole à feuilles sinuées***
Matthiola tricuspidata (L.) R.Br., 1812 ***Matthiole à fruits à trois cornes, Matthiole à trois pointes***
Medicago arabica (L.) Huds., 1762 ***Luzerne tachetée***
Medicago arborea L., 1753 ***Luzerne en arbre***
Medicago blancheana Boiss.
Medicago ciliaris (L.) All., 1785 ***Luzerne ciliée***
Medicago coronata (L.) Bartal., 1776 ***Luzerne couronnée, Luzerne à gousses en couronne***
Medicago disciformis DC., 1813 ***Luzerne à fruits en disque***
Medicago doliata Carmign., 1810 ***Luzerne à fruits épineux***
Medicago intertexta (L.) Mill., 1768 ***Luzerne enchevêtrée***
Medicago littoralis Rohde ex Loisel., 1810 ***Luzerne littorale, Luzerne du littoral***
Medicago lupulina L., 1753 ***Luzerne lupuline, Minette***
Medicago marina L., 1753 ***Luzerne marine, Luzerne maritime***
Medicago minima (L.) L., 1754 ***Luzerne naine***
Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 1841 ***Luzerne de Montpellier***
Medicago murex subsp. sphaerocarpos (Bertol.) I.Lesins & K.A.Lesins, 1979 ***Luzerne***
Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 ***Luzerne orbiculaire***
Medicago polyceratia (L.) Trautv., 1841 ***Luzerne à cornes nombreuses***
Medicago polymorpha L., 1753 ***Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux***
Medicago praecox DC., 1813 ***Luzerne précoce***
Medicago rigidula (L.) All., 1785 ***Luzerne de Gérard, Luzerne rigide***
Medicago sativa L., 1753 ***Luzerne cultivée***
Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882 ***Luzerne sauvage***
Medicago sativa subsp. glomerata (Balb.) Rouy, 1899 ***Luzerne en forme de pelote, Luzerne à fleurs groupées***
Medicago sativa subsp. sativa L., 1753 ***Luzerne cultivée***
Medicago scutellata (L.) Mill., 1768 ***Luzerne en écusson, Luzerne à écussons***
Medicago truncatula Gaertn., 1791 ***Luzerne tronquée***
Medicago turbinata (L.) All., 1785 ***Luzerne à tubercules***
Melampyrum arvense L., 1753 ***Mélampyre des champs***
Melia azedarach L., 1753 ***Margousier***
Melica amethystina Pourr., 1788 ***Mélique couleur d'améthyste***
Melica ciliata L., 1753 ***Mélique ciliée***
Melica ciliata subsp. ciliata L., 1753 ***Mélique ciliée***
Melica ciliata subsp. magnolii (Godr. & Gren.) K.Richt., 1890 ***Mélique de Magnol***
Melica minuta L., 1767 ***Petite Mélique***
Melica uniflora Retz., 1779 ***Mélique uniflore***
Melilotus albus Medik., 1787 ***Mélilot blanc***
Melilotus indicus (L.) All., 1785 ***Mélilot des Indes, Mélilot d'Inde***
Melissa officinalis L., 1753 ***Mélisse officinale***
Melissa officinalis subsp. altissima (Sm.) Arcang., 1894 ***Grande Mélisse***
Melissa officinalis subsp. officinalis L., 1753 ***Mélisse officinale***
Melittis melissophyllum L., 1753 ***Mélitte à feuilles de Mélisse***
Melomphis arabica (L.) Raf., 1837 ***Ornithogale d'Arabie***
Mentha cervina L., 1753 ***Menthe des cerfs***
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 ***Menthe à longues feuilles***
Mentha pulegium L., 1753 ***Menthe pouliot***

Mentha spicata L., 1753 ***Menthe en épi, Menthe verte***
Mentha suaveolens subsp. suaveolens Ehrh., 1792 ***Menthe à feuilles rondes***
Mercurialis ambigua L.f., 1762 ***Mercuriale ambiguë***
Mercurialis annua L., 1753 ***Mercuriale annuelle, Vignette***
Mercurialis huetii Hanry, 1864 ***Mercuriale de Huet***
Mercurialis perennis L., 1753 ***Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes***
Mercurialis tomentosa L., 1753 ***Mercuriale tomenteuse***
Mesembryanthemum crystallinum L., 1753 ***Ficoïde à cristaux, Mésembryanthème à cristaux***
Mesembryanthemum nodiflorum L., 1753 ***Ficoïde à fleurs nodales***
Mibora minima (L.) Desv., 1818 ***Mibora naine, Famine***
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb., 1831 ***Sarriette de Grèce, Micromérie de Grèce***
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 ***Tabouret perfolié***
Milium montianum Parl., 1850 ***Millet***
Milium vernale M.Bieb., 1808 ***Millet printanier***
Minuartia capillacea (All.) Graebn., 1918 ***Alsine capillaire, Sabline capillaire***
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936 ***Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride***
Minuartia hybrida subsp. hybrida (Vill.) Schischk., 1936 ***Minuartie hybride***
Minuartia hybrida subsp. laxa (Jord.) Jauzein, 2010
Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguélen, 1993 ***Minuartie à petites feuilles***
Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) Maly, 1908 ***Alsine du Midi***
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842 ***Alsine changeante, Minuartie à rostre***
Mirabilis jalapa L., 1753 ***Belle-de-nuit, Faux-jalape***
Miscanthus sinensis Andersson, 1855 ***Roseau chinois, Eulalia***
Misopates calycinum Rothm., 1956 ***Muflier à grand calice***
Misopates orontium (L.) Raf., 1840 ***Muflier des champs, Tête-de-mort***
Modiolastrum lateritium (Hook.) Krapov., 1945
Moehringia pentandra J.Gay, 1832 ***Moehringie à cinq étamines***
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 ***Molinie bleue***
Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt., 1890
Molinia caerulea subsp. caerulea (L.) Moench, 1794
Monotropa hypopitys L., 1753 ***Monotrope sucepin***
Monotropa hypopitys subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe, 1922 ***Monotrope du Hêtre***
Moricandia arvensis (L.) DC., 1821 ***Moricandie, Chou des champs***
Morus alba L., 1753 ***Mûrier blanc***
Morus kagayamae Koidz., 1915
Morus nigra L., 1753 ***Mûrier noir***
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 ***Muscari à toupet, Muscari chevelu***
Muscari matritensis Ruíz Rejón, Pascual, C.Ruíz Rejón, Valdés & J.L.Oliv., 1985
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 ***Muscari à grappes, Muscari négligé***
Myagrum perfoliatum L., 1753 ***Myagre perfolié***
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 ***Myosotis des champs***
Myosotis discolor subsp. dubia (Arrond.) Blaise, 1972
Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 ***Myosotis cespiteux***
Myosotis pusilla Loisel., 1809 ***Myosotis ténu***
Myosotis ramosissima subsp. ramosissima Rochel, 1814 ***Myosotis rameux***
Myosurus minimus L., 1753 ***Queue-de-souris naine***
Myricaria germanica (L.) Desv., 1824 ***Tamarin d'Allemagne, Petit Tamaris***
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 ***Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique***
Myriophyllum spicatum L., 1753 ***Myriophylle à épis***
Myriophyllum verticillatum L., 1753 ***Myriophylle verticillé***
Myrtus communis L., 1753 ***Myrte commun***
Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus, 1870 ***Naïade***
Najas marina L., 1753 ***Naïade majeure, Naïade marine***
Najas marina subsp. intermedia (Wolfg. ex Gorski) Casper, 1979 ***Naïade intermédiaire***
Najas minor All., 1773 ***Naïade mineure, Petite naïade***
Narcissus assoanus Dufour, 1830 ***Narcisse à feuilles de jonc***
Narcissus dubius Gouan, 1773 ***Narcisse douteux***
Narcissus papyraceus Ker Gawl., 1806
Narcissus poeticus L., 1753 ***Narcisse des poètes***
Narcissus tazetta subsp. italicus (Ker Gawl.) Baker, 1888
Narcissus tazetta subsp. tazetta L., 1753
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy, 1913 ***Narduroides de Salzmann, Nardure de Salzmann***
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990 ***Stipe de Nees***
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 ***Cresson des fontaines***
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst., 1953 ***Grémil d'Apulie***
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl., 1854 ***Scille fausse Jacinthe***
Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974 ***Néottinée maculée, Orchis maculé***
Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 ***Orchis à trois dents, Orchis tridenté***
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 ***Orchis brûlé***
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 ***Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers***
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 ***Grande Listère***
Nepeta cataria L., 1753 ***Herbe aux chats, Cataire, Menthe des chats***
Nepeta nepetella L., 1759 ***Népeta petit népeta, Népéta à feuilles lancéolées***
Nepeta nuda L., 1753 ***Népéta glabre, Népéta nu***
Nepeta racemosa Lam., 1785
Nerium oleander L., 1753 ***Laurier rose, Oléandre***
Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm., 1894 ***Neslie de Thrace***
Nicotiana glauca Graham, 1828 ***Tabac glauque***
Nicotiana rustica L., 1753
Nigella arvensis L., 1753 ***Nigelle des champs***
Nigella damascena L., 1753 ***Nigelle de Damas, Herbe de Capucin***
Nigella nigellastrum (L.) Willk., 1880 ***Garidelle fausse Nigelle***
Nigella sativa L., 1753 ***Nigelle cultivée, Herbe aux épices***
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult., 1819 ***Nonnée fausse vipérine, Nonnée blanche***
Nonea erecta Bernh., 1800 ***Nonnée brune, Nonnée sombre***
Nonea pallens Petrovi?, 1885 ***Nonnée pâle***
Nothoscordum borbonicum Kunth, 1843 ***Ail inodore, Ail odorant***
Notobasis syriaca (L.) Cass., 1825 ***Notobasis de Syrie, Chardon de Syrie, Cirse de Syrie***
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809 ***Nénuphar jaune, Nénufar jaune***
Nymphaea alba L., 1753 ***Nénuphar blanc, Lys des étangs***
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 ***Limnanthème faux-nénuphar, Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté***
Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 ***Euphraise jaune, Odontitès jaune***
Odontites luteus subsp. luteus (L.) Clairv., 1811 ***Odontitès jaune***
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827 ***Odontite rouge, Euphraise rouge***
Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb., 1894 ***Odontitès tardif***
Odontites vernus subsp. vernus (Bellardi) Dumort., 1827 ***Odontite rouge***
Odontites viscosus (L.) Clairv., 1811 ***Euphraise visqueuse, Odontitès visqueux***
Oenanthe fistulosa L., 1753 ***Oenanthe fistuleuse***
Oenanthe globulosa L., 1753 ***Oenanthe globuleuse***
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805 ***Oenanthe de Lachenal***
Oenanthe pimpinelloides L., 1753 ***Oenanthe faux boucage***
Oenothera biennis L., 1753 ***Onagre bisannuelle***
Oenothera glazioviana Micheli, 1875 ***Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou***
Oenothera laciniata Hill, 1768 ***Onagre laciniée***
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
Oenothera pycnocarpa G.F.Atk. & Bartlett, 1913 ***Onagre de Chicago***
Oenothera speciosa Nutt., 1821
Oenothera stuchii Soldano, 1979
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers., 1805 ***Onagre parfumé, Onagre à odeur suave***
Oenothera villosa Thunb., 1794 ***Onagre à feuilles de saule***
Olea europaea L., 1753 ***Olivier d'Europe***
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012 ***Piptathère faux Millet***
Omphalodes linifolia (L.) Moench, 1794 ***Omphalodès à feuilles de lin***
Oncostema peruviana (L.) Speta, 1987 ***Scille du Pérou***
Onobrychis aequidentata (Sm.) d'Urv., 1822 ***Esparcette à dents égales, Sainfoin à dents égales***
Onobrychis argentea Boiss., 1840 ***Sainfoin argentée***
Onobrychis caput-galli (L.) Lam., 1779 ***Sainfoin Tête-de-coq***
Onobrychis saxatilis (L.) Lam., 1779 ***Sainfoin des rochers, Esparcette des rochers***
Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805 ***Sainfoin couchée, Esparcette couchée***
Onobrychis viciifolia Scop., 1772 ***Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce***
Ononis alopecuroides subsp. alopecuroides
Ononis breviflora DC., 1825 ***Bugrane à fleurs courtes***
Ononis minutissima L., 1753 ***Bugrane très grêle***
Ononis mitissima L., 1753 ***Bugrane sans épines***
Ononis natrix subsp. natrix L., 1753
Ononis natrix subsp. ramosissima (Desf.) Batt., 1889
Ononis pubescens L., 1771 ***Bugrane pubescent, Bugrane pubescente***
Ononis pusilla L., 1759 ***Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna***
Ononis reclinata L., 1763 ***Bugrane à fleurs pendantes***
Ononis spinosa L., 1753 ***Bugrane épineuse, Arrête-boeuf***
Ononis spinosa subsp. antiquorum (L.) Arcang., 1882 ***Bugrane des anciens***
Ononis spinosa subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937
Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753 ***Arrête-boeuf***
Ononis viscosa L., 1753 ***Bugrane visqueux, Bugrane visqueuse***
Onopordum acanthium L., 1753 ***Onopordon faux-acanthe, Chardon aux ânes***
Onopordum illyricum L., 1753 ***Onopordon d'Illyrie***
Onopordum tauricum Willd., 1803 ***Onopordon***
Ophioglossum vulgatum L., 1753 ***Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent***
Ophrys apifera Huds., 1762 ***Ophrys abeille***
Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860 ***Ophrys Araignée, Ophrys en forme d'araignée, Ophrys arachnitiforme, Ophrys brillant***
Ophrys aranifera Huds., 1778 ***Ophrys araignée, Oiseau-coquet***
Ophrys aranifera subsp. aranifera Huds., 1778 ***Ophrys araignée***
Ophrys aranifera subsp. massiliensis (Viglione & Véla) Véla, 2007 ***Ophrys de Marseille***
Ophrys bertolonii Moretti, 1823 ***Ophrys de Bertoloni, Ophrys Aurélia***
Ophrys bombyliflora Link, 1800 ***Ophrys bombyx***
Ophrys exaltata Ten., 1819 ***Ophrys***
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 ***Ophrys bourdon, Ophrys frelon***
Ophrys fuciflora subsp. souchei R.Martin & Véla, 2012
Ophrys fusca Link, 1800 ***Ophrys brun***
Ophrys incubacea Bianca, 1842 ***Ophrys de petite taille, Ophrys noirâtre***
Ophrys insectifera L., 1753 ***Ophrys mouche***
Ophrys lutea Cav., 1793 ***Ophrys jaune***
Ophrys marmorata G.Foelsche & W.Foelsche, 1998 ***Ophrys marbré***
Ophrys passionis Sennen, 1926 ***Ophrys de la passion***
Ophrys provincialis (H.Baumann & Künkele) Paulus, 1988 ***Ophrys de Provence***
Ophrys saratoi E.G.Camus, 1893 ***Ophrys du groupe bertolonii, Ophrys de la Drôme***
Ophrys scolopax Cav., 1793 ***Ophrys bécasse***
Ophrys scolopax subsp. apiformis (Desf.) Maire & Weiller, 1959 ***Ophrys peint***
Ophrys scolopax subsp. scolopax Cav., 1793 ***Ophrys Bécasse***
Ophrys speculum Link, 1799 ***Ophrys miroir***
Ophrys tenthredinifera Willd., 1805 ***Ophrys tenthrède, Ophrys à grandes fleurs***
Ophrys virescens Philippe, 1859 ***Ophrys verdissant***
Opopanax chironium (L.) W.D.J.Koch, 1824 ***Opoponax de Somalie, Opopônax de Chiron***
Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850
Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768 ***Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde***
Opuntia humifusa (Raf.) Raf., 1830 ***Figuier d'Inde***
Opuntia imbricata (Haw.) DC., 1828
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff., 1837
Opuntia phaeacantha Engelm., 1849
Opuntia robusta H.L.Wendl. ex Pfeiff., 1837
Opuntia scheerii F.A.C.Weber, 1898
Opuntia stricta (Haw.) Haw., 1812 ***Oponce***
Orchis anthropophora (L.) All., 1785 ***Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu***
Orchis mascula (L.) L., 1755 ***Orchis mâle, Herbe à la couleuvre***
Orchis militaris L., 1753 ***Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué***
Orchis olbiensis Reut. ex Gren., 1859 ***Orchis d'Hyères***
Orchis provincialis Balb. ex DC., 1806 ***Orchis de Provence***
Orchis purpurea Huds., 1762 ***Orchis pourpre, Grivollée***
Orchis simia Lam., 1779 ***Orchis singe***
Origanum vulgare subsp. vulgare L., 1753 ***Origan commun***
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 ***Caucalis à grandes fleurs***
Orlaya platycarpos W.D.J.Koch, 1824 ***Orlaya de Koch***
Ornithogalum divergens Boreau, 1857 ***Dame-d'onze-heures***
Ornithogalum orthophyllum Ten., 1831
Orobanche aegyptiaca Pers., 1806
Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800 ***Orobanche du thym, Orobanche blanche***
Orobanche amethystea Thuill., 1799 ***Orobanche violette, Orobanche du Panicaut***
Orobanche artemisii-campestris Vaucher ex Gaudin, 1829 ***Orobanche du Picris, Orobanche de l'Armoise des champs***
Orobanche caryophyllacea Sm., 1798 ***Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'Oeillet***
Orobanche cernua Loefl., 1758 ***Orobanche penchée***
Orobanche crenata Forssk., 1775 ***Orobanche crénelée***
Orobanche fuliginosa Reut. ex Jord., 1846 ***Orobanche***
Orobanche gracilis Sm., 1798 ***Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle***
Orobanche grenieri F.W.Schultz, 1846
Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828 ***Orobanche du lierre***
Orobanche kochii F.W.Schultz, 1847
Orobanche minor Sm., 1797 ***Orobanche du trèfle, Petite Orobanche***
Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830 ***Orobanche de la picride, Orobanche du Picris***
Orobanche pubescens d'Urv., 1822 ***Orobanche pubescente***
Orobanche reticulata Wallr., 1825 ***Orobanche réticulée***
Orobanche santolinae Loscos & J.Pardo, 1863 ***Orobanche de la Santoline***
Orobanche staehelinae D.Pav., Michaud, Véla & J.-M.Tison, 2015 ***Orobanche de la Staehéline***
Orobanche teucrii Holandre, 1829 ***Orobanche de la germandrée***
Orthilia secunda (L.) House, 1921 ***Pirole unilatérale***
Oryza sativa L., 1753 ***Riz, Riz cultivé***
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl., 1943 ***Ostéosperme***
Ostrya carpinifolia Scop., 1772 ***Charme houblon, Bois-de-fer***
Osyris alba L., 1753 ***Rouvet blanc***
Othocallis amoena (L.) Salisb., 1866 ***Scille***
Oxalis acetosella L., 1753 ***Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia***
Oxalis articulata Savigny, 1798 ***Oxalis articulé***
Oxalis corniculata L., 1753 ***Oxalis corniculé, Trèfle jaune***
Oxalis debilis Kunth, 1822 ***Oxalis en corymbe, Oxalis chétif***

Oxalis dillenii Jacq., 1794 ***Oxalis dressé, Oxalis de Dillenius***
Oxalis latifolia Kunth, 1822 ***Oxalis à feuilles larges, Oxalis à larges feuilles***
Oxalis pes-caprae L., 1753 ***Oxalis pied-de-chèvre***
Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 ***Chénopode à feuilles grasses***
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 ***Chénopode glauque***
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 ***Ansérine rouge***
Oxybasis urbica (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 ***Chénopode des agglomérations***
Paliurus spina-christi Mill., 1768 ***Épine-du-Christ***
Pallenis maritima (L.) Greuter, 1997 ***Astérolide maritime***
Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825 ***Pallénis épineux***
Pancratium maritimum L., 1753 ***Lys de mer, Lis maritime, Lis des sables***
Panicum barbipulvinatum Nash, 1900
Panicum capillare L., 1753 ***Panic capillaire***
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 ***Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome***
Panicum miliaceum L., 1753 ***Panic faux-millet***
Panicum virgatum L., 1753 ***Panic dressé***
Papaver apulum Ten., 1826
Papaver argemone L., 1753 ***Pavot argémone, Coquelicot Argémone***
Papaver dubium L., 1753 ***Pavot douteux***
Papaver hybridum L., 1753 ***Pavot hybride***
Papaver rhoeas L., 1753 ***Coquelicot***
Papaver somniferum L., 1753 ***Pavot somnifère, Pavot officinal***
Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang., 1882 ***Pavot sauvage***
Parapholis filiformis (Roth) C.E.Hubb., 1946 ***Lepture filiforme***
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb., 1946 ***Lepture courbé***
Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier & Mathez, 1973 ***Cynoglosse à feuilles de Giroflée***
Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885 ***Parentucelle à larges feuilles***
Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885 ***Bartsie visqueuse***
Parietaria judaica L., 1756 ***Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse***
Parietaria lusitanica L., 1753 ***Pariétaire du Portugal***
Parnassia palustris L., 1753 ***Parnassie des marais, Hépatique blanche***
Paronychia argentea Lam., 1779 ***Paronyque argentée***
Paronychia capitata (L.) Lam., 1779 ***Paronyque en tête***
Paronychia echinulata Chater, 1964 ***Paronyque à pointes***
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 ***Vigne-vierge commune***
Paspalum dilatatum Poir., 1804 ***Paspale dilaté***
Paspalum distichum L., 1759 ***Paspale à deux épis***
Passiflora caerulea L., 1753 ***Passiflore, Fruit de la passion, Grenadille***
Pastinaca sativa L., 1753 ***Panais cultivé, Pastinacier***
Pastinaca sativa subsp. sativa L., 1753 ***Pastinacier***
Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak., 1875 ***Panais brûlant***
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841 ***Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna***
Pedicularis palustris L., 1753 ***Pédiculaire des marais, Tartarie rouge***
Peganum harmala L., 1753 ***Harmal***
Periploca graeca L., 1753 ***Bourreau-des-arbres***
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 ***Persicaire flottante***
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 ***Renouée Poivre d'eau***
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 ***Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée***
Persicaria maculosa Gray, 1821 ***Renouée Persicaire***
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852 ***Petite Renouée***
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966 ***Renouée douce***
Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841 ***Renouée orientale***
Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986 ***Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver***
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood, 1964 ***Œillet de Nanteuil***
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 ***Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère***
Petrorhagia saxifraga subsp. saxifraga (L.) Link, 1829 ***Oeillet des rochers***
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866 ***Persil commun***
Phacelia tanacetifolia Benth., 1837 ***Phacélie à feuilles de Tanaisie***
Phagnalon saxatile (L.) Cass., 1819 ***Phagnalon des rochers***
Phagnalon sordidum (L.) Rchb., 1831 ***Phagnalon repoussant***
Phalaris appendiculata Schult., 1824
Phalaris aquatica L., 1755 ***Alpiste aquatique***
Phalaris arundinacea L., 1753 ***Baldingère faux-roseau, Fromenteau***
Phalaris arundinacea subsp. arundinacea L., 1753 ***Fromenteau***
Phalaris arundinacea subsp. oehleri Pilg., 1909 ***Alpiste panaché***
Phalaris brachystachys Link, 1806 ***Alpiste à épi court***
Phalaris canariensis L., 1753 ***Alpiste des Canaries***
Phalaris coerulescens Desf., 1798 ***Alpiste bleuâtre***
Phalaris minor Retz., 1783 ***Alpiste mineur***
Phalaris paradoxa L., 1763 ***Alpiste paradoxal***
Phalaris truncata Guss. ex Bertol., 1836 ***Alpiste tronqué***
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874 ***Orobanche des sables***
EN Phelipanche camphorosmae Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew., 2008 ***Orobanche de la Camphorée***
Phelipanche inexpectata Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew.
Phelipanche nana (Reut.) Soják, 1972 ***Orobanche naine***
EN Phelipanche olbiensis (Coss.) Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew. ***Orobanche d'Hyères***
Phelipanche purpurea subsp. purpurea (Jacq.) Soják, 1972
Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874 ***Orobanche rameuse, Orobanche ramifiée***
Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano, 2005 ***Orobanche du Romarin***
Phillyrea angustifolia L., 1753 ***Alavert à feuilles étroites***
Phillyrea latifolia L., 1753 ***Alavert à feuilles larges, Filaria à larges feuilles***
Phillyrea media L., 1759 ***Filaire intermédiaire***
Phleum arenarium L., 1753 ***Fléole des sables***
Phleum nodosum L., 1759 ***Fléole de Bertoloni***
Phleum paniculatum Huds., 1762 ***Fléole rude***
Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880 ***Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole***
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn., 1899 ***Phléole subulée***
Phlomis fruticosa L., 1753 ***Sauge de Jérusalem***
Phlomis herba-venti L., 1753 ***Herbe au vent***
Phlomis lychnitis L., 1753 ***Lychnite***
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud, 1882 ***Dattier, Palmier des Canaries***
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 ***Roseau, Roseau commun, Roseau à balais***
Phyllanthus niruri L., 1753
Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière
Physalis alkekengi L., 1753 ***Coqueret, Cerise d'hiver***
Physalis peruviana L., 1763
Physalis viscosa L., 1753
Phyteuma charmelii Vill., 1785 ***Raiponce de Charmeil***
Phyteuma orbiculare L., 1753 ***Raiponce orbiculaire***
Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare L., 1753 ***Raiponce orbiculaire***
Phytolacca americana L., 1753 ***Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine***
Picnomon acarna (L.) Cass., 1826 ***Cirse acarna***
Picris hieracioides subsp. hieracioides L., 1753 ***Herbe aux vermisseaux***
Picris pauciflora Willd., 1803 ***Picride pauciflore, Picride à fleurs peu nombreuses***
Picris rhagadioloides (L.) Desf., 1804 ***Picride très élevée, Picride fausse rhagadiole***
Pilosella anchusoides Arv.-Touv., 1880 ***Piloselle faux Buglosse***
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 ***Piloselle***
Pilosella piloselloides subsp. praealta (Vill. ex Gochnat) S.Bräut. & Greuter, 2007 ***Grande Piloselle***
Pilosella ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 ***Piloselle de Ziz***
Pimpinella major (L.) Huds., 1762 ***Grand boucage***
Pimpinella peregrina L., 1753 ***Boucage voyageur***
Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga L., 1753 ***Persil de Bouc***
Pimpinella tragium Vill., 1779 ***Boucage Tragium***
Pinguicula lusitanica L., 1753 ***Grassette du Portugal***
Pinus brutia Ten., 1830
Pinus halepensis Mill., 1768 ***Pin blanc de Provence, Pin d'Alep, Pin blanc***
Pinus nigra subsp. laricio Maire, 1928 ***Pin Laricio, Pin de Corse***
Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785 ***Pin noir d'Autriche***
Pinus pinaster Aiton, 1789 ***Pin maritime, Pin mésogéen***
Pinus pinea L., 1753 ***Pin parasol, Pin pignon, Pin d'Italie***
Pinus sylvestris L., 1753 ***Pin sylvestre***
Piptatherum coerulescens (Desf.) P.Beauv., 1812 ***Piptathérum bleuâtre***
Piptatherum paradoxum (L.) P.Beauv., 1812 ***Millet paradoxal***
Pistacia lentiscus L., 1753 ***Lentisque, Arbre au mastic***
Pistacia terebinthus L., 1753 ***Pistachier térébinthe, Pudis***
Pistacia vera L., 1753
Pistia stratiotes L., 1753
Pisum sativum L., 1753 ***Pois cultivé***
Pisum sativum subsp. biflorum (Raf.) Soldano, 1992 ***Pois élevé***
Pisum sativum subsp. sativum L., 1753 ***Pois cultivé***
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811 ***Arbre des Hottentots***
Plantago afra L., 1762 ***Plantain pucier***
Plantago albicans L., 1753 ***Plantain blanchissant***
Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802 ***Plantain scabre***
Plantago argentea Chaix, 1785 ***Plantain argenté***
Plantago bellardii All., 1785 ***Plantain de Bellardi***
Plantago coronopus L., 1753 ***Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau***
Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753 ***Plantain Corne-de-cerf***
Plantago crassifolia Forssk., 1775 ***Plantain à feuilles grasses***
Plantago holosteum Scop., 1771 ***Plantain caréné, Plantain recourbé***
Plantago lagopus L., 1753 ***Plantain queue de lièvre, Plantain Pied-de-lièvre***
Plantago lanceolata L., 1753 ***Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures***
Plantago major L., 1753 ***Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet***
Plantago major subsp. major L., 1753 ***Plantain à bouquet***
Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937 ***Plantain intermédiaire***
Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882 ***Plantain serpentin***
Plantago media L., 1753 ***Plantain moyen***
Plantago sempervirens Crantz, 1766 ***Œil de chien, Plantain toujours vert***
Plantago subulata L., 1753 ***Plantain caréné, Plantain à feuilles en alène***
Plantago weldenii Rchb., 1831 ***Plantain de Welden***
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 ***Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches***
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 ***Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres***
Platanus orientalis L., 1753 ***Platane d'Orient***
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Platycapnos spicata (L.) Bernh., 1833 ***Fumeterre en épi***
Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949 ***Thuya d'Orient***
Plumbago auriculata Lam., 1786 ***Plumbago du Cap, Dentelaire du Cap***
Plumbago europaea L., 1753 ***Plumbago d'Europe, Plombago***
Poa annua L., 1753 ***Pâturin annuel***
Poa bulbosa L., 1753 ***Pâturin bulbeux***
Poa compressa L., 1753 ***Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties***
Poa flaccidula Boiss. & Reut., 1852 ***Pâturin***
Poa infirma Kunth, 1816 ***Pâturin grêle***
Poa nemoralis L., 1753 ***Pâturin des bois, Pâturin des forêts***
Poa pratensis L., 1753 ***Pâturin des prés***
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824 ***Pâturin à feuilles étroites***
Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753
Poa trivialis L., 1753 ***Pâturin commun, Gazon d'Angleterre***
Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H.Lindb., 1906 ***Pâturin des forêts***
Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753 ***Gazon d'Angleterre***
Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805 ***Scorzonère à feuilles de Chausse-trape***
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759 ***Polycarpon à quatre feuilles, Polycarpe à quatre feuilles***
Polycarpon tetraphyllum subsp. alsinifolium (Biv.) Ball, 1877 ***Polycarpon à feuilles de sabline***
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum (L.) L., 1759 ***Polycarpe à quatre feuilles***
EN Polycnemum arvense L., 1753 ***Petit polycnème, Polycnème des champs***
Polycnemum majus A.Braun, 1841 ***Grand polycnème, Grand Polycnémum***
Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 ***Polygale du calcaire, Polygala du calcaire***
Polygala comosa Schkuhr, 1796 ***Polygala chevelu***
Polygala exilis DC., 1813 ***Polygale grêle, Polygale nain***
Polygala monspeliaca L., 1753 ***Polygale de Montpellier, Polygala de Montpellier***
Polygala rupestris Pourr., 1788 ***Polygale des rochers, Polygala des rochers***
Polygala vulgaris L., 1753 ***Polygala commun, Polygala vulgaire***
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 ***Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal***
Polygonum arenarium subsp. pulchellum (Loisel.) Thell., 1912 ***Renouée des sables, Renouée jolie***
Polygonum aviculare L., 1753 ***Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse***
Polygonum aviculare subsp. aviculare L., 1753 ***Renouée Traînasse***
Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882 ***Renouée littorale***
Polygonum aviculare subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher, 1887 ***Renouée des champs***
Polygonum bellardii All., 1785 ***Renouée de Bellardi***
Polygonum cognatum Meisn., 1826
Polygonum maritimum L., 1753 ***Renouée maritime***
Polygonum robertii Loisel., 1827 ***Renouée de Robert***
Polypodium cambricum L., 1753 ***Polypode austral***
Polypodium interjectum Shivas, 1961 ***Polypode intermédiaire***
Polypogon maritimus Willd., 1801 ***Polypogon maritime***
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798 ***Polypogon de Montpellier***
Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966 ***Polypogon vrai, Polypogon vert***
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 ***Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons***
Populus alba L., 1753 ***Peuplier blanc***
Populus nigra L., 1753 ***Peuplier commun noir, Peuplier noir***
Populus nigra subsp. neapolitana (Ten.) Maire, 1932 ***Peuplier de Naples***
Portulaca grandiflora Hook., 1829
Portulaca granulatostellulata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni, 2000 ***Pourpier***
Portulaca oleracea L., 1753 ***Pourpier cultivé, Porcelane***
Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 ***Posidonie, Pelote de mer, Chiendent marin, Paille-de-mer***
Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838 ***Potamot de Berchtold***
Potamogeton coloratus Hornem., 1813 ***Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre***
Potamogeton crispus L., 1753 ***Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues***
Potamogeton lucens L., 1753 ***Potamot luisant, Potamot brillant***
Potamogeton natans L., 1753 ***Potamot nageant***
Potamogeton nodosus Poir., 1816 ***Potamot noueux***
Potamogeton perfoliatus L., 1753 ***Potamot à feuilles perfoliées***
Potamogeton pusillus L., 1753 ***Potamot fluet***
Potentilla argentea L., 1753 ***Potentille argentée***
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 ***Potentille tormentille***
Potentilla hirta L., 1753 ***Potentille velue***
Potentilla neglecta Baumg., 1816 ***Potentille négligée***
Potentilla pedata Willd. ex Hornem., 1815
Potentilla recta L., 1753 ***Potentille dressée, Potentille droite***
Potentilla reptans L., 1753 ***Potentille rampante, Quintefeuille***

Potentilla supina L., 1753 ***Potentille couchée***
Potentilla velutina Lehm., 1835
Potentilla verna L., 1753 ***Potentille de Tabernaemontanus***
Poterium sanguisorba L., 1753 ***Pimprenelle à fruits réticulés***
Poterium verrucosum Link ex G.Don, 1832 ***Sanguisorbe à fruits verruqueux***
Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn, 1977 ***Amarinthe trifide***
Primula veris L., 1753 ***Coucou, Primevère officinale, Brérelle***
Primula vulgaris subsp. vulgaris Huds., 1762 ***Primevère acaule***
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 ***Scille d'automne***
Prospero pulchellum (Munby) Speta, 1982
Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775 ***Brunelle à grandes fleurs***
Prunella hyssopifolia L., 1753 ***Brunelle à feuilles d'hysope***
Prunella laciniata (L.) L., 1763 ***Brunelle laciniée***
Prunella vulgaris L., 1753 ***Brunelle commune, Herbe au charpentier***
Prunus armeniaca L., 1753 ***Abricotier, Abricotier commun***
Prunus avium (L.) L., 1755 ***Merisier vrai, Cerisier des bois***
Prunus cerasifera Ehrh., 1784 ***Prunier myrobolan, Myrobolan***
Prunus cerasus L., 1753 ***Cerisier acide, Griottier***
Prunus domestica L., 1753 ***Prunier domestique, Prunier***
Prunus domestica subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens, 1894
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 ***Amandier amer***
Prunus laurocerasus L., 1753 ***Laurier-cerise, Laurier-palme***
Prunus mahaleb L., 1753 ***Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel***
Prunus persica (L.) Batsch, 1801 ***Pêcher***
Prunus spinosa L., 1753 ***Épine noire, Prunellier, Pelossier***
Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & Burtt, 1981 ***Cotonnière ondulée***
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz, 2005 ***Arabette Tourette***
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell., 1913 ***Psilure, Psilurus arisé***
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 ***Fougère aigle, Porte-aigle***
Pteris cretica L., 1767 ***Ptéris de Crète, Fougère de Crète***
Pteris vittata L., 1753 ***Ptéris rubané, Fougère à feuilles longues***
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, 1876 ***Ptychotis à feuilles variées***
Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell, 1907 ***Atropis fasciculé***
Puccinellia festuciformis (Host) Parl., 1850 ***Glycérie***
Puccinellia festuciformis subsp. festuciformis (Host) Parl., 1850
Puccinellia festuciformis subsp. lagascana Julià & J.M.Monts. ***Atropis à feuilles enroulées***
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 ***Pulicaire dysentérique***
Pulicaria odora (L.) Rchb., 1831 ***Pulicaire odorante***
Pulicaria sicula (L.) Moris, 1843 ***Pulicaire de Sicile***
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 ***Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune***
Punica granatum L., 1753 ***Grenadier, Grenadier commun***
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 ***Buisson ardent***
Pyrus communis L., 1753 ***Poirier cultivé, Poirier commun***
Pyrus communis subsp. communis L., 1753
Pyrus spinosa Forssk., 1775 ***Poirier amandier, Poirier à feuilles d'Amandier***
Quercus coccifera L., 1753 ***Chêne Kermès***
Quercus ilex L., 1753 ***Chêne vert***
Quercus pubescens Willd., 1805 ***Chêne pubescent***
Quercus robur L., 1753 ***Chêne pédonculé, Gravelin***
Quercus suber L., 1753 ***Chêne liège, Surier***
Ranunculus acris L., 1753 ***Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre***
Ranunculus acris subsp. acris L., 1753 ***Pied-de-coq***
Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863 ***Renoncule âcre, Renoncule de Fries***
Ranunculus arvensis L., 1753 ***Renoncule des champs, Chausse-trappe des blés***
Ranunculus bulbosus L., 1753 ***Renoncule bulbeuse***
Ranunculus circinatus Sibth., 1794 ***Renoncule divariquée, Renoncule en crosse***
Ranunculus flammula L., 1753 ***Renoncule flammette, Petite douve, Flammule***
Ranunculus gramineus L., 1753 ***Renoncule graminée, Renoncule à feuilles de graminée***
Ranunculus macrophyllus Desf., 1798 ***Bouton d'or à grandes feuilles, Renoncule à grandes feuilles***
Ranunculus monspeliacus L., 1753 ***Renoncule de Montpellier***
Ranunculus muricatus L., 1753 ***Renoncule à petites pointes, Pied-de-coq***
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 ***Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse***
Ranunculus paludosus Poir., 1789 ***Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil***
Ranunculus parviflorus L., 1758 ***Renoncule à petites fleurs***
Ranunculus peltatus Schrank, 1789 ***Renoncule peltée***
Ranunculus peltatus subsp. peltatus Schrank, 1789 ***Renoncule peltée***
Ranunculus repens L., 1753 ***Renoncule rampante***
Ranunculus sardous Crantz, 1763 ***Renoncule sarde, Sardonie***
Ranunculus sceleratus L., 1753 ***Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri***
Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus Chaix, 1785 ***Renoncule de Drouet***
Ranunculus trilobus Desf., 1798 ***Renoncule trilobée, Renoncule à feuilles à trois lobes***
Raphanus raphanistrum L., 1753 ***Ravenelle, Radis sauvage***
Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, 1894 ***Radis maritime***
Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum L., 1753 ***Radis sauvage***
Rapistrum perenne (L.) All., 1785 ***Rapistre vivace***
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785 ***Rapistre rugueux, Ravanisclе***
Rapistrum rugosum subsp. orientale (L.) Arcang., 1882 ***Rapistre d'Orient***
Rapistrum rugosum subsp. rugosum (L.) All., 1785 ***Ravaniscle***
Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 ***Reichardie***
Reseda alba L., 1753 ***Réséda blanc***
Reseda alba subsp. alba L., 1753 ***Réséda blanc***
Reseda alba subsp. hookeri (Guss.) Arcang., 1882 ***Réséda de Hooker***
Reseda lutea L., 1753 ***Réséda jaune, Réséda bâtard***
Reseda luteola L., 1753 ***Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre***
Reseda phyteuma L., 1753 ***Réséda raiponce***
Rhagadiolus edulis Gaertn., 1791 ***Rhagadiole comestible***
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn., 1791 ***Rhagadiole en étoile***
Rhamnus alaternus L., 1753 ***Nerprun Alaterne, Alaterne***
Rhamnus alpina L., 1753 ***Nerprun des Alpes***
Rhamnus cathartica L., 1753 ***Nerprun purgatif***
Rhamnus saxatilis Jacq., 1762 ***Nerprun des rochers***
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 ***Pomme-de-pin***
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 ***Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq***
Rhinanthus minor L., 1756 ***Petit cocriste, Petit Rhinanthe***
Rhus coriaria L., 1753 ***Sumac des corroyeurs, Vinaigrier***
Rhus typhina L., 1756 ***Sumac hérissé, Sumac Amarante***
Ribes alpinum L., 1753 ***Groseillier des Alpes***
Ribes uva-crispa L., 1753 ***Groseillier à maquereaux***
Ricinus communis L., 1753 ***Ricin***
Ridolfia segetum (Guss.) Moris, 1842 ***Aneth des moissons***
Robinia pseudoacacia L., 1753 ***Robinier faux-acacia, Carouge***
EN Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 ***Roemérie hybride, Roemérie intermédiaire***
Romulea columnae subsp. columnae Sebast. & Mauri, 1818 ***Romulée à petites fleurs***
Romulea ramiflora Ten., 1827 ***Romulée ramifiée***
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 ***Rorippe amphibie***
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 ***Rorippe faux-cresson, Cresson des marais***
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 ***Rorippe des forêts, Roripe des bois***
Rosa agrestis Savi, 1798 ***Rosier des haies, Églantier agreste***
Rosa canina L., 1753 ***Rosier des chiens, Rosier des haies***
Rosa corymbifera Borkh., 1790
Rosa elliptica Tausch, 1819
Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812
Rosa montana Chaix, 1785 ***Rosier des montagnes, Églantier des montagnes***
Rosa pouzinii Tratt., 1823 ***Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin***
Rosa rubiginosa L., 1771 ***Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme***
Rosa sempervirens L., 1753 ***Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois***
Rosa spinosissima L., 1753 ***Rosier à feuilles de Boucage***
Rosa spinosissima subsp. myriacantha (DC.) C.Vicioso
Rosa spinosissima subsp. spinosissima L., 1753
Rosa squarrosa (Rau) Boreau, 1857
Rosmarinus officinalis L., 1753 ***Romarin, Romarin officinal***
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 ***Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole***
Rostraria pubescens (Lam.) Trin., 1820 ***Koelérie du littoral***
Rubia peregrina L., 1753 ***Garance voyageuse, Petite garance***
Rubia peregrina subsp. longifolia (Poir.) O.Bolòs, 1969 ***Garance à longues feuilles***
Rubia peregrina subsp. peregrina L., 1753 ***Petite garance***
Rubia tinctorum L., 1753 ***Garance des teinturiers***
Rubus armeniacus Focke, 1874
Rubus caesius L., 1753 ***Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue***
Rubus canescens DC., 1813 ***Ronce blanchâtre***
Rubus ulmifolius Schott, 1818 ***Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme***
Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753 ***Rumex oseille***
Rumex acetosella L., 1753 ***Petite oseille, Oseille des brebis***
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.) Rech.f., 1939 ***Rumex de France***
Rumex conglomeratus Murray, 1770 ***Patience agglomérée, Oseille agglomérée***
Rumex crispus L., 1753 ***Patience crépue, Oseille crépue***
Rumex cristatus DC., 1813 ***Patience à crêtes, Rumex à crêtes***
Rumex hydrolapathum Huds., 1778 ***Patience d'eau, Grande Parelle***
Rumex intermedius DC., 1815 ***Patience intermédiaire, Rumex intermédiaire***
Rumex obtusifolius L., 1753 ***Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage***
Rumex patientia L., 1753 ***Épinard-oseille***
Rumex pulcher L., 1753 ***Patience élégante, Rumex joli***
Rumex pulcher subsp. pulcher L., 1753 ***Rumex joli***
Rumex pulcher subsp. woodsii (De Not.) Arcang., 1882
Rumex sanguineus L., 1753 ***Patience sanguine***
Rumex scutatus L., 1753 ***Oseille ronde***
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande, 1918 ***Ruppie spiralée***
Ruppia maritima L., 1753 ***Ruppie maritime***
Ruscus aculeatus L., 1753 ***Fragon, Petit houx, Buis piquant***
Ruscus hypophyllum L., 1753 ***Herbe aux langues***
Ruta angustifolia Pers., 1805 ***Rue à feuilles étroites***
Ruta chalepensis L., 1767 ***Rue de Chalep***
Ruta graveolens L., 1753 ***Rue odorante, Rue fétide***
Ruta montana (L.) L., 1756 ***Rue des montagnes***
Sagina apetala Ard., 1763 ***Sagine apétale, Sagine sans pétales***
Sagina apetala subsp. apetala Ard., 1763 ***Sagine sans pétales***
Sagina apetala subsp. erecta F.Herm., 1912 ***Sagine dressée***
Sagina maritima G.Don, 1810 ***Sagine maritime***
Sagittaria latifolia Willd., 1805 ***Sagittaire à larges feuilles, Sagittaire obtuse***
Salicornia perennans Willd., 1797 ***Salicorne étalée***
Salicornia procumbens Sm., 1813 ***Salicorne couchée***
Salix alba L., 1753 ***Saule blanc, Saule commun***
Salix atrocinerea Brot., 1804 ***Saule à feuilles d'Olivier***
Salix babylonica L., 1753 ***Saule de Babylone, Paradis des jardiniers***
Salix caprea L., 1753 ***Saule marsault, Saule des chèvres***
Salix cinerea L., 1753 ***Saule cendré***
Salix eleagnos Scop., 1772 ***Saule drapé***
Salix fragilis L., 1753 ***Saule fragile***
Salix purpurea L., 1753 ***Osier rouge, Osier pourpre***
Salix triandra L., 1753 ***Saule à trois étamines, Osier brun***
Salix viminalis L., 1753 ***Osier blanc***
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888 ***Muguet des pampas***
Salsola soda L., 1753 ***Soude commune***
Salvia aethiopis L., 1753 ***Sauge d'Éthiopie***
Salvia microphylla Kunth, 1818 ***Sauge à petites feuilles***
Salvia officinalis L., 1753 ***Sauge officinale***
Salvia officinalis subsp. gallica (W.Lippert) Reales, D.Rivera & Obón, 2004 ***Sauge de France***
Salvia pratensis L., 1753 ***Sauge des prés, Sauge commune***
Salvia sclarea L., 1753 ***Sauge sclarée, Orvale***
Salvia verbenaca L., 1753 ***Sauge fausse-verveine***
Salvia verbenaca subsp. clandestina (L.) Batt., 1890
Salvia verbenaca subsp. verbenaca L., 1753
Salvia verticillata L., 1753 ***Sauge verticillée***
Salvia virgata Jacq., 1770
Salvia viridis L., 1753 ***Sauge verte***
Sambucus ebulus L., 1753 ***Sureau yèble, Herbe à l'aveugle***
Sambucus nigra L., 1753 ***Sureau noir, Sampéchier***
Samolus valerandi L., 1753 ***Samole de Valerand, Mouron d'eau***
Sanguisorba officinalis L., 1753 ***Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale***
Sanicula europaea L., 1753 ***Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes***
Santolina decumbens Mill., 1768 ***Camomille de Mahon***
Santolina virens Mill., 1768
Saponaria ocymoides subsp. ocymoides L., 1753 ***Saponaire faux Basilic***
Saponaria officinalis L., 1753 ***Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon***
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, 1978 ***Salicorne en buisson***
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott, 1978 ***Salicorne vivace***
Satureja hortensis L., 1753 ***Sarriette annuelle***
Satureja montana L., 1753 ***Sarriette de montagne***
Saxifraga callosa Sm., 1791 ***Saxifrage à feuilles en languette***
Saxifraga fragosoi Sennen, 1929 ***Saxifrage continentale***
Saxifraga granulata L., 1753 ***Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle***
Saxifraga tridactylites L., 1753 ***Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage***
Scabiosa ochroleuca L., 1753 ***Scabieuse vert jaunatre, Scabieuse jaune pâle***
Scabiosa triandra L., 1753 ***Scabieuse à trois étamines, Scabieuse de Gramont***
Scandix australis subsp. australis L., 1753 ***Scandix du Midi***
Scandix pecten-veneris L., 1753 ***Scandix Peigne-de-Vénus***
Scandix pecten-veneris subsp. hispanica (Boiss.) Bonnier & Layens, 1894 ***Scandix d'Espagne***
Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris L., 1753 ***Scandix Peigne-de-Vénus***
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 ***Fétuque Roseau***
Schedonorus arundinaceus subsp. uechtritzianus (Wiesb.) H.Scholz & Valdés, 2007
Schedonorus interruptus (Desf.) Tzvelev, 1998 ***Fétuque Fenasse***
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 ***Fétuque des prés***
Schedonorus pratensis subsp. pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 ***Fétuque des prés***
Schenkia spicata (L.) G.Mans., 2004 ***Petite-centaurée en épis***
Schinus molle L., 1753 ***Faux Poivrier, Poivrier du Pérou***
Schismus barbatus (L.) Thell., 1907 ***Schismus barbu***
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 ***Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers***
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla, 1888 ***Scirpe du littoral, Souchet du littoral, Scirpe littoral***
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888 ***Scirpe mucroné, Scirpe à écailles mucronées***
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888 ***Scirpe piquant, Souchet piquant***

Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888 ***Scirpe couché***
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888 ***Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus***
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888 ***Scirpe triquètre, Scirpe à tige trigone, Scirpe à trois angles***
Schoenus nigricans L., 1753 ***Choin noirâtre***
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 ***Scirpe-jonc***
Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) Soják, 1972 ***Scirpe du Midi***
Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus (L.) Soják, 1972 ***Scirpe-jonc***
Scirpus sylvaticus L., 1753 ***Scirpe des bois, Scirpe des forêts***
Scleranthus annuus subsp. annuus L., 1753
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv., 1812 ***Schlérochloa raide***
Scolymus grandiflorus Desf., 1799 ***Scolyme à grandes fleurs***
Scolymus hispanicus L., 1753 ***Scolyme d'Espagne, Chardon d'Espagne***
Scolymus maculatus L., 1753 ***Scolyme maculé, Scolyme taché***
Scorpiurus subvillosus L., 1753 ***Scorpiure***
Scorpiurus sulcatus L., 1753
Scorzonera austriaca subsp. bupleurifolia (Pouzolz ex Timb.-Lagr. & Jeanb.) Bonnier, 1923 ***Scorsonère à feuilles de buplèvre, Scorzonère à feuilles de Buplèvre***
Scorzonera hirsuta L., 1771 ***Scorsonère à feuilles poilues, Scorzonère hirsute***
Scorzonera hispanica subsp. asphodeloides (Wallr.) Arcang., 1882 ***Scorsonère***
EN Scorzonera parviflora Jacq., 1776 ***Scorzonère à petites fleurs***
Scrophularia auriculata L., 1753 ***Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis***
Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) Gamisans, 1992 ***Herbe aux écrouelles***
Scrophularia peregrina L., 1753 ***Scrophulaire voyageuse***
Scrophularia provincialis Rouy, 1909
Scutellaria galericulata L., 1753 ***Scutellaire casquée, Scutellaire à casque***
Sedum acre L., 1753 ***Poivre de muraille, Orpin acre***
Sedum album L., 1753 ***Orpin blanc***
Sedum caespitosum (Cav.) DC., 1828 ***Orpin rougeâtre, Sédum rougeâtre***
Sedum dasyphyllum L., 1753 ***Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses***
Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC., 1828
Sedum litoreum Guss., 1826 ***Orpin du littoral, Orpin des rivages***
Sedum ochroleucum Chaix, 1785 ***Orpin à pétales droits***
Sedum rubens L., 1753 ***Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre***
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 ***Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice***
Sedum sexangulare L., 1753 ***Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles***
Selaginella denticulata (L.) Spring, 1838 ***Sélaginelle denticulée***
Sempervivum calcareum Jord., 1849 ***Joubarbe des terrains calcaires***
Sempervivum tectorum L., 1753 ***Joubarbe des toits, Grande joubarbe***
Senecio angulatus L.f., 1782 ***Séneçon anguleux***
Senecio doria L., 1759 ***Séneçon Doria, Herbe dorée***
Senecio gallicus Vill., 1785 ***Séneçon de Gaule, Séneçon de France***
Senecio gerardi Gren. & Godr., 1850 ***Séneçon de Gérard***
Senecio inaequidens DC., 1838 ***Séneçon sud-africain***
Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius (Willd.) Ball, 1878
Senecio lividus L., 1753 ***Séneçon livide***
Senecio vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 ***Séneçon commun***
Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., 1847 ***Séquoia Redwood, Séquoia sempervirent***
Serapias lingua L., 1753 ***Sérapias langue, Sérapias à languette***
Serapias neglecta De Not., 1844 ***Sérapias négligé***
Serapias parviflora Parl., 1837 ***Sérapias à petites fleurs***
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910 ***Sérapias en soc, Sérapias à labelle long***
Serratula tinctoria L., 1753 ***Serratule des teinturiers, Sarrette***
Sesamum indicum L., 1753 [nom. cons.]
Seseli galloprovinciale Reduron, 1993 ***Séséli de Provence***
Seseli longifolium L., 1759 ***Séséli à feuilles allongées, Séséli élevé***
Seseli longifolium subsp. intermedium Reduron, 2008
Seseli longifolium subsp. longifolium L., 1759 ***Séséli élevé***
Seseli tortuosum L., 1753 ***Séséli tortueux***
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 ***Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue***
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov., 1919 ***Sétaire***
Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 ***Millet des oiseaux***
Setaria italica subsp. italica (L.) P.Beauv., 1812
Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981 ***Sétaire dense***
Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912 ***Sétaire verte***
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987 ***Sétaire à petites fleurs***
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 ***Sétaire glauque, Sétaire naine***
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812 ***Sétaire verticillée, Panic verticillé***
Sherardia arvensis L., 1753 ***Rubéole des champs, Gratteron fleuri***
Sideritis hyssopifolia subsp. hyssopifolia L., 1753 ***Thé des montagnes***
Sideritis montana L., 1753 ***Crapaudine des montagnes***
Sideritis provincialis (Jord. & Fourr. ex Rouy) Coulomb & J.-M.Tison, 2010
Sideritis romana L., 1753 ***Crapaudine romaine, Thé de campagne***
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 ***Silaüs des prés, Cumin des prés***
Silene baccifera (L.) Roth, 1788 ***Cucubale couchée***
● Silene badaroi Breistr., 1966 ***Silène de Salzmann, Silène de Badaro***
Silene conica L., 1753 ***Silène conique***
Silene conoidea L., 1753 ***Silène conoïde***
Silene cretica L., 1753 ***Silène de Crète***
Silene dichotoma Ehrh., 1792 ***Silène bifurqué***
Silene gallica L., 1753 ***Silène de France, Silène d'Angleterre***
Silene italica (L.) Pers., 1805 ***Silène d'Italie***
Silene latifolia Poir., 1789 ***Compagnon blanc, Silène à feuilles larges***
Silene muscipula L., 1753 ***Silène attrape-mouches***
Silene noctiflora L., 1753 ***Silène de nuit***
Silene nocturna L., 1753 ***Silène nocturne***
Silene nutans subsp. nutans L., 1753 ***Silène penché***
Silene otites (L.) Wibel, 1799 ***Silène cure-oreille, Silène à oreillettes***
Silene paradoxa L., 1763 ***Silène***
Silene pendula L., 1753 ***Silène pendant, Silène à fleurs penchées***
Silene saxifraga L., 1753 ***Silène saxifrage***
Silene sedoides Poir., 1789 ***Silène faux-orpin, Silène faux-sédum***
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 ***Silène enflé, Tapotte***
Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke, 1869 ***Tapotte***
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 ***Chardon marie, Chardon marbré***
Sinapis alba L., 1753 ***Moutarde blanche***
Sinapis arvensis L., 1753 ***Moutarde des champs, Raveluche***
Sison amomum L., 1753 ***Sison, Sison amome, Sison aromatique***
Sisymbrella aspera subsp. aspera (L.) Spach, 1838 ***Cresson âpre, Cresson rude***
Sisymbrium altissimum L., 1753 ***Sisymbre fausse moutarde***
Sisymbrium assoanum Loscos & J.Pardo, 1863
Sisymbrium erysimoides Desf., 1799 ***Vélar***
Sisymbrium irio L., 1753 ***Vélaret, Sisymbre Irio***
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 ***Herbe aux chantres, Sisymbre officinal***
Sisymbrium orientale subsp. orientale L., 1756 ***Sisymbre d'Orient***
EN Sisymbrium polyceratium L., 1753 ***Sisymbre à nombreuses cornes***
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC., 1821 ***Sisymbre ronciné, Vélar ronciné***
Sisyrinchium angustifolium Mill., 1768 ***Bermudienne à feuilles étroites***
Sium latifolium L., 1753 ***Berle à larges feuilles, Grande berle***
Smilax aspera L., 1753 ***Salsepareille, Liseron épineux***
Smyrnium olusatrum L., 1753 ***Maceron cultivé***
Solanum bonariense L., 1753 ***Morelle de Buenos Aires***
Solanum chacoense Bitter, 1912
Solanum chenopodioides Lam., 1794 ***Morelle faux chénopode, Morelle sublobée***
Solanum dimidiatum Raf., 1840
Solanum dulcamara L., 1753 ***Douce amère, Bronde***
Solanum elaeagnifolium Cav., 1795 ***Morelle à feuilles de chalef***
Solanum laciniatum Aiton, 1789 ***Morelle laciniée***
Solanum lycopersicum L., 1753 ***Pomme d'amour***
EN Solanum nigrum L., 1753 ***Morelle noire***
Solanum rostratum Dunal, 1813 ***Morelle***
Solanum sarachoides Sendtn., 1846 ***Morelle fausse Saracha***
Solanum sisymbriifolium Lam., 1794
Solanum triflorum Nutt., 1818
Solanum villosum Mill., 1768 ***Morelle poilue***
Solanum villosum subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds, 1984 ***Morelle ailée***
Solanum villosum subsp. villosum Mill., 1768 ***Morelle poilue***
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, 1964 ***Soleirole de Soleirol, Helxine de Soleirol***
Solenanthus lanatus A.DC., 1846
Solidago canadensis L., 1753 ***Solidage du Canada, Gerbe-d'or***
Solidago gigantea Aiton, 1789 ***Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante***
Solidago virgaurea L., 1753 ***Solidage verge d'or, Herbe des Juifs***
Solidago virgaurea subsp. virgaurea L., 1753 ***Herbe des Juifs***
Sonchus arvensis subsp. arvensis L., 1753 ***Laiteron des champs***
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 ***Laiteron rude, Laiteron piquant***
Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill, 1769 ***Laiteron piquant***
Sonchus asper subsp. glaucescens (Jord.) P.W.Ball, 1878 ***Laiteron glauque***
Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter, 2003 ***Crépis bulbeux***
Sonchus maritimus L., 1759 ***Laiteron maritime***
Sonchus oleraceus L., 1753 ***Laiteron potager, Laiteron lisse***
Sonchus tenerrimus L., 1753 ***Laiteron délicat***
Sophora japonica L., 1767 ***Sophora du Japon, Arbre de miel***
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 ***Alouchier, Alisier blanc***
Sorbus domestica L., 1753 ***Cormier, Sorbier domestique***
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 ***Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier***
Sorghum bicolor (L.) Moench, 1794 ***Sorgho commun, Millet à balai***
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 ***Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba***
Sorghum x tzvelevii Carreras, 1986
Sparganium emersum Rehmann, 1871 ***Rubanier émergé***
Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) K.Richt., 1890
Spartina patens (Aiton) Muhl., 1813 ***Spartine bigarrée***
Spartium junceum L., 1753 ***Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc***
Spergula arvensis L., 1753 ***Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle***
Spergula bocconii (Scheele) Pedersen, 1984 ***Spergulaire de Boccone***
EN Spergula diandra (Guss.) Murb., 1897 ***Spergulaire à deux étamines***
Spergula heldreichii (Foucaud ex E.Simon & P.Monnier) G.López, 2010 ***Spergulaire de Heldreich***
Spergula marina (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825 ***Spergulaire du sel***
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825 ***Spergulaire marginée***
Spergula nicaeensis (Sarato ex Burnat) G.López, 2010 ***Spergulaire de Nice***
Spergula pentandra L., 1753 ***Espargoutte à cinq étamines***
Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 ***Sabline rouge***
Spergula tangerina (P.Monnier) G.López, 2010 ***Spergulaire de Tanger***
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb., 1830 ***Sphénope***
● Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 ***Spiranthe d'été***
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 ***Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée***
Spirobassia hirsuta (L.) Freitag & G.Kadereit, 2011 ***Bassia hirsute***
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839 ***Spirodèle à plusieurs racines***
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 ***Sporobole fertile, Sporobole tenace***
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth, 1829 ***Sporobole piquant***
Stachys annua (L.) L., 1763 ***Épiaire annuelle***
EN ● Stachys brachyclada Noë ex Coss., 1854 ***Épiaire à rameaux courts***
Stachys byzantina K.Koch, 1848 ***Épiaire laineuse, Épiaire de Byzance***
Stachys germanica L., 1753 ***Épiaire d'Allemagne, Sauge molle***
Stachys germanica subsp. germanica L., 1753 ***Sauge molle***
Stachys germanica subsp. salviifolia (Ten.) Gams, 1927 ***Épiaire à feuilles de Sauge***
EN Stachys maritima Gouan, 1764 ***Épiaire maritime***
● Stachys ocymastrum (L.) Briq., 1893 ***Épiaire hérissée***
Stachys palustris L., 1753 ***Épiaire des marais, Ortie bourbière***
Stachys recta L., 1767 ***Épiaire droite***
Stachys sylvatica L., 1753 ***Épiaire des bois, Ortie à crapauds***
Staehelina dubia L., 1753 ***Stéhéline douteuse***
Stellaria media (L.) Vill., 1789 ***Mouron des oiseaux, Morgeline***
Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863 ***Mouron pâle, Stellaire pâle, Stellaire sans pétales***
EN ● Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit., 1805 ***Stenbergie à fleurs de colchique***
Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng., 1825 ***Stenbergie jaune, Vendangeuse jaune***
Sternbergia sicula Tineo ex Guss., 1844
Stipa capillata L., 1762 ***Plumet chevelue, Stipe capillaire***
Stipa eriocaulis Borbás, 1878 ***Stipe à tige laineuse, Stipe de France***
Stipa gallica ?elak., 1883 ***Stipe de Paris***
Stipa iberica Martinovský, 1966 ***Plumet d'Espagne, Stipe ibère***
Stipa offneri Breistr., 1950 ***Stipe d'Offner***
Stipella capensis (Thunb.) Röser & Hamasha, 2012
Stipella parviflora (Desf.) Röser & Hamasha, 2012
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912 ***Potamot de Suisse***
Suaeda maritima (L.) Dumort., 1827 ***Soude maritime, Suéda maritime***
Suaeda splendens (Pourr.) Gren. & Godr., 1855 ***Suaeda splendente***
Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 ***Soude vraie, Suéda fruticuleux***
Succisa pratensis Moench, 1794 ***Succise des prés, Herbe du Diable***
Swertia perennis L., 1753 ***Swertie pérenne, Swertie vivace***
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Symphytum officinale L., 1753 ***Grande consoude***
Symphytum orientale L., 1753 ***Consoude d'Orient***
Symphytum tuberosum L., 1753 ***Consoude à tubercules***
Syringa vulgaris L., 1753 ***Lilas***
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, 1934 ***Taéniathérum tête-de-méduse, Tête-de-méduse***
Tamarix gallica L., 1753 ***Tamaris de France, Tamaris commun***
Tamarix parviflora DC., 1828 ***Tamaris à petites fleurs***
Tamarix ramosissima Ledeb., 1829 ***Tamaris très ramifié***
Tanacetum balsamita L., 1753 ***Menthe-coq***
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844 ***Pyrèthre, Tanaisie à feuilles de cinéraire***
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844 ***Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes, Chrysanthème en corymbe***
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844 ***Grande camomille, Tanaisie Parthénium***
Tanacetum vulgare L., 1753 ***Tanaisie commune, Sent-bon***
Taraxacum aginnense Hofstra, 1985 ***Pissenlit***
Taraxacum autumnale Castagne, 1845 ***Pissenlit d'automne***
Taraxacum ciliare Soest, 1965 ***Pissenlit***
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, 1821 ***Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses***
Taraxacum gaditanum Talavera, 1986
Taraxacum leucospermum Jord., 1848 ***Pissenlit de Hoppe, Pissenlit à graines blanches***
Taraxacum mediterraneum Soest, 1954 ***Pissenlit de la Méditerranée***
Taraxacum minimum (V.Brig. ex Guss.) N.Terracc., 1869 ***Pissenlit***
Taraxacum obovatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC., 1809 ***Pissenlit à feuilles obovales***
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 ***Pissenlit***

Taraxacum oxoniense Dahlst., 1923 ***Pissenlit***
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst., 1906 ***Pissenlit***
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810 ***Cyprès chauve***
Taxus baccata L., 1753 ***If à baies***
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell., 1912 ***Teesdalie à feuilles en corne de Cerf***
Telephium imperati L., 1753 ***Téléphium d'Impérato***
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze, 1891
Teucrium aureum Schreb., 1773 ***Germandrée dorée***
Teucrium botrys L., 1753 ***Germandrée botryde***
Teucrium chamaedrys L., 1753 ***Germandrée petit-chêne, Chênette***
Teucrium dunense Sennen, 1925 ***Germandrée des dunes***
Teucrium flavum subsp. flavum L., 1753 ***Germandrée jaune***
EN Teucrium fruticans L., 1753 ***Germandrée arbustive***
Teucrium montanum L., 1753 ***Germandrée des montagnes***
Teucrium polium L., 1753 ***Germandrée Polium***
Teucrium polium subsp. polium L., 1753 ***Germandrée Polium***
Teucrium polium subsp. purpurascens (Benth.) S.Puech, 1976 ***Germandrée polium, Germandrée purpurine, Herbe des îles***
EN Teucrium pseudochamaepitys L., 1753 ***Germandrée à allure de pin, Germandrée faux petit pin***
Teucrium scordium L., 1753 ***Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau***
Teucrium scorodonia L., 1753 ***Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine***
Thalictrum flavum L., 1753 ***Pigamon jaune, Pigamon noircissant***
Thalictrum lucidum L., 1753 ***Pigamon méditerranéen***
Thalictrum minus subsp. saxatile Ces., 1844 ***Pigamon des rochers, Petit pigamon des rochers, Pigamon du mont Olympe***
Thapsia villosa L., 1753 ***Thapsie***
Theligonum cynocrambe L., 1753 ***Cynocrambe, Théligone Chou-de-chien***
Thelypteris palustris Schott, 1834 ***Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages***
Thesium humifusum subsp. divaricatum (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894 ***Thésium divariqué***
Thlaspi arvense L., 1753 ***Tabouret des champs, Monnoyère***
Thuja occidentalis L., 1753 ***Thuya du Canada, Thuya d'Occident***
Thymelaea hirsuta (L.) Endl., 1847 ***Passerine hérissée, Passerine hirsute***
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 ***Passerine annuelle, Langue-de-moineau***
Thymelaea passerina subsp. passerina (L.) Coss. & Germ., 1861
Thymelaea passerina subsp. pubescens (Guss.) Meikle, 1985 ***Passerine***
Thymelaea sanamunda All., 1785 ***Herbe du mont Serrat***
Thymelaea tartonraira subsp. tartonraira (L.) All., 1785 ***Passerine tartonraire***
Thymus embergeri Roussine, 1952 ***Thym d'Emberger***
Thymus pulegioides L., 1753 ***Thym commun, Thym faux Pouliot***
Thymus vulgaris L., 1753 ***Thym commun, Farigoule***
Tilia cordata Mill., 1768 ***Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois***
Tilia platyphyllos Scop., 1771 ***Tilleul à grandes feuilles***
Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 1861 ***Épervière à feuilles de statice***
Tolpis umbellata Bertol., 1803 ***OEil-du-Christ***
Tordylium apulum L., 1753 ***Tordyle des Pouilles***
Tordylium maximum L., 1753 ***Tordyle majeur***
Torilis africana Spreng., 1815 ***Torilis pourpre***
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 ***Torilis des champs***
Torilis arvensis subsp. arvensis (Huds.) Link, 1821 ***Torilis des champs***
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 ***Torilis faux-cerfeuil, Grattau***
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f., 1867 ***Torilis à folioles étroites, Torilis à feuilles étroites***
Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788 ***Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse***
Torilis nodosa subsp. nodosa (L.) Gaertn., 1788 ***Torilis noueuse***
Trachelium caeruleum L., 1753 ***Trachélium bleu***
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862 ***Palmier de Chusan***
Tradescantia fluminensis Vell., 1829 ***Éphémère de Rio***

Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd., 1803 ***Salsifis à feuilles étroites***
Tragopogon crocifolius L., 1759 ***Salsifis à feuilles de crocus***
Tragopogon dubius Scop., 1772 ***Grand salsifis, Salsifis douteux***
Tragopogon porrifolius subsp. porrifolius L., 1753
Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) ?elak., 1871 ***Salsifis d'Orient***
Tragus racemosus (L.) All., 1785 ***Bardanette en grappe, Bardanette rameuse***
Tribulus terrestris L., 1753 ***Croix de Malte, Tribule terrestre***
Trifolium alpestre L., 1763 ***Trèfle alpestre***
Trifolium angustifolium L., 1753 ***Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard***
Trifolium arvense L., 1753 ***Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre***
Trifolium campestre Schreb., 1804 ***Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance***
Trifolium cherleri L., 1755 ***Trèfle de Cherler***
Trifolium dubium Sibth., 1794 ***Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune***
Trifolium echinatum M.Bieb., 1808
Trifolium fragiferum L., 1753 ***Trèfle Porte-fraises***
Trifolium glomeratum L., 1753 ***Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules***
Trifolium hybridum L., 1753 ***Trèfle hybride, Trèfle bâtard***
Trifolium isthmocarpum Brot., 1816 ***Trèfle de Jamin***
Trifolium lappaceum L., 1753 ***Trèfle fausse-bardane***
Trifolium micranthum Viv., 1824 ***Trèfle à petites fleurs***
Trifolium nigrescens Viv., 1808 ***Trèfle noircissant***
Trifolium ochroleucon Huds., 1762 ***Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle***
Trifolium ornithopodioides L., 1753 ***Trèfle faux Pied-d'oiseau***
Trifolium pallidum Waldst. & Kit., 1802 ***Trèfle pâle***
Trifolium patens Schreb., 1804 ***Trèfle étalé***
Trifolium pratense L., 1753 ***Trèfle des prés, Trèfle violet***
Trifolium purpureum Loisel., 1807 ***Trèfle pourpre***
Trifolium repens L., 1753 ***Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande***
Trifolium resupinatum L., 1753 ***Trèfle renversé, Trèfle de Perse***
Trifolium rubens L., 1753 ***Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré***
Trifolium scabrum L., 1753 ***Trèfle rude, Trèfle scabre***
Trifolium scabrum subsp. lucanicum (Guss.) Arcang., 1894 ***Trèfle de Lucanie***
Trifolium scabrum subsp. scabrum L., 1753 ***Trèfle scabre***
Trifolium spumosum L., 1753 ***Trèfle écumeux***
Trifolium squamosum L., 1759 ***Trèfle écailleux***
Trifolium squarrosum L., 1753 ***Trèfle écailleux, Trèfle raboteux***
Trifolium stellatum L., 1753 ***Trèfle étoilé***
Trifolium striatum L., 1753 ***Trèfle strié***
Trifolium subterraneum L., 1753 ***Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur***
Trifolium suffocatum L., 1771 ***Trèfle étranglé***
Trifolium tomentosum L., 1753 ***Trèle tomenteux, Trèfle cotonneux***
Trifolium uniflorum L., 1753
Triglochin barrelieri Loisel., 1807 ***Troscart de Barrelier***
Triglochin maritima L., 1753 ***Troscart maritime***
Triglochin palustris L., 1753 ***Troscart des marais***
Trigonella attissima (Thuill.) Coulot & Rabaute, 2013
Trigonella caerulea (L.) Ser., 1825
Trigonella elegans (Salzmann ex Ser.) Coulot & Rabaute, 2013
Trigonella esculenta Willd., 1809 ***Trigonelle comestible***
Trigonella foenum-graecum L., 1753 ***Trigonelle Fenugrec***
Trigonella gladiata Steven ex M.Bieb., 1808 ***Trigonelle armée, Trigonelle à fruits en glaive***
Trigonella infesta (Seringe) Coulot & Rabaute, 2013
Trigonella italica (L.) Coulot & Rabaute, 2013
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 2013
Trigonella segetalis (Brotero) Coulot & Rabaute, 2013
Trigonella sicula (Turra) Rabaute & Coulot, 2013
Trigonella sulcata (Desf.) Coulot & Rabaute, 2013

Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute, 2013
Trinia glauca (L.) Dumort., 1827 ***Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire***
Tripidium ravennae (L.) H.Scholz, 2006 ***Canne d'Italie***
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 ***Matricaire inodore***
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr., 1868 ***Anthyllis à quatre feuilles***
Tripolium pannonicum subsp. pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962
Trisetaria aurea (Ten.) Pignatti, 1955
Trisetaria loeflingiana (L.) Paunero, 1950
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero, 1950 ***Trisète à feuilles de Panic***
Trisetum flavescens subsp. flavescens (L.) P.Beauv., 1812 ***Avoine dorée***
Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub, 1963 ***Iphéion***
Triticum aestivum subsp. aestivum L., 1753
Triticum monococcum L., 1753 ***Petit épeautre, Blé-riz***
Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn., 1899 ***Blé d'Afrique***
Tropaeolum majus L., 1753 ***Grande capucine, Capucine à grandes fleurs***
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 ***Hélianthème taché***
Tulipa agenensis DC., 1804 ***Tulipe oeil-de-soleil, Tulipe d'Agen, Tulipe de Lortet***
Tulipa clusiana DC., 1804 ***Tulipe de l'Écluse, Tulipe de Perse***
EN Tulipa gesneriana L., 1753 ***Tulipe de Gesner***
Tulipa lortetii Jord., 1858 ***Tulipe de Lortet***
Tulipa raddii Reboul, 1822 ***Tulipe précoce***
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp., 1914 ***Tulipe des Alpes, Tulipe du Midi***
Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753 ***Tulipe sauvage, sous-espèce type, Tulipe des bois***
EN Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 ***Turgénie à larges feuilles, Caucalis à feuilles larges, Tordyle à larges feuilles***
Tussilago farfara L., 1753 ***Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin***
Typha angustifolia L., 1753 ***Massette à feuilles étroites***
Typha domingensis Pers., 1807 ***Massette australe***
Typha latifolia L., 1753 ***Massette à larges feuilles***
Typha laxmannii Lepech., 1801 ***Massette de Laxmann***
Typha minima Funck, 1794 ***Petite massette, Massette grêle***
Tyrimnus leucographus (L.) Cass., 1826 ***Tyrimne à taches blanches***
Ulex parviflorus Pourr., 1788 ***Ajonc à petites fleurs, Ajonc de Provence***
Ulmus glabra Huds., 1762 ***Orme glabre***
Ulmus laevis Pall., 1784 ***Orme lisse, Orme blanc***
Ulmus minor Mill., 1768 ***Petit orme, Orme cilié***
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 ***Nombril de vénus, Oreille-d'abbé***
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 ***Urosperme de Dalechamps***
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 ***Urosperme fausse Picride***
Urtica dioica L., 1753 ***Ortie dioïque, Grande ortie***
Urtica dioica subsp. dioica L., 1753 ***Ortie dioïque***
Urtica membranacea Poir., 1798 ***Ortie à membranes, Ortie douteuse***
Urtica pilulifera L., 1753 ***Ortie à pilules***
Urtica urens L., 1753 ***Ortie brulante, Ortie grièche***
Utricularia australis R.Br., 1810 ***Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire***
Utricularia minor L., 1753 ***Petite utriculaire, Utriculaire mineure***
Utricularia vulgaris L., 1753 ***Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune***
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965 ***Saponaire des vaches, Vaccaire d'Espagne***
Valantia muralis L., 1753 ***Vaillantie des murs***
Valeriana officinalis L., 1753 ***Valériane officinale, Valériane des collines***
Valeriana phu L., 1753 ***Valériane***
Valeriana tuberosa L., 1753 ***Valériane tubéreuse***
Valerianella coronata (L.) DC., 1805 ***Mâche couronnée, Valérianelle couronnée***
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776 ***Mâche dentée, Doucette dentée***
Valerianella discoidea (L.) Loisel., 1810 ***Mâche discoïde, Mâche à disque***
EN Valerianella echinata (L.) DC., 1805 ***Mâche à piquants, Mâche hérisson***

Valerianella eriocarpa Desv., 1809 ***Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus***
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 ***Mache doucette, Mache***
Valerianella microcarpa Loisel., 1810 ***Mâche à petits fruits, Valérianelle à petits fruits***
Valerianella vesicaria (L.) Moench, 1794
Vallisneria spiralis L., 1753 ***Vallisnérie en spirale, Vallisnérie***
Velezia rigida L., 1753 ***Vélézia raide***
Verbascum blattaria L., 1753 ***Molène blattaire, Herbe aux mites***
Verbascum boerhavii L., 1767 ***Molène de Boerhaave, Molène de mai***
Verbascum chaixii Vill., 1779 ***Molène de Chaix***
Verbascum creticum (L.) Kuntze, 1891 ***Molène de Crète***
Verbascum densiflorum Bertol., 1810 ***Molène faux-bouillon-blanc, Molène à fleurs denses***
Verbascum nigrum L., 1753 ***Molène noire, Cierge maudit***
Verbascum orientale (L.) All., 1785 ***Molène d'Orient***
Verbascum phlomoides L., 1753 ***Molène faux-phlomide, Molène faux Phlomis***
Verbascum phoeniceum L., 1753
Verbascum pulverulentum Vill., 1779 ***Molène pulvérulente***
Verbascum sinuatum L., 1753 ***Molène sinuée***
Verbascum thapsus L., 1753 ***Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre***
Verbena brasiliensis Vell., 1829
Verbena officinalis L., 1753 ***Verveine officinale***
Veronica anagallis-aquatica L., 1753 ***Mouron aquatique, Mouron d'eau***
Veronica anagalloides Guss., 1826 ***Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron***
Veronica arvensis L., 1753 ***Véronique des champs, Velvote sauvage***
Veronica beccabunga L., 1753 ***Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux***
Veronica catenata Pennell, 1921 ***Véronique aquatique***
Veronica chamaedrys L., 1753 ***Véronique petit chêne, Fausse Germandrée***
Veronica cymbalaria Bodard, 1798 ***Véronique cymbalaire***
Veronica filiformis Sm., 1791 ***Véronique filiforme***
Veronica hederifolia L., 1753 ***Véronique à feuilles de lierre***
Veronica officinalis L., 1753 ***Véronique officinale, Herbe aux ladres***
Veronica orsiniana Ten., 1830 ***Véronique douteuse***
Veronica persica Poir., 1808 ***Véronique de Perse***
Veronica polita Fr., 1819 ***Véronique luisante, Véronique brillante***
Veronica praecox All., 1789 ***Véronique précoce***
Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia L., 1753 ***Véronique à feuilles de Serpolet***
Veronica triloba (Opiz) A.Kern., 1896 ***Véronique à feuilles trilobées***
Veronica triphyllos L., 1753 ***Véronique à feuilles trilobées, Véronique à trois lobes***
Viburnum lantana L., 1753 ***Viorne mancienne***
Viburnum tinus L., 1753 ***Viorne tin, Fatamot***
Vicia amphicarpa L., 1763 ***Vesce à fruits dimorphes***
Vicia angustifolia L., 1759 ***Vesce à feuilles étroites***
Vicia benghalensis L., 1753 ***Vesce du Bengale***
Vicia bithynica (L.) L., 1759 ***Vesce de Bithynie***
Vicia cracca L., 1753 ***Vesce cracca, Jarosse***
Vicia dalmatica A.Kern., 1886 ***Vesce de Dalmatie***
Vicia dasycarpa Ten., 1829 ***Vesce à gousses velues***
Vicia elegantissima Shuttlew. ex Rouy, 1883 ***Vesce élégante***
Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy, 1900
Vicia faba L., 1753 ***Vesce Fève***
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821
Vicia hybrida L., 1753 ***Vesce hybride***
Vicia incana Gouan, 1764 ***Vesce blanchâtre***
Vicia johannis Tamamsch., 1954 ***Vesce de Johann***
Vicia lathyroides L., 1753 ***Vesce printannière, Vesce fausse Gesse***
Vicia lutea L., 1753 ***Vesce jaune***
Vicia lutea subsp. vestita (Boiss.) Rouy, 1899
Vicia macrocarpa (Moris) Bertol., 1850 ***Vesce à gros fruits***

Vicia monantha Retz., 1783 ***Vesce à une fleur, Vesce éperonnée***
Vicia narbonensis L., 1753 ***Vesce de Narbonne***
Vicia onobrychioides L., 1753 ***Vesce fausse esparcette, Vesce faux Sainfoin***
Vicia peregrina L., 1753 ***Vesce voyageuse***
Vicia sallei Timb.-Lagr., 1867
Vicia saxatilis (Vent.) Tropea, 1907 ***Gesse des rochers***
Vicia segetalis Thuill., 1799 ***Vesce des moissons***
Vicia sepium L., 1753 ***Vesce des haies***
Vicia serratifolia Jacq., 1778 ***Vesce à feuilles dentées en scie***
Vicia sicula (Raf.) Guss., 1844 ***Vesce de Sicile***
Vicia tenuifolia Roth, 1788 ***Vesce à petites feuilles***
Vicia villosa Roth, 1793 ***Vesce velue, Vesce des sables***
Vinca difformis Pourr., 1788 ***Pervenche intermédiaire***
Vinca major L., 1753 ***Grande pervenche***
Vinca minor L., 1753 ***Petite pervenche, Violette de serpent***
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 ***Dompte-venin***
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, 1802 ***Dompte-venin noir***
Viola alba Besser, 1809 ***Violette blanche***
Viola arborescens L., 1753 ***Violette sous-arbustive, Violette ligneuse***
Viola arvensis Murray, 1770 ***Pensée des champs***
Viola hirta L., 1753 ***Violette hérissée***
Viola jordanii Hanry, 1853 ***Violette de Jordan***
Viola kitaibeliana Schult., 1819 ***Pensée de Kitaibel***
Viola odorata L., 1753 ***Violette odorante***
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 ***Violette des bois, Violette de Reichenbach***
Viola riviniana Rchb., 1823 ***Violette de Rivinus, Violette de rivin***
Viola suavis M.Bieb., 1819 ***Violette suave***
Viscum album subsp. album L., 1753 ***Gui des feuillus***
Visnaga daucoides Gaertn., 1788 ***Ammi visnage, Herbe-aux-cure-dents, Herbe-aux-gencives, Ammi cure-dent***
Vitex agnus-castus L., 1753 ***Gattilier, Poivre sauvage***
Vitis riparia Michx., 1803
Vitis rupestris Scheele, 1848 ***Vigne des rochers***
Vitis vinifera L., 1753 ***Vigne cultivée***
Vitis vinifera subsp. vinifera L., 1753 ***Vigne cultivée***
Vogtia annua (L.) Oberpr. & Sonboli, 2012 ***Tanaisie annuelle***
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 ***Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome***
Vulpia ciliata subsp. ciliata Dumort., 1824 ***Vulpie ciliée***
Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch, 1909 ***Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume***
Vulpia ligustica (All.) Link, 1827 ***Vulpie de Ligurie***
Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824 ***Vulpie à une seule glume, Vulpie des dunes***
Vulpia muralis (Kunth) Nees, 1843 ***Vulpie à longue arête, Vulpie des murs***
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 ***Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris***
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978 ***Vulpie unilatérale***
Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary, 1879 ***Palmier à jupon***
x Pseudosasa x japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925
Xanthium orientale L., 1763 ***Lampourde à gros fruits***
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003 ***Lampourde à gros fruits***
Xanthium spinosum L., 1753 ***Lampourde épineuse***
Xanthium strumarium L., 1753 ***Lampourde glouteron***
Xeranthemum annuum L., 1753
Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813 ***Xéranthème fétide***
Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768 ***Immortelle à fleurs fermées***
Yucca aloifolia L., 1753
Yucca gloriosa L., 1753 ***Yucca***
Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882
Zannichellia peltata Bertol., 1855 ***Zannichellie peltée***
Zea mays L., 1753 ***Maïs***
Zelkova crenata Spach
Ziziphus jujuba Mill., 1768
Zostera marina L., 1753 ***Zostère maritime, Varech des bords de mer, Varech marin***
Zostera noltei Hornem., 1832 ***Varech de Nolti, Zostère naine***
Zygophyllum fabago L., 1753 ***Fabagelle***

BRYOPHYTES

Acaulon triquetrum (Spruce) Müll.Hal., 1847
Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb., 1883
Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr., 1888
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., 1853
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818
Apopellia endiviifolia (Dicks.) Nebel & D.Quandt, 2016
Barbula unguiculata Hedw., 1801
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002
Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp., 1853
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853
Bryum argenteum Hedw., 1801
Bryum canariense Brid., 1817
Bryum dichotomum Hedw., 1801
Bryum gemmilucens R.Wilczek & Demaret, 1976
Bryum radiculosum Brid., 1817
Bryum ruderale Crundw. & Nyholm, 1963
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra
Cephaloziella baumgartneri Schiffn., 1905
Cheilothela chloropus (Brid.) Lindb., 1878
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp., 1842
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv., 1805
Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn., 1827
Conocephalum conicum (L.) Dumort.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce, 1867
Crossidium aberrans Holz. & E.B.Bartram, 1924
Crossidium squamiferum (Viv.) Jur., 1882
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt., 1869
Dicranella howei Renauld & Cardot, 1893
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., 1869
Dicranum scoparium Hedw., 1801
Didymodon acutus (Brid.) K.Saito, 1975
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander, 1978
Didymodon luridus Hornsch., 1827
Didymodon sicculus M.J.Cano, Ros, García-Zamora & J.Guerra
Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne, 1873
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa, 1837
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander, 1978
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe, 1867
Encalypta streptocarpa Hedw., 1801
Encalypta vulgaris Hedw., 1801
Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife, 1985
Entosthodon pulchellus (H.Philib.) Brugués
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay, 1872
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp., 1846
Fabronia pusilla Raddi, 1808
Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp., 1849
Fissidens dubius P.Beauv., 1805
Fissidens taxifolius Hedw., 1801
Fontinalis antipyretica Hedw., 1801
Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835
Funaria hygrometrica Hedw., 1801
Grimmia capillata De Not., 1836
Grimmia crinita Brid., 1806
Grimmia dissimulata E.Maier, 2002
Grimmia laevigata (Brid.) Brid., 1826
Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson, 1844
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807
Grimmia tergestina Tomm. ex Bruch & Schimp., 1845
Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch., 1823
Gymnostomum viridulum Brid., 1826
Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb., 1863
Homalothecium aureum (Spruce) H.Rob., 1962
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob., 1962
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., 1871
Leptobarbula berica (De Not.) Schimp., 1876
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., 1906
Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., 1816
Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb., 1868
Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander, 1993
Microbryum floerkeanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1860
Microbryum rectum (With.) R.H.Zander, 1993
Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H.Zander, 1993
Orthotrichum acuminatum H.Philib., 1881
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid., 1801
Orthotrichum anomalum Hedw., 1801
Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid., 1801
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid., 1801
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor, 1818
Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.
Orthotrichum scanicum Grönvall, 1885
Orthotrichum schimperi Hammar, 1852
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid., 1827
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 1907
Plasteurhynchium meridionale (Schimp.) M.Fleisch., 1925
Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M.Fleisch., 1925
Polytrichum juniperinum Hedw., 1801
Porella obtusata (Taylor) Trevis., 1877
Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855
Pottiopsis caespitosa (Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm.
Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander, 1979
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon, 1934
Pterygoneurum sampaianum (Guim.) Guim.
Radula complanata (L.) Dumort., 1831
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi, 1818
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr., 1890
Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1852
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913
Riccia atromarginata Levier, 1889
Riccia cavernosa Hoffm. emend. Raddi, 1796
Riccia fluitans L., 1753
Riccia lamellosa Raddi, 1818
Riccia nigrella DC., 1815
Riccia sorocarpa Bisch., 1835
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont., 1852
Schistidium crassipilum H.H.Blom, 1996
Schistidium elegantulum subsp. elegantulum H.H.Blom, 1996
Schistidium helveticum (Schkuhr) Deguchi, 1979
Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch, 1949
Scorpiurium circinatum (Brid.) M.Fleisch. & Loeske, 1907
Scorpiurium sendtneri (Schimp.) M.Fleisch., 1920
Seligeria acutifolia Lindb., 1864
Southbya nigrella (De Not.) Henriq., 1886
Southbya tophacea (Spruce) Spruce, 1850
Syntrichia calcicola J.J.Amann, 1918
Syntrichia laevipila Brid., 1819
Syntrichia montana Nees, 1819
Syntrichia papillosa (Wilson) Jur., 1882
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803
Targionia hypophylla L., 1753
Timmiella barbuloides (Brid.) Mönk., 1927
Tortella flavovirens (Bruch) Broth., 1902
Tortella humilis (Hedw.) Jenn., 1913
Tortella nitida (Lindb.) Broth., 1902
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., 1888
Tortula atrovirens (Sm.) Lindb., 1864
Tortula inermis (Brid.) Mont., 1832
Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce, 1845
Tortula muralis Hedw., 1801
Tortula pallida (Lindb.) R.H.Zander, 1993
Tortula subulata Hedw., 1801
Tortula vahliana (Schultz) Mont., 1850
Trichostomum brachydontium Bruch, 1829
Trichostomum crispulum Bruch, 1829
Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur., 1882
Weissia condensa (Voit) Lindb., 1863
Weissia controversa Hedw., 1801
Weissia levieri (Limpr.) Kindb., 1897
Weissia longifolia Mitt., 1851
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, 1865

PAR-TENAI-RES

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

LE CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS (CEN) DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur est une association loi 1901 qui œuvre depuis quarante-cinq ans en faveur de la protection et de la conservation de la nature dans les six départements de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est agréé par l'État et la Région en tant que Conservatoire régional d'espaces naturels, reconnu pour ses actions de conservation, son expertise et son accompagnement de la politique publique.
Le CEN contribue à la préservation des espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de gestion, restauration, connaissance, expertises, sensibilisation, animations territoriales en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel.

Il réalise des études, des inventaires et des suivis afin de mieux connaître la faune, la flore, les habitats naturels et déterminer les enjeux de conservation. Il met en place des méthodologies d'évaluation et de suivi. Son expertise lui permet de s'impliquer dans des programmes locaux, régionaux, nationaux et européens de conservation d'espèces et de milieux menacés.

Il accompagne la Métropole Aix-Marseille-Provence dans l'atlas métropolitain de la biodiversité depuis 2018. Il a proposé le cadre et la méthodologie d'analyse du territoire avec le Conservatoire botanique national méditerranéen. Puis il a coordonné l'évaluation de la connaissance et des enjeux de patrimonialité. Il a apporté son expertise sur l'ensemble des groupes taxonomiques de la faune, a réalisé des prospections ciblées sur des secteurs et des groupes d'espèces dont la connaissance était lacunaire. L'ensemble des analyses scientifiques réalisées ont permis l'élaboration des portraits de la biodiversité des 92 communes du territoire métropolitain.

www.cen-paca.org / www.silene.eu

LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

La Ligue de protection des oiseaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur est une association de type loi 1901 qui a pour but d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.

Cette association accompagne la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre du projet d'atlas métropolitain de biodiversité depuis trois ans. Environ 2,5 millions d'observations de faune de la base de données participative Faune-PACA ont été mises à disposition. Cinq camps de prospection ayant mobilisé 81 naturalistes ont été organisés dans les territoires en lacune de connaissance. Un concours naturaliste a aussi été lancé auprès de la communauté naturaliste dans les localités les moins connues. La LPO PACA a mobilisé ses experts pour participer aux analyses d'état des lieux et d'enjeux de connaissance. Enfin, des portraits de la biodiversité ont été co-élaborés pour les 92 communes de la métropole. Afin de sensibiliser et informer le grand public à la biodiversité locale, des journées de sciences participatives ont été organisées dans certaines communes.

https://paca.lpo.fr/ / www.faune-paca.org

LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MÉDITERRANÉEN DE PORQUEROLLES

Le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBNMed), créé en 1979, est agréé par le ministère en charge de l'écologie depuis 1990. Sa gestion administrative est assurée par le Parc national de Port-Cros (organisme public). Comme tous les conservatoires botaniques nationaux, ses missions relèvent de quatre axes principaux :

- l'inventaire et la connaissance de la flore et des habitats naturels ;
- la conservation de la flore rare ou menacée ;
- l'expertises auprès des administrations et des collectivités ;
- la diffusion des connaissances.

En charge de l'ensemble de la zone méditerranéenne continentale, le CBNMed développe ses missions sur un territoire couvrant 9 départements (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Lozère, Pyrénées-Orientales). Il dispose d'une équipe composée d'une vingtaine de personnes répartie, sur trois sites (Antibes, Hyères, Montpellier).

Conscient des liens forts qui unissent animaux et végétaux, le CBNMed collabore régulièrement avec des organismes spécialisés sur la faune et apporte volontiers son expertise et ses données d'observation pour offrir une vision plus globale de la biodiversité et alimenter des stratégies de conservation. La mise en perspective des aires de répartition régionales réciproques de certains rhopalocères et de leurs plantes hôtes illustre, par exemple, parfaitement la nécessité d'échanges entres organismes experts pour améliorer les connaissances et conserver le vivant.

www.cbnmed.fr / www.facebook.com/CBNMediterraneen

L'AGENCE D'URBANISME DU PAYS D'AIX-DURANCE
L'AGENCE D'URBANISME DE L'AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE

Outil d'ingénierie au service des territoires, les agences d'urbanisme, fédérées en réseau national, développent une expertise dans les différents domaines de l'urbanisme et du développement territorial. Les agences viennent en appui technique aux collectivités qui composent leur conseil d'administration. Elles mettent à disposition des moyens d'observation, d'évaluation, de communication et proposent des réflexions stratégiques et opérationnelles, à différentes échelles de territoire, pour accompagner les politiques publiques.
Depuis plusieurs années, le programme de travail sur le territoire métropolitain est élaboré conjointement entre l'Agence d'urbanisme du Pays d'Aix Durance (AUPA) et l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise (AGAM). Ce programme s'inscrit dans les champs généraux d'intervention des deux agences concernant l'ensemble des politiques publiques qui concourent à l'aménagement et au développement durable de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
L'atlas métropolitain de la biodiversité est une ligne de ce programme de travail pluriannuel agences-Métropole. Cet atlas, décliné en plusieurs cahiers, propose un état initial de la connaissance naturaliste et porte des enjeux prioritaires et partagés de conservation et d'amélioration de la connaissance. Il constitue un outil d'aide à la décision pour faciliter la prise en compte des enjeux écologiques et orienter les politiques métropolitaines. Depuis 2020, les agences accompagnent la Métropole dans la valorisation des études naturalistes en travaillant sur leur interprétation, leur représentation et la formalisation des « messages-clés » en lien avec les enjeux de planification et d'aménagement du territoire.
L'atlas est ainsi le fruit d'un travail multi-partenarial grâce auquel la Métropole Aix-Marseille-Provence entend renforcer sa politique de préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

www.aupa.fr / www.agam.org/

DÉMARCHE PARTENARIALE

EXPERTISE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

LPO

AGIR pour la BIODIVERSITÉ Provence-Alpes-Côte d'Azur

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de PORQUEROLLES

SYNTHÈSE ET GRAPHISME

aupa AGENCE D'URBANISME PAYS D'AIX-DURANCE

CONCEPTION, RÉDACTION, RELECTURE

Le Conservatoire d'espaces naturels de PACA / la Ligue de protection des oiseaux de PACA
le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
l'Agence d'urbanisme Pays d'Aix - Durance
la Métropole Aix-Marseille-Provence - DGA Agriculture, Forêts, Paysages et Espaces Naturels

À PARTIR DES DONNÉES NATURALISTES

Faune-PACA et SILENE-PACA

MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

PARTICIPATION FINANCIÈRE

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

CAHIER 2

PORTRAIT DE LA BIODIVERSITÉ CONTINENTALE

JUIN 2021

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

Le vivant nous rassemble



INFORMATIONS

biodiversite@ampmetropole.fr
ampmetropole.fr

Métropole Aix-Marseille-Provence – 58 boulevard Charles Livon – 13007 MARSEILLE